

16. Untuk sampel acak berukuran  $n$  dari distribusi geometri,  $X_i \sim \text{GEO}(p)$ . Tentukan MLE dari  $p$  dengan memaksimalkan pdf dari statistik cukup  $S = \sum X_i$ . Apakah ini sama dengan MLE yang biasa? Jelaskan mengapa hasil ini dapat diekspektasikan.

**Solusi:**

Akan kita cari jenis distribusi dari  $S$ . Dengan menggunakan sifat MGF yang independen didapatkan

$$M_S(t) = M_{X_1}(t)M_{X_2}(t) \cdots M_{X_n}(t) = \left( \frac{p}{1 - (1-p)e^t} \right)^n.$$

Dapat dilihat bahwa  $S$  adalah distribusi negatif binomial,  $S \sim \text{NB}(n, p)$  dengan  $n$  menunjukkan jumlah keberhasilan. Sehingga pdf dari  $S$  adalah

$$f_S(s; n, p) = \binom{s-1}{n-1} p^n (1-p)^{s-n}.$$

Dengan  $s$  didefinisikan banyaknya percobaan. Kemudian log-likelihood dari  $S$  adalah

$$\ell(p; S) = \ln(f_S(s; n, p)) = \ln \binom{s-1}{n-1} + n \ln(p) + (s-n) \ln(1-p).$$

Kemudian turunan  $\ell(p; S)$  terhadap  $p$  adalah

$$\frac{\partial \ell(p; S)}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{s-n}{1-p} = 0 \iff n - p s = sp - p s \implies \hat{p} = \frac{n}{S} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Disisi lain kita mempunyai PDF dari distribusi geometri sebagai berikut

$$f_X(x; p) = p(1-p)^x$$

Selanjutnya fungsi log-likelihoodnya adalah

$$\begin{aligned} \ell(p; \underline{X}) &= n \ln p + \sum_{i=1}^n x_i \ln(1-p) \\ \frac{\partial \ell(p; \underline{X})}{\partial p} &= \frac{n}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{1-p} \end{aligned}$$

Karena  $\frac{\partial \ell(p; \underline{X})}{\partial p} = 0$ , maka

$$\frac{n}{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{1-p} \iff n - np = p \sum_{i=1}^n x_i$$

17. Tinjau statistik cukup,  $S = X_{1:n}$ , untuk distribusi eksponensial dua parameter,  $X_i \sim \text{EXP}(1, \eta)$ .

- Tunjukkan bahwa  $S$  juga lengkap.
- Verifikasi bahwa  $X_{1:n} - \frac{1}{n}$  adalah UMVUE dari  $\eta$ .
- Temukan UMVUE dari persentil ke- $p$ .

18. Misalkan  $X \sim N(0, \theta)$ ;  $\theta > 0$ .

- 
- (a) Tunjukkan bahwa  $X^2$  lengkap dan cukup untuk  $\theta$ .
- (b) Tunjukkan bahwa  $N(0, \theta)$  bukan keluarga lengkap.
26. Untuk sampel acak  $X_i \sim \text{UNIF}(\theta_1, \theta_2)$ , tunjukkan bahwa statistik cukup bersama  $X_{1:n}$  dan  $X_{n:n}$  juga lengkap. Misalkan diinginkan untuk mengestimasi rata-rata  $\mu = (\theta_1 + \theta_2)/2$ . Carilah UMVUE dari  $\mu$ . *Petunjuk:* Pertama, carilah nilai ekspektasi  $E(X_{1:n})$  dan  $E(X_{n:n})$  dan tunjukkan bahwa  $(X_{1:n} + X_{n:n})/2$  adalah penaksir tak bias untuk rata-rata.