

Nama	: Teosofi Hidayah Agung
NRP	: 5002221132

Diberikan sistem persamaan diferensial non-homogen sebagai berikut:

$$\frac{dx}{dt} = 3x + 4y + \sin(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -2x + y + e^t$$

- (1) Cari solusi untuk sistem homogen Abaikan terlebih dahulu suku non-homogen ( $\sin(t)$  dan  $e^t$ ) untuk menyelesaikan sistem homogen:

$$\frac{dx}{dt} = 3x + 4y$$

$$\frac{dy}{dt} = -2x + y$$

Ini adalah sistem persamaan diferensial homogen linear. Kita akan menggunakan metode **nilai eigen** untuk menyelesaikan sistem ini.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Cari nilai eigen dari matriks koefisien:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Untuk mencari nilai eigen, kita perlu menghitung determinan  $\det(A - \lambda I)$ , di mana  $\lambda$  adalah nilai eigen dan  $I$  adalah matriks identitas:

$$\det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ -2 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

Hitung determinan:

$$(3 - \lambda)(1 - \lambda) - (-2)(4) = 0$$

$$(3 - \lambda)(1 - \lambda) + 8 = 0$$

$$3 - \lambda - 3\lambda + \lambda^2 + 8 = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 11 = 0$$

Gunakan rumus kuadrat untuk menyelesaikan:

$$\lambda = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(11)}}{2(1)}$$

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 44}}{2}$$

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{-28}}{2}$$

$$\lambda = 2 \pm i\sqrt{7}$$

Jadi, nilai eigen adalah  $\lambda = 2 \pm i\sqrt{7}$ , yang merupakan nilai kompleks. Karena ada bagian kompleks, solusi dari sistem homogen akan memiliki bentuk eksponensial dengan sinus dan kosinus. Solusi umum dari sistem homogen adalah:

$$\begin{pmatrix} x_h(t) \\ y_h(t) \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} C_1 \cos(\sqrt{7}t) + C_2 \sin(\sqrt{7}t) \\ C_3 \cos(\sqrt{7}t) + C_4 \sin(\sqrt{7}t) \end{pmatrix}$$

di mana  $C_1, C_2, C_3$ , dan  $C_4$  adalah konstanta.

- (2) Solusi khusus untuk bagian non-homogen Sekarang, kita cari solusi khusus untuk suku non-homogen. Untuk persamaan pertama yang memiliki suku  $\sin(t)$ , kita coba solusi dalam bentuk:

$$x_p(t) = A \sin(t) + B \cos(t)$$

Untuk persamaan kedua yang memiliki suku  $e^t$ , kita coba solusi dalam bentuk:

$$y_p(t) = Ce^t$$

- (3) Substitusi solusi khusus Substitusi  $x_p(t)$  dan  $y_p(t)$  ke dalam sistem non-homogen:

- Persamaan pertama:

$$\frac{dx_p}{dt} = 3x_p + 4y_p + \sin(t)$$

Hitung turunan  $x_p(t)$ :

$$\frac{dx_p}{dt} = A \cos(t) - B \sin(t)$$

Substitusi ke dalam persamaan:

$$A \cos(t) - B \sin(t) = 3(A \sin(t) + B \cos(t)) + 4Ce^t + \sin(t)$$

Pisahkan bagian yang bergantung pada  $\sin(t)$ ,  $\cos(t)$ , dan  $e^t$ .

- Persamaan kedua:

$$\frac{dy_p}{dt} = -2x_p + y_p + e^t$$

Hitung turunan  $y_p(t)$ :

$$\frac{dy_p}{dt} = Ce^t$$

Substitusi ke dalam persamaan:

$$Ce^t = -2(A \sin(t) + B \cos(t)) + Ce^t + e^t$$

Baik, kita lanjutkan dengan mencari solusi khusus.

- Persamaan pertama:

$$\frac{dx_p}{dt} = 3x_p + 4y_p + \sin(t)$$

Dengan asumsi solusi khusus:

$$x_p(t) = A \sin(t) + B \cos(t)$$

$$y_p(t) = Ce^t$$

Hitung turunan dari  $x_p(t)$ :

$$\frac{dx_p}{dt} = A \cos(t) - B \sin(t)$$

Substitusi  $x_p(t)$  dan  $y_p(t)$  ke dalam persamaan pertama:

$$A \cos(t) - B \sin(t) = 3(A \sin(t) + B \cos(t)) + 4Ce^t + \sin(t)$$

Pisahkan bagian yang mengandung  $\sin(t)$ ,  $\cos(t)$ , dan  $e^t$ :

$$A \cos(t) - B \sin(t) = 3A \sin(t) + 3B \cos(t) + 4Ce^t + \sin(t)$$

Sekarang, kita pisahkan menjadi tiga persamaan berdasarkan fungsi yang berbeda:

1. Untuk suku  $\sin(t)$ :

$$-B = 3A + 1$$

$$B = -3A - 1$$

2. Untuk suku  $\cos(t)$ :

$$A = 3B$$

3. Untuk suku  $e^t$ :

$$0 = 4C$$

Dari sini, kita dapatkan  $C = 0$ .

- Persamaan kedua:

$$\frac{dy_p}{dt} = -2x_p + y_p + e^t$$

Dengan  $y_p(t) = 0$  karena  $C = 0$ , maka persamaan ini disederhanakan menjadi:

$$0 = -2(A \sin(t) + B \cos(t)) + e^t$$

Tidak ada suku  $e^t$  di sebelah kiri, sehingga tidak memberikan informasi tambahan.

- Temukan nilai  $A$  dan  $B$ . Dari sistem persamaan yang kita dapatkan:

1.  $B = -3A - 1$  2.  $A = 3B$

Substitusi  $B = -3A - 1$  ke dalam  $A = 3B$ :

$$A = 3(-3A - 1)$$

$$A = -9A - 3$$

$$10A = -3$$

$$A = -\frac{3}{10}$$

Substitusi nilai  $A$  ke  $B = -3A - 1$ :

$$B = -3\left(-\frac{3}{10}\right) - 1$$

$$B = \frac{9}{10} - 1$$

$$B = -\frac{1}{10}$$

Solusi khusus adalah:

$$x_p(t) = -\frac{3}{10} \sin(t) - \frac{1}{10} \cos(t)$$

$$y_p(t) = 0$$

- (4) Solusi Akhir dari sistem persamaan diferensial adalah gabungan dari solusi homogen dan solusi khusus:

$$x(t) = e^{2t}(C_1 \cos(\sqrt{7}t) + C_2 \sin(\sqrt{7}t)) - \frac{3}{10} \sin(t) - \frac{1}{10} \cos(t)$$

$$y(t) = e^{2t}(C_3 \cos(\sqrt{7}t) + C_4 \sin(\sqrt{7}t))$$