

Aproksimasi Terbaik (Ketunggalan)

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

6 Oktober 2026

Teorema 3.16

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear bernorma dengan norma $\|\cdot\|$, $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ adalah himpunan bagian konveks, dan $f \in \mathcal{F}$. Maka himpunan aproksimasi terbaik

$$\mathcal{S}^* \equiv \mathcal{S}^*(f, \mathcal{S}) := \left\{ s^* \in \mathcal{S} \mid \|s^* - f\| = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| \right\} \subset \mathcal{S}$$

dari f di $\mathcal{S}$ merupakan himpunan yang konveks.

Ketunggalan

Teorema 3.16

Bukti. Misalkan $\eta \equiv \eta(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$ menyatakan jarak minimal dari f ke himpunan $\mathcal{S}$.

Untuk membuktikan bahwa himpunan $\mathcal{S}^*$ konveks, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}^*$ dan untuk setiap skalar $\lambda \in [0, 1]$, maka

$$s_\lambda^* := \lambda s_1^* + (1 - \lambda)s_2^* \quad (3.11)$$

juga berada di dalam $\mathcal{S}^*$. Pembuktian ini dilakukan dalam beberapa langkah berikut:

- 1 Berdasarkan asumsi teorema, himpunan $\mathcal{S}$ adalah konveks. Karena $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}^* \subset \mathcal{S}$, maka menurut definisi himpunan konveks, diperoleh

$$[s_1^*, s_2^*] := \{\lambda s_1^* + (1 - \lambda)s_2^* \mid \lambda \in [0, 1]\} \subset \mathcal{S}.$$

- 2 Karena $s_\lambda^* \in \mathcal{S}$, maka berdasarkan definisi infimum, berlaku:

$$\|s_\lambda^* - f\| \geq \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| = \eta.$$

- 3 Perhatikan bahwa untuk sebarang $\lambda \in [0, 1]$, berlaku $\lambda + (1 - \lambda) = 1$. Oleh karena itu, f dapat dinyatakan sebagai:

$$f = 1 \cdot f = (\lambda + (1 - \lambda)) f = \lambda f + (1 - \lambda)f.$$

Dengan mengurangkan bentuk di atas dari s_λ^* , kita peroleh:

$$s_\lambda^* - f = (\lambda s_1^* + (1 - \lambda)s_2^*) - (\lambda + (1 - \lambda)) f = \lambda(s_1^* - f) + (1 - \lambda)(s_2^* - f).$$

Mengambil norma pada kedua ruas dan menerapkan ketaksamaan segitiga pada norma $\|\cdot\|$, dapat diperoleh:

$$\begin{aligned}\|s_\lambda^* - f\| &= \|\lambda(s_1^* - f) + (1 - \lambda)(s_2^* - f)\| \\ &\leq \|\lambda(s_1^* - f)\| + \|(1 - \lambda)(s_2^* - f)\|.\end{aligned}$$

Karena $\lambda \in [0, 1]$, maka $\lambda \geq 0$ dan $1 - \lambda \geq 0$, sehingga

$$\|s_\lambda^* - f\| \leq \lambda \|s_1^* - f\| + (1 - \lambda) \|s_2^* - f\|.$$

Mengingat bahwa $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}^*$ adalah aproksimasi terbaik dari f di $\mathcal{S}$, maka menurut definisi:

$$\|s_1^* - f\| = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| = \eta \quad \text{dan} \quad \|s_2^* - f\| = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| = \eta.$$

Substitusi kedua nilai ini menghasilkan:

$$\|s_\lambda^* - f\| \leq \lambda \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| + (1 - \lambda) \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| = (\lambda + 1 - \lambda)\eta = \eta.$$

Dengan menggabungkan batas bawah dari Langkah 2 dan batas atas dari Langkah 3, didapatkan

$$\eta \leq \|s_\lambda^* - f\| \leq \eta \implies \|s_\lambda^* - f\| = \eta = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|.$$

Karena $s_\lambda^* \in \mathcal{S}$ dan jaraknya ke f tepat sama dengan jarak minimal $\inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$, maka berdasarkan definisi himpunan $\mathcal{S}^*$, diperoleh:

$$s_\lambda^* = \lambda s_1^* + (1 - \lambda)s_2^* \in \mathcal{S}^* \quad \text{untuk semua } \lambda \in [0, 1].$$

Dengan demikian, terbukti secara lengkap bahwa himpunan aproksimasi terbaik $\mathcal{S}^*$ adalah konveks. □

Definisi 3.20

Suatu fungsi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **konveks** pada interval $[a, b] \subset \mathbb{R}$, jika untuk semua $x, y \in [a, b]$ ketaksamaan

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \text{untuk semua } \lambda \in [0, 1]$$

berlaku.

Fungsi f dikatakan **konveks tegas** (*strictly convex*) pada $[a, b]$, jika untuk semua $x, y \in [a, b]$ dengan $x \neq y$, berlaku

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \text{untuk semua } \lambda \in (0, 1).$$

Teorema 3.21 (Ketaksamaan Jensen, 1906)

Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi konveks, dan $\{x_1, \dots, x_n\} \subset [a, b]$ adalah himpunan dari $n \geq 2$ titik. Maka ketaksamaan Jensen

$$f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j) \quad \text{untuk semua } \lambda_j \in (0, 1) \text{ dengan } \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$$

berlaku. Jika f konveks tegas, maka kesamaan berlaku jika dan hanya jika seluruh titik saling berhimpit, yaitu $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Bukti. Kita buktikan pernyataan ketaksamaan Jensen ini menggunakan metode induksi matematika.

- Untuk $n = 2$, kita memiliki dua titik $x_1, x_2 \in [a, b]$ dan bobot $\lambda_1, \lambda_2 \in (0, 1)$ yang memenuhi $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Akibatnya, $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$. Dengan memisalkan $\lambda := \lambda_1 \in (0, 1)$, maka

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2.$$

Berdasarkan Definisi 3.20 mengenai fungsi konveks, diperoleh

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

Selanjutnya, misalkan f konveks tegas. Kita buktikan bahwa tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika $x_1 = x_2$.

($\Rightarrow$) Andaikan tanda kesamaan berlaku, yaitu:

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

Untuk membuktikan $x_1 = x_2$, andaikan sebaliknya bahwa $x_1 \neq x_2$. Karena f konveks tegas dan $\lambda_1 \in (0, 1)$ dengan $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$, Definisi 3.20 memberikan:

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

Ini bertentangan dengan kesamaan yang diasumsikan. Jadi, harus berlaku $x_1 = x_2$.

($\Leftarrow$) Sebaliknya, jika $x_1 = x_2 =: c$, maka $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ memberikan:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) &= f((\lambda_1 + \lambda_2)c) = f(c) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2)f(c) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2). \end{aligned}$$

Jadi, tanda kesamaan berlaku. Dengan demikian, kedua arah terbukti dan pernyataan ketaksamaan Jensen beserta syarat kesamaannya benar untuk $n = 2$.

- Asumsikan pernyataan ketaksamaan Jensen berlaku benar untuk sebarang n titik

$\{y_1, \dots, y_n\} \subset [a, b]$ dan sebarang bobot $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in (0, 1)$ dengan $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$, yaitu:

$$f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j y_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(y_j),$$

di mana jika f konveks tegas, tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika $y_1 = y_2 = \dots = y_n$.

Ketunggalan

Teorema 3.21

- Diberikan $n + 1$ titik $\{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\} \subset [a, b]$ dan bobot $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda_{n+1} \in (0, 1)$ dengan:

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = 1 \iff \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 - \lambda_{n+1}.$$

Karena $\lambda_{n+1} \in (0, 1)$, maka jelas bahwa $1 - \lambda_{n+1} > 0$. Selanjutnya perhatikan bahwa

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j + \lambda_{n+1} x_{n+1} = (1 - \lambda_{n+1}) \left(\sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} x_j \right) + \lambda_{n+1} x_{n+1}.$$

Kemudian definisikan

$$\bar{x} := \sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} x_j = \sum_{j=1}^n \mu_j x_j, \quad \text{di mana } \mu_j := \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}}.$$

Perhatikan bahwa untuk setiap $j \in \{1, \dots, n\}$, karena $\lambda_j > 0$ dan $1 - \lambda_{n+1} > 0$, maka $\mu_j > 0$. Selain itu, jumlah seluruh bobot baru ini adalah:

$$\sum_{j=1}^n \mu_j = \sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} = \frac{1}{1 - \lambda_{n+1}} \sum_{j=1}^n \lambda_j = \frac{1 - \lambda_{n+1}}{1 - \lambda_{n+1}} = 1.$$

Untuk menunjukkan bahwa $\bar{x} \in [a, b]$, perhatikan bahwa $a \leq x_j \leq b$ untuk setiap j . Karena $\mu_j > 0$, perkalian dengan μ_j mempertahankan arah ketaksamaan. Dengan menjumlahkan dan menggunakan $\sum_{j=1}^n \mu_j = 1$, diperoleh:

$$a = a \sum_{j=1}^n \mu_j \leq \sum_{j=1}^n \mu_j x_j = \bar{x} \leq b \sum_{j=1}^n \mu_j = b.$$

Jadi, $a \leq \bar{x} \leq b$, sehingga $\bar{x} \in [a, b]$.

Perhatikan bahwa $(1 - \lambda_{n+1}) + \lambda_{n+1} = 1$ dengan koefisien $(1 - \lambda_{n+1})$, $\lambda_{n+1} \in (0, 1)$. Berdasarkan kekonveksan fungsi f untuk 2 titik (yaitu $\bar{x}$ dan x_{n+1}), kita peroleh:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) = f((1 - \lambda_{n+1})\bar{x} + \lambda_{n+1}x_{n+1}) \leq (1 - \lambda_{n+1})f(\bar{x}) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}).$$

Selanjutnya, kita evaluasi nilai $f(\bar{x})$.

$$f(\bar{x}) = f\left(\sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_j) = \frac{1}{1 - \lambda_{n+1}} \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j). \quad (3.12)$$

Karena $1 - \lambda_{n+1} > 0$, kalikan kedua ruas (3.12) dengan $(1 - \lambda_{n+1})$:

$$(1 - \lambda_{n+1})f(\bar{x}) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j).$$

Substitusikan ketaksamaan ini ke ketaksamaan sebelumnya, sehingga diperoleh:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(x_j). \quad (3.13)$$

Persamaan (3.13) membuktikan bahwa ketaksamaan Jensen berlaku benar untuk $n + 1$ titik.

Ketunggalan

Teorema 3.21

Sekarang asumsikan bahwa fungsi f adalah konveks tegas.

($\Leftarrow$) Jika $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n+1} =: c$, maka:

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j = c \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = c \cdot 1 = c \implies f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) = f(c).$$

Pada ruas kanan:

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(x_j) = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(c) = f(c) \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = f(c).$$

Maka tanda kesamaan jelas berlaku.

($\Rightarrow$) Andaikan kesamaan berlaku:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(x_j).$$

1 Ketaksamaan Jensen untuk dua titik dan (3.12) memberikan:

$$f((1 - \lambda_{n+1})\bar{x} + \lambda_{n+1}x_{n+1}) \leq (1 - \lambda_{n+1})f(\bar{x}) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1})$$

Berdasarkan syarat kesamaan untuk $n = 2$, diperoleh:

$$\bar{x} = x_{n+1}.$$

2 Dengan substitusi $\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j = (1 - \lambda_{n+1})\bar{x} + \lambda_{n+1}\bar{x} = \bar{x}$, maka asumsi kesamaan menjadi:

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j) + \lambda_{n+1} f(\bar{x}) \implies (1 - \lambda_{n+1})f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j) \implies$$

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_j) \implies f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n \mu_j f(x_j).$$

Ini adalah kesamaan Jensen untuk n titik. Hipotesis induksi memberikan $x_1 = \cdots = x_n =: c$, sehingga:

$$x_{n+1} = \bar{x} = \sum_{j=1}^n \mu_j c = c. \quad \square$$

Definisi 3.22

Suatu fungsional $\phi : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan **konveks** pada ruang linear $\mathcal{F}$, jika untuk semua $u, v \in \mathcal{F}$ ketaksamaan

$$\phi(\lambda u + (1 - \lambda)v) \leq \lambda\phi(u) + (1 - \lambda)\phi(v) \quad \text{untuk semua } \lambda \in [0, 1] \quad (3.14)$$

berlaku.

Definisi 3.24

Suatu norma $\|\cdot\|$ disebut **konveks tegas** (*strictly convex*) pada ruang linear $\mathcal{F}$, jika bola satuan tertutup

$$\mathcal{B} := \{u \in \mathcal{F} \mid \|u\| \leq 1\} \subset \mathcal{F}$$

merupakan himpunan yang konveks tegas.

Teorema 3.26

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma $\|\cdot\|$. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) Norma $\|\cdot\|$ konveks tegas.
- (b) Bola satuan tertutup $\mathcal{B} := \{u \in \mathcal{F} \mid \|u\| \leq 1\} \subset \mathcal{F}$ konveks tegas.
- (c) Untuk semua $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $u \neq v$ dan $\|u\| = \|v\| = 1$, berlaku

$$\|u + v\| < 2.$$

- (d) Untuk $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $v \neq 0$, kesamaan $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ mengakibatkan $u = \alpha v$ untuk suatu $\alpha \geq 0$.

Bukti. Kita buktikan $(a) \iff (b)$ dan rantai implikasi $(b) \implies (c) \implies (d) \implies (b)$.

- $(a) \iff (b)$: Berdasarkan Definisi 3.24, norma $\|\cdot\|$ disebut konveks tegas jika dan hanya jika bola satuan tertutup $\mathcal{B}$ merupakan himpunan konveks tegas. Jadi, pernyataan (a) dan (b) ekuivalen.
- $(b) \implies (c)$:
Misalkan $\mathcal{B}$ konveks tegas dan ambil $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $u \neq v$ serta $\|u\| = \|v\| = 1$.
Karena $u, v \in \mathcal{B}$, titik tengahnya berada di interior $\mathcal{B}$, sehingga $\|(u+v)/2\| < 1$. Dengan sifat norma, diperoleh:

$$\|u+v\| = 2 \left\| \frac{u+v}{2} \right\| < 2.$$

Dengan demikian, pernyataan (c) terbukti.

- $(c) \implies (d)$:

Asumsikan pernyataan (c) berlaku. Ambil $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $v \neq 0$ yang memenuhi:

$$\|u + v\| = \|u\| + \|v\|.$$

Jika $u = 0$, maka $u = \alpha v$ dengan $\alpha = 0$, sehingga pernyataan (d) langsung terpenuhi. Selanjutnya, misalkan $u \neq 0$. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan $\|u\| \leq \|v\|$.

Kita akan menunjukkan bahwa vektor satuan $u/\|u\|$ dan $v/\|v\|$ harus sama. Perhatikan identitas:

$$\frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} = \left(\frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|u\|} \right) - \left(\frac{v}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right).$$

Selain itu, $\|u\| \leq \|v\|$ mengakibatkan $1/\|u\| - 1/\|v\| \geq 0$. Berdasarkan sifat norma, diperoleh:

$$\begin{aligned} 2 &\geq \left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\| = \left\| \left(\frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|u\|} \right) - \left(\frac{v}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right) \right\| \\ &\geq \left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|u\|} \right\| - \left\| \frac{v}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| = \frac{\|u+v\|}{\|u\|} - \left| \frac{1}{\|u\|} - \frac{1}{\|v\|} \right| \|v\| \\ &= \frac{\|u\| + \|v\|}{\|u\|} - \left(\frac{1}{\|u\|} - \frac{1}{\|v\|} \right) \|v\| = 2. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh hubungan

$$\left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\| = 2.$$

Ketunggalan

Teorema 3.26

Andaikan $\frac{u}{\|u\|} \neq \frac{v}{\|v\|}$. Kedua vektor ini bernorma satu, sebab:

$$\left\| \frac{u}{\|u\|} \right\| = \frac{\|u\|}{\|u\|} = 1, \quad \left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \frac{\|v\|}{\|v\|} = 1.$$

Maka pernyataan (c), diterapkan pada $u/\|u\|$ dan $v/\|v\|$, memberikan:

$$2 = \left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\| < 2.$$

Ini kontradiksi. Jadi:

$$\frac{u}{\|u\|} = \frac{v}{\|v\|} \implies u = \alpha v, \quad \alpha := \frac{\|u\|}{\|v\|} > 0.$$

Dengan menggabungkan kasus $u = 0$ dan $u \neq 0$, pernyataan (d) terbukti.

- $(d) \implies (b)$

Asumsikan pernyataan (d) berlaku. Berdasarkan definisi 3.20, ambil sebarang $u, v \in \mathcal{B}$ dengan $u \neq v$ sehingga $\|u\| \leq 1$ dan $\|v\| \leq 1$. Untuk membuktikan bahwa $\mathcal{B}$ konveks tegas, kita harus menunjukkan:

$$\|\lambda u + (1 - \lambda)v\| < 1 \quad \text{untuk semua } \lambda \in (0, 1).$$

Ketaksamaan ini berarti bahwa seluruh segmen garis terbuka (u, v) berada di interior bola satuan $\mathcal{B}$. Pembuktiannya dibagi menjadi dua kasus.

- 1 $\|u\| < 1$ atau $\|v\| < 1$.

Karena $\lambda > 0$ dan $1 - \lambda > 0$, ketaksamaan segitiga memberikan:

$$\|\lambda u + (1 - \lambda)v\| \leq \|\lambda u\| + \|(1 - \lambda)v\| = \lambda\|u\| + (1 - \lambda)\|v\| < \lambda + (1 - \lambda) = 1.$$

Jadi, ketaksamaan yang diinginkan berlaku pada kasus ini.

2 $\|u\| = \|v\| = 1.$

Untuk sebarang $\lambda \in (0, 1)$, Dari ketaksamaan segitiga, kita telah mengetahui bahwa

$$\|\lambda u + (1 - \lambda)v\| \leq \|\lambda u\| + \|(1 - \lambda)v\| = \lambda\|u\| + (1 - \lambda)\|v\| = 1.$$

Andaikan tanda kesamaan berlaku, yaitu:

$$\|\lambda u + (1 - \lambda)v\| = 1 = \|\lambda u\| + \|(1 - \lambda)v\|.$$

Karena $(1 - \lambda)v \neq 0$, pernyataan (d) dapat diterapkan pada pasangan λu dan $(1 - \lambda)v$. Akibatnya, terdapat $\alpha \geq 0$ sehingga:

$$\lambda u = \alpha(1 - \lambda)v.$$

Karena $\lambda u \neq 0$, maka $\alpha > 0$.

Dengan mengambil norma pada kedua ruas dan menggunakan $\|u\| = \|v\| = 1$, diperoleh:

$$\lambda = \lambda\|u\| = \alpha(1 - \lambda)\|v\| = \alpha(1 - \lambda).$$

Substitusi nilai $\alpha(1 - \lambda) = \lambda$ ke hubungan kedua vektor menghasilkan:

$$\lambda u = \lambda v \implies u = v,$$

sebab $\lambda > 0$. Hal ini bertentangan dengan asumsi $u \neq v$. Jadi, tanda kesamaan tidak mungkin terjadi, sehingga:

$$\|\lambda u + (1 - \lambda)v\| < 1 \quad \text{untuk semua } \lambda \in (0, 1).$$

Dengan demikian, pada kedua kasus, segmen garis terbuka (u, v) termuat di interior $\mathcal{B}$.
Jadi, bola satuan $\mathcal{B}$ konveks tegas dan pernyataan (b) terbukti.

Seluruh implikasi telah dibuktikan, sehingga keempat pernyataan (a), (b), (c), dan (d) ekuivalen.

Teorema 3.28

Setiap norma Euclidean konveks tegas.

Bukti. Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma Euclidean yang diinduksi oleh hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$, yaitu:

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} \quad \text{untuk semua } u \in \mathcal{F}.$$

Berdasarkan Teorema 3.9, norma ini memenuhi **identitas jajargenjang** (3.1):

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2 \quad \text{untuk semua } u, v \in \mathcal{F}.$$

Dengan membagi kedua ruas oleh 4 dan menggunakan sifat norma, diperoleh:

$$\left\| \frac{u + v}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{u - v}{2} \right\|^2 = \frac{\|u\|^2}{2} + \frac{\|v\|^2}{2}.$$

Ketunggalan

Teorema 3.28

Ambil $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $u \neq v$ dan $\|u\| = \|v\|$. Karena $u - v \neq 0$, sifat definit positif norma memberikan $\|(u - v)/2\|^2 > 0$. Oleh karena itu:

$$\left\| \frac{u + v}{2} \right\|^2 = \frac{\|u\|^2}{2} + \frac{\|v\|^2}{2} - \left\| \frac{u - v}{2} \right\|^2 < \frac{\|u\|^2}{2} + \frac{\|v\|^2}{2} = \|u\|^2 = \|v\|^2.$$

Khususnya, jika $\|u\| = \|v\| = 1$, maka $\|(u + v)/2\|^2 < 1$. Dengan mengambil akar kuadrat kedua norma, diperoleh:

$$\|u + v\| = 2 \left\| \frac{u + v}{2} \right\| < 2.$$

Jadi, untuk setiap dua vektor satuan yang berbeda, norma jumlahnya kurang dari 2. Berdasarkan pernyataan (c) pada Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|$ konveks tegas. □

Teorema 3.29 (Ketaksamaan Hölder, 1889)

Misalkan $1 < p, q < \infty$ memenuhi $1/p + 1/q = 1$. Maka **ketaksamaan Hölder**

$$\|xy\|_1 \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \text{untuk semua } x \in \ell^p, y \in \ell^q \quad (3.19)$$

berlaku, dengan $xy := (x_k y_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Kesamaan pada (3.19) berlaku jika dan hanya jika diantaranya memenuhi $x = 0, y = 0$, atau

$$|x_k|^{p-1} = \alpha |y_k| \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}, \text{ dengan } \alpha := \frac{\|x\|_p^{p-1}}{\|y\|_q} > 0, y \neq 0. \quad (3.20)$$

Bukti. Misalkan $1 < p, q < \infty$ dengan $1/p + 1/q = 1$, serta:

$$x = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^p, \quad y = (y_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^q.$$

Jika $x = 0$ atau $y = 0$, maka kedua ruas (3.19) bernilai nol. Jadi, ketaksamaan dan tanda kesamaannya langsung terpenuhi.

Selanjutnya, asumsikan $x, y \neq 0$, sehingga $\|x\|_p > 0$ dan $\|y\|_q > 0$. Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, definisikan:

$$a_k := \frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p}, \quad b_k := \frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}.$$

Berdasarkan definisi norma pada ℓ^p dan ℓ^q , berlaku:

$$a_k, b_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k = 1, \quad \sum_{k=1}^{\infty} b_k = 1.$$

Kita akan menerapkan ketaksamaan Jensen untuk memperoleh estimasi pada setiap komponen, kemudian menjumlahkannya.

- ❶ Fungsi $\phi(t) := -\log t$ pada $(0, \infty)$ konveks tegas, sebab $\phi''(t) = 1/t^2 > 0$. Untuk $a_k, b_k > 0$, kita dapat menerapkan Teorema 3.21 pada interval tertutup yang memuat kedua nilai ini, dengan bobot $1/p$ dan $1/q$:

$$-\log \left(\frac{1}{p} \frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q} \right) \leq -\frac{1}{p} \log \left(\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} \right) - \frac{1}{q} \log \left(\frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q} \right). \quad (3.21)$$

Dalam notasi a_k, b_k , setelah mengalikan kedua ruas dengan -1 , ketaksamaan ini menjadi:

$$\log \left(\frac{a_k}{p} + \frac{b_k}{q} \right) \geq \frac{1}{p} \log a_k + \frac{1}{q} \log b_k = \log \left(a_k^{1/p} b_k^{1/q} \right).$$

Karena fungsi eksponensial naik tegas, diperoleh $a_k^{1/p} b_k^{1/q} \leq a_k/p + b_k/q$.

Ketaksamaan Young

Misalkan $a, b \geq 0$ dan $1 < p, q < \infty$ dengan $1/p + 1/q = 1$. Maka:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika $a^p = b^q$.

Bukti. Jika $a = 0$ atau $b = 0$, ketaksamaan langsung berlaku, dengan kesamaan hanya ketika keduanya nol. Untuk $a, b > 0$, Jensen pada fungsi konveks tegas $-\log$ memberikan:

$$-\log \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \right) \leq -\frac{1}{p} \log(a^p) - \frac{1}{q} \log(b^q) = -\log(ab).$$

Karena $-\log$ turun tegas, diperoleh ketaksamaan Young. Syarat kesamaan Jensen adalah $a^p = b^q$. □

- 2 Substitusikan definisi a_k dan b_k pada ketaksamaan $a_k^{1/p} b_k^{1/q} \leq a_k/p + b_k/q$ untuk memperoleh **ketaksamaan Young**:

$$\frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} = \left(\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} \right)^{1/p} \left(\frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q} \right)^{1/q} \leq \frac{1}{p} \frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}. \quad (3.22)$$

Untuk $a_k, b_k > 0$, kekonveksan tegas fungsi $-\log$ menunjukkan bahwa kesamaan berlaku jika dan hanya jika $a_k = b_k$.

Jika $a_k = 0$ atau $b_k = 0$, ruas kiri (3.22) bernilai nol, sedangkan ruas kanannya tak-negatif. Jadi, ketaksamaan tetap berlaku tanpa menggunakan logaritma pada nol.

Pada kasus ini, kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a_k = b_k = 0$.

Dengan demikian, (3.22) berlaku untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, dan pada semua kasus kesamaan terjadi tepat ketika $a_k = b_k$.

- 3 Syarat kesamaan $a_k = b_k$ pada (3.22) dapat ditulis sebagai:

$$\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} = \frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}. \quad (3.23)$$

Karena $1/p + 1/q = 1$, diperoleh $q = p/(p - 1)$, sehingga $q/p = 1/(p - 1)$.

$$\frac{|x_k|}{\|x\|_p} = \left(\frac{|y_k|}{\|y\|_q} \right)^{1/(p-1)}. \quad (3.24)$$

Selanjutnya, dengan mengambil pangkat $p - 1$ diperoleh:

$$|x_k|^{p-1} = \frac{\|x\|_p^{p-1}}{\|y\|_q} |y_k| = \alpha |y_k|.$$

Seluruh langkah ini dapat dibalik, karena $p - 1 > 0$ dan kedua norma positif. Jadi, syarat kesamaan pada setiap komponen tepat sama dengan (3.20).

- 4 Jumlahkan (3.22) untuk $k = 1, \dots, N$. Karena semua suku tak-negatif, diperoleh:

$$\sum_{k=1}^N \frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^N a_k + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^N b_k \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Jadi, jumlah parsial $\sum_{k=1}^N |x_k y_k|$ naik dan terbatas oleh $\|x\|_p \|y\|_q$. Akibatnya, deret ini konvergen, sehingga $xy \in \ell^1$.

Dengan mengambil limit $N \rightarrow \infty$, diperoleh:

$$\frac{\|xy\|_1}{\|x\|_p \|y\|_q} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Kalikan kedua ruas dengan $\|x\|_p \|y\|_q > 0$ untuk memperoleh ketaksamaan Hölder (3.19).

- 5 Untuk menentukan syarat kesamaan pada (3.19), definisikan selisih kedua ruas ketaksamaan Young untuk setiap $k \in \mathbb{N}$:

$$d_k := \frac{a_k}{p} + \frac{b_k}{q} - \frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} \geq 0.$$

Dari penjumlahan (3.22), jumlah selisih tersebut memenuhi:

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k = 1 - \frac{\|xy\|_1}{\|x\|_p \|y\|_q}.$$

Jadi, kesamaan pada (3.19) berlaku jika dan hanya jika $\sum_{k=1}^{\infty} d_k = 0$. Karena setiap $d_k \geq 0$, hal ini ekuivalen dengan $d_k = 0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$.

Karena $d_k = 0$ berarti kesamaan pada (3.22), syarat ini ekuivalen dengan (3.20) pada komponen ke- k . Oleh karena itu, untuk $x, y \neq 0$, kesamaan pada ketaksamaan Hölder terjadi tepat ketika (3.20) berlaku untuk semua $k \in \mathbb{N}$.

Teorema 3.30

Untuk $1 < p < \infty$, norma ℓ^p , yaitu $\|\cdot\|_p$ pada ℓ^p , konveks tegas.

Bukti. Misalkan $1 < p < \infty$ dan $q = p/(p-1)$ adalah **eksponen konjugat Hölder** dari p . Maka $1 < q < \infty$ dan:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad (p-1)q = p.$$

Ambil dua barisan $x, y \in \ell^p$:

$$x = (x_k)_{k \in \mathbb{N}}, \quad y = (y_k)_{k \in \mathbb{N}}, \quad x \neq y, \quad \|x\|_p = \|y\|_p = 1.$$

Berdasarkan pernyataan (c) pada Teorema 3.26, untuk membuktikan kekonveksan tegas norma $\|\cdot\|_p$, cukup ditunjukkan:

$$\|x + y\|_p < 2. \tag{3.25}$$

Kita akan memperoleh batas $\|x + y\|_p \leq 2$ menggunakan ketaksamaan Hölder, lalu menunjukkan bahwa tanda kesamaan mengakibatkan $x = y$.

- 1 Definisikan $s = (s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dengan $s_k := |x_k + y_k|^{p-1} \geq 0$. Untuk memastikan $s \in \ell^q$, perhatikan batas sederhana:

$$|x_k + y_k|^p \leq (|x_k| + |y_k|)^p \leq 2^p(|x_k|^p + |y_k|^p).$$

Karena $x, y \in \ell^p$, penjumlahan batas ini menunjukkan $x + y \in \ell^p$. Dengan $(p-1)q = p$, diperoleh:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |s_k|^q = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^{(p-1)q} = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p < \infty.$$

Jadi, $s \in \ell^q$. Selain itu, karena $p/q = p - 1$, normanya memenuhi:

$$\begin{aligned}\|s\|_q &= \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p \right)^{1/q} = (\|x + y\|_p^p)^{1/q} \\ &= \|x + y\|_p^{p/q} = \|x + y\|_p^{p-1}.\end{aligned}$$

- 2 Dari definisi s_k dan ketaksamaan segitiga pada setiap komponen, diperoleh:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_p^p &= \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k| |s_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} (|x_k| |s_k| + |y_k| |s_k|)\end{aligned}\tag{3.26}$$

$$\leq \|x\|_p \|s\|_q + \|y\|_p \|s\|_q.\tag{3.27}$$

Ketaksamaan (3.27) diperoleh dengan menerapkan Teorema 3.29, yaitu ketaksamaan Hölder (3.19), masing-masing pada pasangan (x, s) dan (y, s) :

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| |s_k| \leq \|x\|_p \|s\|_q, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |y_k| |s_k| \leq \|y\|_p \|s\|_q.$$

Selanjutnya, kita gunakan hubungan $\|s\|_q = \|x + y\|_p^{p-1}$ untuk memperoleh batas norma jumlah.

- 3 Substitusikan $\|s\|_q = \|x + y\|_p^{p-1}$ ke (3.27), sehingga:

$$\|x + y\|_p^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x + y\|_p^{p-1}.$$

Jika $x + y = 0$, maka (3.25) langsung berlaku. Jika $x + y \neq 0$, kita dapat membagi kedua ruas dengan $\|x + y\|_p^{p-1} > 0$ untuk memperoleh **ketaksamaan Minkowski**:

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Penurunan ini juga berlaku untuk sebarang $x, y \in \ell^p$, karena pembentukan s dan penerapan Hölder di atas berlaku tanpa asumsi norma satu.

Khususnya, untuk pasangan vektor satuan yang sedang ditinjau:

$$\|x + y\|_p \leq 2.$$

Untuk menunjukkan bahwa ketaksamaan ini tegas ketika $x \neq y$, andaikan $\|x + y\|_p = 2$. Maka $s \neq 0$ dan seluruh ketaksamaan pada (3.26) serta (3.27) harus berupa kesamaan.

- 4 Kesamaan pada (3.27) mengharuskan kesamaan pada kedua penerapan Hölder. Berdasarkan syarat kesamaan (3.20) dan $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$, diperoleh:

$$|x_k|^{p-1} = \alpha |s_k|, \quad |y_k|^{p-1} = \alpha |s_k|, \quad \alpha := \frac{1}{\|s\|_q} > 0.$$

Karena $p - 1 > 0$, fungsi $t \mapsto t^{p-1}$ naik tegas pada $[0, \infty)$. Oleh karena itu:

$$|x_k| = |y_k| \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}.$$

Jadi, kedua barisan memiliki nilai mutlak yang sama pada setiap komponen.

- 5 Gunakan kesamaan pada (3.26), yaitu:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (|x_k| + |y_k| - |x_k + y_k|) |s_k| = 0.$$

Setiap suku tak-negatif. Jadi, untuk setiap k dengan $s_k > 0$, harus berlaku $|x_k + y_k| = |x_k| + |y_k|$. Untuk skalar real, hal ini berarti x_k dan y_k bertanda sama; untuk skalar kompleks, keduanya memiliki arah yang sama.

Karena $|x_k| = |y_k|$, kesamaan tersebut mengakibatkan $x_k = y_k$. Secara aljabar:

$$|x_k + y_k| = 2|x_k| \implies \operatorname{Re}(x_k \overline{y_k}) = |x_k|^2 \implies |x_k - y_k|^2 = 0.$$

Jika $s_k = 0$, syarat kesamaan Hölder (3.20) memberikan $|x_k|^{p-1} = |y_k|^{p-1} = 0$, sehingga $x_k = y_k = 0$.

Jadi, $x = y$, bertentangan dengan asumsi $x \neq y$. Oleh karena itu, (3.25) berlaku untuk setiap dua vektor satuan yang berbeda. Berdasarkan Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|_p$ pada ℓ^p konveks tegas. □

Teorema 3.32

Untuk $1 < p < \infty$, norma L^p , yaitu $\|\cdot\|_p$ pada L^p , konveks tegas.

Bukti. Bukti serupa dengan Teorema 3.30, dengan penjumlahan diganti integral. Bentuk integral Hölder dan syarat kesamaannya diperoleh dengan mengintegrasikan ketaksamaan Young pada bukti Teorema 3.29.

Ambil $f, g \in L^p(\Omega, \mu)$ dengan $f \neq g$ sebagai elemen L^p dan $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$. Untuk $q = p/(p-1)$, definisikan $s := |f + g|^{p-1}$. Seperti pada bukti sebelumnya, $(p-1)q = p$ memberikan:

$$s \in L^q, \quad \|s\|_q = \|f + g\|_p^{p-1}.$$

Ketaksamaan segitiga pada nilai fungsi dan dua penerapan Hölder memberikan:

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f + g| s \, d\mu \\ &\leq \int_{\Omega} |f| s \, d\mu + \int_{\Omega} |g| s \, d\mu \\ &\leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|s\|_q = 2\|f + g\|_p^{p-1}.\end{aligned}$$

Jika $\|f + g\|_p = 0$, maka $\|f + g\|_p < 2$ langsung berlaku. Jika positif, pembagian dengan $\|f + g\|_p^{p-1}$ menghasilkan $\|f + g\|_p \leq 2$.

Andaikan $\|f + g\|_p = 2$. Seluruh ketaksamaan di atas mencapai kesamaan, sehingga syarat kesamaan Hölder memberikan:

$$|f|^{p-1} = \alpha s, \quad |g|^{p-1} = \alpha s, \quad \alpha := \frac{1}{\|s\|_q} > 0,$$

hampir di mana-mana, sehingga $|f| = |g|$ hampir di mana-mana. Kesamaan pada ketaksamaan segitiga juga memberikan:

$$\int_{\Omega} (|f| + |g| - |f + g|) s \, d\mu = 0.$$

Integran tak-negatif ini harus nol hampir di mana-mana. Pada $\{s > 0\}$, diperoleh $|f + g| = |f| + |g|$, sehingga f, g bertanda sama (real) atau searah (kompleks). Bersama $|f| = |g|$, diperoleh $f = g$ hampir di mana-mana.

Pada $\{s = 0\}$, syarat kesamaan Hölder memberikan $f = g = 0$ hampir di mana-mana. Jadi, $f = g$ hampir di mana-mana pada Ω , yaitu sama sebagai elemen L^p , bertentangan dengan asumsi. Maka $\|f + g\|_p < 2$ untuk dua elemen satuan yang berbeda. Berdasarkan Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|_p$ pada L^p konveks tegas. □

Akibat 3.35

Untuk norma-norma ℓ^p , yaitu $\|\cdot\|_p$ pada $\mathbb{R}^d$, yang didefinisikan oleh

$$\|x\|_p^p = \sum_{k=1}^d |x_k|^p \quad \text{untuk } 1 \leq p < \infty, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq d} |x_k|,$$

berlaku pernyataan-pernyataan berikut:

- (a) Untuk $1 < p < \infty$, norma $\|\cdot\|_p$ konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$.
- (b) Untuk $d > 1$, norma $\|\cdot\|_1$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$.
- (c) Untuk $d > 1$, norma $\|\cdot\|_\infty$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$.

Bukti. Kita buktikan setiap pernyataan menggunakan kriteria (c) pada Teorema 3.26: suatu norma konveks tegas jika dan hanya jika norma jumlah setiap dua vektor satuan yang berbeda kurang dari 2.

- ❶ Untuk $1 < p < \infty$, identifikasikan setiap vektor $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ dengan barisan di ℓ^p yang diperoleh dengan menambahkan komponen nol:

$$Jx := (x_1, \dots, x_d, 0, 0, \dots) \in \ell^p.$$

Pemetaan J linear, injektif, dan mempertahankan norma, sebab:

$$\|Jx\|_p^p = \sum_{k=1}^d |x_k|^p = \|x\|_p^p.$$

Jika $x \neq y$ dan $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$, maka $Jx \neq Jy$ dan $\|Jx\|_p = \|Jy\|_p = 1$. Berdasarkan Teorema 3.30, diperoleh:

$$\|x + y\|_p = \|J(x + y)\|_p = \|Jx + Jy\|_p < 2.$$

Jadi, norma $\|\cdot\|_p$ pada $\mathbb{R}^d$ konveks tegas untuk $1 < p < \infty$.

(b) Untuk $d > 1$, pilih dua vektor basis standar yang berbeda:

$$x = e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad y = e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0).$$

Keduanya merupakan vektor satuan terhadap norma ℓ^1 , tetapi norma jumlahnya memenuhi:

$$\|x\|_1 = \|y\|_1 = 1, \quad \|x + y\|_1 = \|(1, 1, 0, \dots, 0)\|_1 = |1| + |1| = 2.$$

Jadi, terdapat dua vektor satuan yang berbeda dengan norma jumlah tepat 2. Ini melanggar kriteria kekonveksan tegas pada Teorema 3.26. Oleh karena itu, norma $\|\cdot\|_1$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$ untuk $d > 1$.

- Ⓢ Untuk $d > 1$, pilih dua vektor berikut untuk norma $\|\cdot\|_\infty$:

$$x = (1, 1, 0, \dots, 0), \quad y = (1, -1, 0, \dots, 0).$$

Berdasarkan definisi norma maksimum, diperoleh:

$$\|x\|_\infty = \|y\|_\infty = 1, \quad \|x + y\|_\infty = \|(2, 0, \dots, 0)\|_\infty = 2.$$

Sekali lagi, terdapat dua vektor satuan yang berbeda dengan norma jumlah tepat 2.

Berdasarkan Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|_\infty$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$ untuk $d > 1$.

Dengan demikian, ketiga pernyataan terbukti. □

Teorema 3.37

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma $\| \cdot \|$ yang konveks tegas. Selanjutnya, misalkan $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ adalah himpunan konveks dan $f \in \mathcal{F}$. Jika terdapat aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f , maka s^* tunggal.

Bukti. Kita gunakan metode kontradiksi. Andaikan terdapat dua aproksimasi terbaik yang berbeda, yaitu $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}$ dengan $s_1^* \neq s_2^*$. Berdasarkan definisi aproksimasi terbaik, keduanya mencapai jarak minimal yang sama:

$$\|s_1^* - f\| = \|s_2^* - f\| = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| =: \eta.$$

Jika $\eta = 0$, sifat definit positif norma memberikan $s_1^* = f = s_2^*$, bertentangan dengan asumsi bahwa keduanya berbeda. Jadi, $\eta > 0$.

- 1 Karena $\mathcal{S}$ konveks dan $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}$, titik tengah keduanya juga berada di $\mathcal{S}$:

$$\hat{s} := \frac{s_1^* + s_2^*}{2} \in \mathcal{S}.$$

Kita akan menunjukkan bahwa $\hat{s}$ lebih dekat ke f daripada kedua aproksimasi terbaik tersebut.

- 2 Definisikan vektor galat yang dinormalisasi:

$$u := \frac{s_1^* - f}{\eta}, \quad v := \frac{s_2^* - f}{\eta}.$$

Karena $\eta > 0$, kedua vektor ini terdefinisi dan memenuhi $\|u\| = \|v\| = 1$. Selain itu, $u \neq v$, sebab $s_1^* \neq s_2^*$.

Berdasarkan pernyataan (c) pada Teorema 3.26, kekonveksan tegas norma memberikan $\|u + v\| < 2$. Dengan sifat homogenitas norma, diperoleh:

$$\begin{aligned}\left\|\frac{s_1^* + s_2^*}{2} - f\right\| &= \left\|\frac{(s_1^* - f) + (s_2^* - f)}{2}\right\| \\ &= \frac{\eta}{2}\|u + v\| < \eta = \|s_1^* - f\| = \|s_2^* - f\|.\end{aligned}\tag{3.28}$$

- ❸ Karena $\hat{s} \in \mathcal{S}$, definisi infimum mengharuskan $\|\hat{s} - f\| \geq \eta$. Namun, (3.28) memberikan $\|\hat{s} - f\| < \eta$. Jadi:

$$\eta \leq \|\hat{s} - f\| < \eta,$$

Ini kontradiksi.

Jadi, dua aproksimasi terbaik yang berbeda tidak dapat ada. Karena keberadaan aproksimasi terbaik telah diasumsikan, aproksimasi terbaik s^* terhadap f di $\mathcal{S}$ tunggal.



Akibat 3.39

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean dan $S \subset \mathcal{F}$ adalah himpunan konveks. Maka untuk setiap $f \in \mathcal{F}$, terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik $s^* \in S$ terhadap f .

Bukti. Karena $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean, normanya diinduksi oleh hasil kali dalam:

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} \quad \text{untuk semua } u \in \mathcal{F}.$$

Berdasarkan Teorema 3.28, norma ini konveks tegas. Selain itu, S konveks menurut asumsi. Jadi, seluruh hipotesis mengenai ruang dan himpunan pada Teorema 3.37 terpenuhi.

Untuk sebarang $f \in \mathcal{F}$, jika aproksimasi terbaik $s^* \in S$ terhadap f ada, maka Teorema 3.37 menjamin bahwa s^* tunggal. Dengan demikian, untuk setiap $f \in \mathcal{F}$ terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik di S . □

Akibat 3.40

Misalkan $\mathcal{S} \subset L^p$ adalah himpunan konveks untuk $1 < p < \infty$. Maka untuk setiap $f \in L^p$, terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f sehubungan dengan norma $\|\cdot\|_p$.

Bukti. Berdasarkan Teorema 3.32, norma $\|\cdot\|_p$ pada ruang linear L^p konveks tegas untuk $1 < p < \infty$. Karena $\mathcal{S} \subset L^p$ konveks, kita dapat menerapkan Teorema 3.37 dengan $\mathcal{F} = L^p$ dan norma $\|\cdot\|_p$.

Untuk sebarang $f \in L^p$, jika terdapat aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f , maka aproksimasi tersebut tunggal. Jadi, untuk setiap $f \in L^p$ terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik di $\mathcal{S}$ terhadap norma $\|\cdot\|_p$.

Ketunggalan ini dipahami sebagai ketunggalan elemen L^p : dua wakil fungsi yang sama hampir di mana-mana menyatakan elemen yang sama.



Akibat 3.41

Misalkan $\mathcal{S} \subset \ell^p$ adalah himpunan konveks untuk $1 < p < \infty$. Maka untuk setiap $f \in \ell^p$, terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f sehubungan dengan norma $\|\cdot\|_p$.

Bukti. Berdasarkan Teorema 3.30, norma $\|\cdot\|_p$ pada ruang linear ℓ^p konveks tegas untuk $1 < p < \infty$. Selain itu, $\mathcal{S} \subset \ell^p$ konveks menurut asumsi. Jadi, Teorema 3.37 dapat diterapkan dengan $\mathcal{F} = \ell^p$ dan norma $\|\cdot\|_p$.

Untuk sebarang $f \in \ell^p$, jika aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f ada, maka aproksimasi tersebut tunggal. Oleh karena itu, untuk setiap $f \in \ell^p$ terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik di $\mathcal{S}$ terhadap norma $\|\cdot\|_p$. □

Proposisi 3.42

Misalkan $f \in \mathcal{C}[-1, 1]$ adalah fungsi genap dan $\mathcal{S} \subset \mathcal{C}[-1, 1]$ adalah himpunan yang invarian terhadap refleksi. Jika terdapat aproksimasi terbaik tunggal $s_p^* \in \mathcal{S}$ terhadap f sehubungan dengan norma L^p , yaitu $\|\cdot\|_p$, untuk $1 \leq p \leq \infty$, maka s_p^* juga merupakan fungsi genap.

Bukti. Karena f genap, berlaku $f(x) = f(-x)$ untuk setiap $x \in [-1, 1]$. Sifat invarian terhadap refleksi pada $\mathcal{S}$ berarti bahwa untuk setiap $s \in \mathcal{S}$, fungsi Rs yang didefinisikan oleh $(Rs)(x) := s(-x)$ juga berada di $\mathcal{S}$.

Misalkan $s_p^* \in \mathcal{S}$ adalah aproksimasi terbaik tunggal terhadap f dalam norma $\|\cdot\|_p$.
Definisikan fungsi refleksinya:

$$r_p^*(x) := s_p^*(-x) \quad \text{untuk } x \in [-1, 1].$$

Berdasarkan asumsi invariansi terhadap refleksi, $r_p^* \in \mathcal{S}$. Kita akan menunjukkan bahwa refleksi ini memiliki jarak yang sama ke f dengan s_p^* , sehingga juga merupakan aproksimasi terbaik.

- ① Untuk $p = \infty$, gunakan substitusi $t = -x$. Karena refleksi memetakan interval $[-1, 1]$ ke dirinya sendiri dan $f(-t) = f(t)$, diperoleh:

$$\begin{aligned}\|r_\infty^* - f\|_\infty &= \max_{x \in [-1, 1]} |s_\infty^*(-x) - f(x)| \\ &= \max_{t \in [-1, 1]} |s_\infty^*(t) - f(-t)| \\ &= \max_{t \in [-1, 1]} |s_\infty^*(t) - f(t)| \\ &= \|s_\infty^* - f\|_\infty = \eta_\infty(f, \mathcal{S}),\end{aligned}$$

dengan $\eta_\infty(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|_\infty$.

Jadi, $r_{\infty}^* \in \mathcal{S}$ juga mencapai jarak minimal terhadap f . Karena aproksimasi terbaik tunggal, harus berlaku $r_{\infty}^* = s_{\infty}^*$. Berdasarkan definisi refleksi:

$$s_{\infty}^*(x) = r_{\infty}^*(x) = s_{\infty}^*(-x) \quad \text{untuk semua } x \in [-1, 1].$$

Dengan demikian, s_{∞}^* genap.

- 2 Untuk $1 \leq p < \infty$, hitung pangkat ke- p dari jarak kedua fungsi. Gunakan substitusi $t = -x$, sehingga $dx = -dt$ dan batas $x = -1, 1$ berturut-turut menjadi $t = 1, -1$:

$$\begin{aligned}\|r_p^* - f\|_p^p &= \int_{-1}^1 |s_p^*(-x) - f(x)|^p dx \\ &= - \int_1^{-1} |s_p^*(t) - f(-t)|^p dt \\ &= \int_{-1}^1 |s_p^*(t) - f(t)|^p dt \\ &= \|s_p^* - f\|_p^p = \eta_p^p(f, \mathcal{S}),\end{aligned}$$

dengan $\eta_p(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|_p$. Pada baris ketiga, kita membalik batas integrasi dan menggunakan sifat genap f .

Ketunggalan

Proposisi 3.42

Dengan mengambil akar pangkat p , diperoleh $\|r_p^* - f\|_p = \eta_p(f, S)$. Jadi, $r_p^* \in S$ juga merupakan aproksimasi terbaik terhadap f . Ketunggalan aproksimasi terbaik mengakibatkan $r_p^* = s_p^*$.

Jika kesamaan ini dipahami dalam L^p , kedua fungsi sama hampir di mana-mana. Karena keduanya kontinu pada $[-1, 1]$, kesamaan berlaku di setiap titik: selisih kontinu yang tidak nol di suatu titik akan tidak nol pada suatu interval dengan ukuran positif. Oleh karena itu:

$$s_p^*(x) = r_p^*(x) = s_p^*(-x) \quad \text{untuk semua } x \in [-1, 1].$$

Jadi, s_p^* genap untuk $1 \leq p < \infty$.

Bersama hasil kasus $p = \infty$, proposisi terbukti untuk seluruh $1 \leq p \leq \infty$. □