




1.1 逻辑代数基本概念、公式和定理

1.1.1 基本和常用逻辑运算

一、三种基本逻辑运算


1. 基本逻辑关系举例

(1) 电路图：



功能表


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮



或逻辑关系

功能表

A	B	Y
断	断	灭
断	合	亮
合	断	亮
合	合	亮



非逻辑关系

功能表

A	Y
断	亮
合	灭



(2) 真值表： 经过设定变量和状态赋值后，得到的反映输入变量与输出变量之间因果关系的数学表达形式。

功能表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮

与逻辑关系

真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(Truth table)



功能表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
断	断	灭
断	合	亮
合	断	亮
合	合	亮

或逻辑关系



真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

功能表

<i>A</i>	<i>Y</i>
断	亮
合	灭

非逻辑关系



真值表

<i>A</i>	<i>Y</i>
0	1
1	0



(3) 三种基本逻辑关系:

- **与逻辑:** 当决定一事件的所有条件都具备时, 事件才发生的逻辑关系。
- **或逻辑:** 决定一事件结果的诸条件中, 只要有一个或一个以上具备时, 事件就会发生的逻辑关系。
- **非逻辑:** 只要条件具备, 事件便不会发生; 条件不具备, 事件一定发生的逻辑关系。



2. 基本逻辑运算

(1) 与运算:


真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

逻辑函数式

$$Y = A \cdot B = AB$$

逻辑符号





(2) 或运算:

真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

逻辑函数式

$$Y = A + B$$

逻辑符号



(3) 非运算:


真值表

A	Y
0	1
1	0

逻辑函数式

$$Y = \overline{A}$$

逻辑符号





二、逻辑变量与逻辑函数及常用复合逻辑运算

1. 逻辑变量与逻辑函数

逻辑变量：在逻辑代数中，用英文字母表示的变量称为逻辑变量。在二值逻辑中，变量的取值不是 **1** 就是 **0**。

原变量和反变量：字母上面无反号的称为**原变量**，有反号的叫做**反变量**。

逻辑函数：如果输入逻辑变量 **A**、**B**、**C**... 的取值确定之后，输出逻辑变量 **Y** 的值也被唯一确定，则称 **Y** 是 **A**、**B**、**C**... 的逻辑函数。并记作 $Y = F(A, B, C \dots)$




2. 几种常用复合逻辑运算

(1) 与非运算

(NAND)

$$Y_1 = \overline{AB}$$




Y_1 、 Y_2 的真值表

A	B	Y_1	Y_2
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

(2) 或非运算

(NOR)


$$Y_2 = \overline{A + B}$$



(3) 与或非运算

(AND - OR - INVERT)

$$Y_3 = \overline{AB + CD}$$




(真值表略)



(4) 异或运算

(Exclusive—OR)



$$Y_4 = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$$

A	B	Y_4
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(5) 同或运算


(异或非)

(Exclusive—NOR)

$$Y_5 = \overline{A \oplus B}$$

$$= \overline{\overline{A}B + A\bar{B}}$$

$$= A \odot B$$



A	B	Y_5
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1












三、基本和常用逻辑运算的逻辑符号

国标符号


曾用符号

美国符号













国标符号



曾用符号



美国符号





1.1.2 公式和定理

一、常量之间的关系(常量: 0 和 1)

与:	$0 \cdot 0 = 0$	或:	$1 + 1 = 1$	非:	$\overline{0} = 1$
	$0 \cdot 1 = 0$		$1 + 0 = 1$		$\overline{1} = 0$
	$1 \cdot 1 = 1$		$0 + 0 = 0$		

二、变量和常量的关系(变量: A 、 B 、 C ...)

与:	$A \cdot 1 = A$	或:	$A + 0 = A$	非:	$A \cdot \overline{A} = 0$
	$A \cdot 0 = 0$		$A + 1 = 1$		$A + \overline{A} = 1$



三、与普通代数相似的定理

交换律 $A \cdot B = B \cdot A$ $A + B = B + A$

结合律 $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

分配律 $A(B + C) = AB + AC$

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

[例 1.1.1] 证明公式 $A + BC = (A + B)(A + C)$

[解] 方法一：公式法

$$\begin{aligned} \text{右式} &= (A + B)(A + C) = A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \\ &= A + AC + AB + BC = A(1 + C + B) + BC \\ &= A + BC = \text{左式} \end{aligned}$$



[例 1.1.1] 证明公式 $A + BC = (A + B)(A + C)$

[解] 方法二：真值表法（将变量的各种取值代入等式两边，进行计算并填入表中）

A	B	C	$B \cdot C$	$A + BC$	$A + B$	$A + C$	$(A + B)(A + C)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

相等



四、逻辑代数的一些特殊定理

同一律

$$A \cdot A = A \quad A + A = A$$

德·摩根定理

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

还原律

$$\overline{\overline{A}} = A$$

[例 1.1.2] 证明：德·摩根定理

A	B	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} + \overline{B}$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0

相等

相等



五、关于等式的两个重要规则

1. 代入规则： 等式中某一变量都代之以一个逻辑函数，则等式仍然成立。

例如，已知 $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ （用函数 $A+C$ 代替 A ）

$$\text{则 } \overline{(A+C)+B} = \overline{A+C} \cdot \overline{B} = \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B}$$

2. 反演规则：

将 Y 式中 “.” 换成 “+”，“+” 换成 “.”
“0” 换成 “1”，“1” 换成 “0”
原变量换成反变量，反变量换成原变量

$\Rightarrow \overline{Y}$

注意：{ 运算顺序：括号 \rightarrow 乘 \rightarrow 加
不属于单个变量上的反号应保留不变



反演规则的应用：求逻辑函数的反函数

将 Y 式中 “.” 换成 “+”，“+” 换成 “.”

“0” 换成 “1”，“1” 换成 “0”

原变量换成反变量，反变量换成原变量

$\Rightarrow \bar{Y}$

例如：已知 $Y_1 = A(B+C) + CD$

运算顺序：
括号 \rightarrow 与 \rightarrow 或

则 $\bar{Y}_1 = (\bar{A} + \bar{B}\bar{C})(\bar{C} + \bar{D})$

已知 $Y_2 = \overline{\overline{A}B} + C + D + C$

不属于单个变量上的反号应保留不变

则 $\bar{Y}_2 = \overline{\overline{\overline{A} + B}} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{C}$



六、若干常用公式

$$(1) AB + A\overline{B} = A(B + \overline{B}) = A$$

$$(2) A + AB = A(1 + B) = A \xrightarrow{\text{推广}} A + A(\quad) = A$$

$$(3) A + \overline{A}B = (A + \overline{A})(A + B) = A + B$$

$$(4) AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$$

$$(5) \overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = \overline{A} \overline{B} + AB$$



公式 (4) 证明: $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$

$$\begin{aligned} \text{左} &= AB + \overline{A}C + (A + \overline{A})BC \\ &= \underline{AB} + \underline{\overline{A}C} + \underline{ABC} + \underline{\overline{A}BC} = AB + \overline{A}C \end{aligned}$$

$A + AB = A$

推论

→ $AB + \overline{A}C + BCD = AB + \overline{A}C$

公式 (5) 证明: $\overline{\overline{A}B} + \overline{\overline{A}B} = \overline{A} \overline{B} + AB$

$$\begin{aligned} \text{左} &= \overline{\overline{A}B} \cdot \overline{\overline{A}B} = (\overline{A} + B)(A + \overline{B}) \\ &= \overline{A} \cdot A + \overline{A} \overline{B} + AB + B \cdot \overline{B} = \overline{A} \overline{B} + AB \end{aligned}$$

即 $\overline{A \oplus B} = A \odot B$ 同理可证 $\overline{A \odot B} = A \oplus B$