

Taller función gamma

Estadística

11 septiembre, 2023

Contenidos

1	Lab2	1
1.1	La función Gamma	1
1.2	Las fórmulas recursivas	2
2	Gráfica función Gamma en los reales	3

1 Lab2

En esta asignatura entrenaremos *cosas* de matemáticas y sus amigos.

1.1 La función Gamma

La función Gamma Γ tiene diversas definiciones en la matemática. La definición que utilizaremos es:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} \cdot e^{-x} dx, \text{ donde } z \in \mathbb{R}.$$

Resolvamos esta integral en el caso $\Gamma(z+1)$ con $z \in \mathbb{R}$. Recordemos que la fórmula integración por partes en este caso es:

$$\int_0^{\infty} u \cdot dv = [u \cdot v]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} v \cdot du.$$

Apliquemos el método de integración por partes a la función Γ

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= \int_0^{\infty} x^z \cdot e^{-x} dx = \left| \begin{array}{ll} u = x^z & dv = e^{-x} \cdot dx \\ du = z \cdot x^{z-1} & v = -e^{-x} \end{array} \right| \\ &= [-x^z \cdot e^{-x}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} z \cdot x^{z-1} \cdot (-e^{-x}) \cdot dx \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^z \cdot e^{-x}) + z \cdot \int_0^{\infty} x^{z-1} \cdot e^{-x} \cdot dx. \end{aligned}$$

como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^z \cdot e^{-x}) = 0$$

tenemos que

$$\Gamma(z+1) = z \cdot \int_0^\infty x^{z-1} \cdot e^{-x} \cdot dx = z \cdot \Gamma(z).$$

Por lo que hemos encontrado una fórmula recursiva, en la que si queremos saber $\Gamma(z+1)$ tenemos que saber que vale $\Gamma(z)$ y utilizar la fórmula anterior.

Además

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty x^{1-1} \cdot e^{-x} dx = \int_0^\infty e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} -e^{-x} - (-e^{-x}) = 0 - (-1) = 1.$$

Por lo tanto si $n \in \mathbb{N}$

- $\Gamma(1) = 1.$
- $\Gamma(2) = 2 \cdot \Gamma(1) = 2 \cdot 1.$
- $\Gamma(3) = 3 \cdot \Gamma(2) = 3 \cdot 2 \cdot \Gamma(1) = 3 \cdot 2 \cdot 1.$
- \dots
- $\Gamma(n) = n \cdot \Gamma(n-1) = n \cdot (n-1) \cdot \Gamma(n-2) = \dots = n \cdot (n-1) \dots 2 \cdot 1 = n!.$

1.2 Las fórmulas recursivas

Las fórmulas recursivas son las que dependen de un valor anterior al que se calcula. La más popular es el factorial

La definición de factorial de un número natural $n \in \mathbb{N}$, es ¡¡obviamente!! recursiva

$$\begin{aligned} \text{factorial} &= n! : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longrightarrow n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1. \end{aligned}$$

Se define con estas reglas:

1. $\text{factorial}(0) = 0! = 1.$
2. $\text{factorial}(n+1) = (n+1)! = (n+1) * \text{factorial}(n).$

En la notación matemática, como ya sabéis el factorial se representa con el símbolo de exclamación/admiración; así

1. $\text{factorial}(0) := 0! = 1.$
2. $\text{factorial}(n+1) := (n+1)! = (n+1) \cdot n!.$

Así tenemos que

- $0! = 1.$
- $1! = 1.$
- $2! = 2 \cdot 1 = 2.$
- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6.$
- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$

-
- $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$.
- $(n+1)! = (n+1) \cdot n! = (n+1) \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$.

En R la función factorial es `factorial(n)` para un $n \in \mathbb{N}$, mientras que la función *Gamma* es `gamma(z)` para un $z \in \mathbb{R}$.

```
factorial(0:10)
```

```
## [1]      1      1      2      6     24     120     720     5040     40320
## [10] 362880 3628800
```

```
gamma((1:10)+1)
```

```
## [1]      1      2      6     24     120     720     5040     40320     362880
## [10] 3628800
```

```
factorial(1:10)==gamma((1:10)+1)
```

```
## [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

```
all(factorial(1:10)==gamma((1:10)+1))
```

```
## [1] TRUE
```

```
gamma(1/2)
```

```
## [1] 1.772454
```

```
sqrt(pi)
```

```
## [1] 1.772454
```

```
gamma(1/2)==sqrt(pi)
```

```
## [1] FALSE
```

```
dplyr::near(gamma(1/2),sqrt(pi))
```

```
## [1] TRUE
```

```
gamma(1/2)-sqrt(pi)
```


```
## [1] 2.220446e-16
```

2 Gráfica función Gamma en los reales

```

curve(gamma(x),xlim=c(1,9),col="red",ylab="Gamma(x)",lwd=2,frame.plot=TRUE,main="Función Gamma")
#axis(2, at = gamma(1:9),labels = gamma(1:9) )
points(x = 1:9,y=factorial(0:8))

```



```
gamma(1:10)
```

```
## [1] 1 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880
```