

Phụ lục D — Bảng công thức chỉ số đánh giá dự báo

Công thức, ý nghĩa, **khi nào dùng / khi nào không**, và cách các thư viện cài đặt khác nhau. Mọi con số trong ví dụ lấy từ lần chạy thật (NumPy 2.5.3, pandas 2.3.3, utilsforecast 0.2.16, scoringrules 0.11.0, ngày 2026-09-17).

Trạng thái: bản khởi đầu (Phase 0). Buổi 14 (chỉ số), 15 (Diebold–Mariano) và 25 (dự báo xác suất) bổ sung ví dụ trên dữ liệu thật và đối chiếu với `tv.danh_gia`.

Quy ước ký hiệu (theo FPP 5.8): giá trị thật y_t , dự báo $\hat{y}_t$, sai số $e_t = y_t - \hat{y}_t$ (dương = dự báo **thấp** hơn thực tế). Trung bình lấy trên các điểm của tập đánh giá. T là số quan sát huấn luyện, m là chu kỳ mùa vụ.

Mục lục

- 1. Chọn chỉ số theo quyết định
- 2. Chỉ số cho dự báo điểm
- 3. Chỉ số có chia thang (MASE, RMSSE) và biến thể M5
- 4. Chỉ số cho dự báo quantile và khoảng
- 5. Chỉ số cho dự báo phân phối: CRPS
- 6. Dự báo xác suất sự kiện: Brier, log score
- 7. Skill score
- 8. So hai mô hình: Diebold–Mariano
- 9. Ví dụ tính tay đã kiểm
- 10. Thư viện tính khác nhau thế nào
- 11. Bẫy thường gặp
- Nguồn

1. Chọn chỉ số theo quyết định

Gneiting (2011) cảnh báo cách làm phổ biến "can lead to grossly misguided inferences, unless the scoring function and the forecasting task are carefully matched": mỗi hàm mất mát thưởng cho một **đại lượng** khác nhau của phân phối dự báo.

Hàm mất mát	Dự báo tối ưu là	Hợp khi
sai số bình phương (MSE, RMSE, RMSSE)	trung bình	chi phí tăng theo bình phương sai số; cần tổng đúng (tổng nhiều SKU)
sai số tuyệt đối (MAE, MASE, WAPE)	trung vị	chi phí tỷ lệ với độ lệch, đối xứng
pinball mức τ	quantile τ	chi phí bất đối xứng (thiếu hàng đắt hơn tồn kho)
sai số phần trăm tuyệt đối (MAPE)	một đại lượng không chuẩn, "tends to support severe underforecasts"	hầu như không nên dùng để chọn mô hình
CRPS, WIS, log score	cả phân phối	quyết định cần khoảng hoặc xác suất

2. Chỉ số cho dự báo điểm

Chỉ số	Công thức	Đơn vị	Ghi chú
MAE	$\text{mean}(e_t)$	như dữ liệu	tối ưu ở trung vị
RMSE	$\sqrt{\text{mean}(e_t^2)}$	như dữ liệu	tối ưu ở trung bình; nhạy với sai số lớn
ME (bias)	$\text{mean}(e_t)$	như dữ liệu	dương = dự báo thấp có hệ thống (theo quy ước $e = y - \hat{y}$)
MAPE	$\text{mean}(100 e_t / y_t)$	%	vô hạn/không xác định khi $y_t = 0$
sMAPE	$\text{mean}(200 y_t - \hat{y}_t / (y_t + \hat{y}_t))$	0-200	FPP và Hyndman & Koehler khuyên không dùng
WAPE	$\sum_t e_t / \sum_t y_t $	tỷ lệ	còn gọi MAD/Mean ratio

MAPE. FPP: sai số phần trăm "infinite or undefined if $y_t = 0$ " và chỉ có nghĩa khi đơn vị đo có số 0 có ý nghĩa (không dùng cho nhiệt độ °C). Hyndman & Koehler (2006): phân phối "extremely skewed when any Y_t is close to zero". Với $y_t > 0$ cố định và dự báo không âm, dự báo thấp thì sai số phần trăm bị chặn ở 100% còn dự báo cao thì không bị chặn — FPP tóm lại là MAPE phạt nặng sai số âm (dự báo cao) hơn sai số dương.

sMAPE. FPP: "the value of sMAPE can be negative" (khi $y_t + \hat{y}_t < 0$) — tên "symmetric" gây hiểu nhầm; Hyndman & Koehler (2006) "recommend that the sMAPE not be used".

WAPE. Hyndman (2025) ghi WAPE "was introduced by Kolassa & Schütz (2007) who called it the MAD/ Mean ratio"; tối ưu WAPE dẫn tới dự báo trung vị, và chỉ số này "only consistent when the time series is stationary".

3. Chỉ số có chia thang (MASE, RMSSE) và biến thể M5

Chia sai số cho sai số **trong mẫu huấn luyện** của một phương pháp naive để so được giữa các chuỗi khác đơn vị. Hyndman & Koehler (2006) đề xuất MASE "become the standard measure for comparing forecast accuracy across multiple time series".

$$\text{MASE} = \frac{\text{mean}(|e_j|)}{\frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^T |y_t - y_{t-m}|} \quad \text{RMSSE} = \sqrt{\frac{\text{mean}(e_j^2)}{\frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^T (y_t - y_{t-m})^2}}$$

$m = 1$ cho dữ liệu không mùa vụ (naive), $m =$ chu kỳ mùa cho dữ liệu mùa vụ (seasonal naive).

Độc đúng: $\text{MASE} < 1$ nghĩa là dự báo tốt hơn sai số **một bước trong mẫu** của (seasonal) naive — **không** có nghĩa là thắng seasonal naive trên tập test ở cùng tầm dự báo. Muốn biết thắng baseline không, chạy baseline trên cùng backtest (buổi 14-15).

M5 (Makridakis et al., hướng dẫn thi M5):

$$\text{RMSSE} = \sqrt{\frac{\frac{1}{h} \sum_{t=n+1}^{n+h} (Y_t - \widehat{Y}_t)^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{t=2}^n (Y_t - Y_{t-1})^2}} \quad \text{WRMSSE} = \sum_i w_i \text{RMSSE}_i$$

- Mẫu số chỉ tính từ **sau lần bán đầu tiên khác 0** của chuỗi.
- Trọng số w_i theo **doanh thu** (số lượng $\times$ giá) của 28 ngày cuối tập huấn luyện, tổng bằng 1 ở mỗi cấp gộp.
- Lý do dùng bình phương thay vì tuyệt đối: sai số tuyệt đối "optimized for the median" sẽ thưởng cho dự báo gần 0 trên chuỗi bán gián đoạn.

M5 phần bất định dùng **scaled pinball loss** (SPL) tại 9 mức

$u \in \{0.005, 0.025, 0.165, 0.25, 0.5, 0.75, 0.835, 0.975, 0.995\}$, chia cho mẫu số dạng tuyệt đối

$$\frac{1}{n-1} \sum |Y_t - Y_{t-1}|.$$

4. Chỉ số cho dự báo quantile và khoảng

Pinball loss / quantile score cho dự báo quantile $q_{\tau,t}$:

$$L_{\tau}(y_t, q_{\tau,t}) = \begin{cases} \tau (y_t - q_{\tau,t}) & y_t \geq q_{\tau,t} \\ (1 - \tau) (q_{\tau,t} - y_t) & y_t < q_{\tau,t} \end{cases}$$

FPP 5.9 định nghĩa **quantile score có nhân 2** (để tại $\tau = 0.5$ bằng sai số tuyệt đối) và ghi "The multiplier of 2 is often omitted". Hướng dẫn M5 và `utilsforecast.quantile_loss` **không** nhân 2.

Winkler score / interval score cho khoảng $[\ell_t, u_t]$ danh nghĩa $100(1 - \alpha)\%$ (FPP 5.9; Gneiting & Raftery 2007 gọi là interval score):

$$W_{\alpha,t} = (u_t - \ell_t) + \frac{2}{\alpha} (\ell_t - y_t) 1\{y_t < \ell_t\} + \frac{2}{\alpha} (y_t - u_t) 1\{y_t > u_t\}$$

Thưởng khoảng hẹp, phạt nặng khi giá trị thật rơi ra ngoài. FPP: $W_{\alpha,t} = (Q_{\alpha/2,t} + Q_{1-\alpha/2,t})/\alpha$ với Q là quantile score.

Weighted interval score (WIS) — Bracher, Ray, Gneiting & Reich (2021) — gộp trung vị m và K khoảng mức $\alpha_1, \dots, \alpha_K$:

$$\text{WIS} = \frac{1}{K + 1/2} \left(w_0 |y - m| + \sum_{k=1}^K w_k \text{IS}_{\alpha_k} \right), \quad w_0 = \frac{1}{2}, \quad w_k = \frac{\alpha_k}{2}$$

Bài báo: với trọng số này "WIS $\approx$ CRPS"; với $K = 0$ WIS bằng sai số tuyệt đối. Dạng tương đương theo $2K + 1$ quantile: $\frac{1}{2K + 1} \sum_k 2\{1(y \leq q_{\tau_k}) - \tau_k\}(q_{\tau_k} - y)$.

Coverage (tỷ lệ phủ): tỷ lệ giá trị thật nằm trong khoảng. Coverage **không phải** một scoring rule — khoảng vô hạn luôn phủ 100%. Luôn báo cùng độ rộng khoảng hoặc dùng Winkler/WIS.

5. Chỉ số cho dự báo phân phối: CRPS

Gneiting & Raftery (2007) định nghĩa cho phân phối dự báo có CDF F và giá trị thật x :

$$\text{CRPS}(F, x) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(F(y) - 1_{\{y \geq x\}} \right)^2 dy = \mathbb{E}_F |X - x| - \frac{1}{2} \mathbb{E}_F |X - X'|$$

với X, X' độc lập cùng phân phối F (dạng kernel, eq. 21). Hai hệ quả:

- CRPS là "the integral of the Brier scores" tại mọi ngưỡng; FPP điển đạt là trung bình quantile score trên mọi mức p .
- Với dự báo điểm (phân phối suy biến), CRPS **bằng sai số tuyệt đối** — so được trực tiếp dự báo xác suất với dự báo điểm.

Phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, $z = (x - \mu)/\sigma$:

$$\text{CRPS} = \sigma \left[z \left(2\Phi(z) - 1 \right) + 2\varphi(z) - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right]$$

Từ M mẫu (dự báo dạng sample path / ensemble), ước lượng năng lượng: $\frac{1}{M} \sum_i |x_i - y| - \frac{1}{2M^2} \sum_{i,j} |x_i - x_j|$

6. Dự báo xác suất sự kiện: Brier, log score

Brier score cho xác suất dự báo p_i và kết quả $o_i \in \{0, 1\}$: $\text{BS} = \frac{1}{N} \sum_i (p_i - o_i)^2$.

Phân rã Murphy (1973) — nhóm dự báo theo các giá trị xác suất p_k , n_k lần, tần suất thật $\bar{o}_k$, tần suất chung $\bar{o}$:

$$\text{BS} = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_k n_k (p_k - \bar{o}_k)^2}_{\text{reliability (nhỏ = tốt)}} - \underbrace{\frac{1}{N} \sum_k n_k (\bar{o}_k - \bar{o})^2}_{\text{resolution (lớn = tốt)}} + \underbrace{\bar{o}(1 - \bar{o})}_{\text{uncertainty}}$$

Đẳng thức đúng chính xác khi mỗi nhóm có đúng một giá trị xác suất (như ví dụ mục 9).

Log score: $-\log p(\text{kết quả xảy ra})$. Gneiting & Raftery (2007) ghi nhận nó "has been criticized for its unboundedness" — một dự báo xác suất 0 cho sự kiện rồi xảy ra cho điểm vô hạn.

7. Skill score

So với một dự báo tham chiếu (FPP 5.9):

$$\text{Skill} = \frac{\text{Score}_{\text{tham chiếu}} - \text{Score}_{\text{mô hình}}}{\text{Score}_{\text{tham chiếu}}}$$

FPP: "When the data are seasonal, SeasonalNaive() should be used as the benchmark." Theo WWRP/WGNE, Brier skill score "Not strictly proper" — không dùng nó để tối ưu mô hình.

8. So hai mô hình: Diebold-Mariano

Chuỗi chênh lệch mất mát $d_t = g(e_{1t}) - g(e_{2t})$ trên n dự báo tầm h . Harvey, Leybourne & Newbold (1997):

$$S_1 = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{V}(\bar{d})}}, \quad \widehat{V}(\bar{d}) \approx \frac{1}{n} \left[\hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^{h-1} \hat{\gamma}_k \right], \quad S_1^* = \left[\frac{n+1-2h+n^{-1}h(h-1)}{n} \right]^{1/2} S_1$$

S_1^* so với **phân phối Student-t** $n-1$ **bậc tự do**. Bài báo cho biết kiểm định gốc "was found to be quite seriously over-sized for moderate numbers of sample observations" — bác bỏ giả thuyết "hai mô hình bằng nhau" quá dễ khi mẫu nhỏ. `forecast::dm.test` của R cài đặt bản hiệu chỉnh này.

9. Ví dụ tính tay đã kiểm

Dự báo điểm. Chuỗi huấn luyện mùa vụ $m = 4$: 10 20 30 20 12 22 33 21 13 24 35 23; test $y =$ 14 25 36 24, dự báo $\hat{y} =$ 12 27 30 25.

Đại lượng	Tự tính (NumPy)	utilsforecast 0.2.16
$e = y - \hat{y}$	2, -2, 6, -1	
MAE	2,75	mae 2,75
RMSE	3,3541	rmse 3,3541
ME	1,25	bias -1,25 (định nghĩa $\hat{y} - y$)
MAPE	10,7798%	mape 0,107798 (tỷ lệ)
sMAPE (FPP, 0-200)	11,3351	smape 0,056675 (thang 0-1)
WAPE	0,1111	nd 0,1111
mẫu số MASE: $\text{mean} y_t - y_{t-4} $	1,875	
MASE	1,4667	mase 1,4667
RMSSE (mẫu số MSE 3,875)	1,7039	rmsse 1,7039

MASE = 1,47 > 1: sai số trên test lớn hơn sai số seasonal naive một bước trong mẫu.

Pinball. Quantile $\tau = 0.9$ dự báo 11 23 31 22 cho cùng y : pinball (không nhân 2) = 2,70; quantile score của FPP (nhân 2) = 5,40; `utilsforecast.quantile_loss` = 2,70.

WIS. $y = 10$, trung vị 8, khoảng 80% ($\alpha = 0,2$) là [6, 9], khoảng 50% ($\alpha = 0,5$) là [7; 8,5]:
 $IS_{0,2} = 3 + \frac{2}{0,2} \cdot 1 = 13$; $IS_{0,5} = 1,5 + \frac{2}{0,5} \cdot 1,5 = 7,5$; $WIS = (0,5 \cdot 2 + 0,1 \cdot 13 + 0,25 \cdot 7,5)/2,5 = 1,67$. Dạng quantile (5 quantile 0,1 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 0,9) cũng ra **1,67**.

CRPS. $N(0, 1)$, giá trị thật 0,8: công thức đóng = 0,4762 (`scoringrules.crps_normal` 0,4762); ước lượng năng lượng từ 4.000 mẫu (seed 3) = 0,4632.

Brier. Xác suất .1 .1 .1 .1 .7 .7 .7 .7 .7 .9, kết quả 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1: BS = 0,170; reliability 0,015; resolution 0,085; uncertainty 0,240; 0,015 – 0,085 + 0,240 = 0,170.

Diebold-Mariano. Hai chuỗi sai số 40 điểm (seed 11), mất mát bình phương, $h = 1$: $S_1 = -1,455$, $p = 0,146$ (chuẩn); $S_1^* = -1,437$, $p = 0,159$ (t_{39}). Không đủ bằng chứng một mô hình tốt hơn.

10. Thư viện tính khác nhau thế nào

Thư viện / nguồn	Điểm khác	Hậu quả nếu không để ý
utilsforecast 0.2.16 <code>smape</code>	$ y - \hat{y} /(y + \hat{y})$, thang 0-1	con số nhỏ hơn FPP/M4 200 lần

Thư viện / nguồn	Điểm khác	Hậu quả nếu không để ý
<code>utilsforecast mape</code>	tỷ lệ, không nhân 100; $y = 0$ bị bỏ khỏi trung bình	"MAPE 0,1" tưởng là 0,1%
<code>utilsforecast bias</code>	$\hat{y} - y$ (ngược dấu e của FPP)	đọc ngược hướng chệch
<code>utilsforecast quantile_loss</code>	không nhân 2	lệch 2 lần so với quantile score FPP
<code>scoringrules 0.11.0</code> <code>weighted_interval_score</code> (backend mặc định, không numba)	cho 2,87 thay vì 1,67 ở ví dụ mục 9 — nhánh này cộng trọng số $\times$ trung vị thay vì $\times y - \text{trung vị} $	WIS sai; tự viết theo công thức Bracher hoặc kiểm với ví dụ trên
<code>statsmodels / FPP ACF</code>	xem Phụ lục C mục 6	
<code>proberscoring</code>	bản cuối 0.1 (2015), repo đã archive (09/2026)	dùng <code>scoringrules</code> cho CRPS (<code>crps_normal</code> , <code>crps_ensemble</code> khớp ví dụ mục 9)

11. Bẫy thường gặp

Bẫy	Vì sao sai	Làm đúng
Báo MAPE cho chuỗi có số 0 hoặc gần 0	vô hạn, hoặc phân phối cực lệch	MASE, RMSSE, WAPE
So sMAPE giữa hai báo cáo	thang 0–200, 0–100 và 0–1 cùng tên	ghi công thức và thang
$MASE < 1 \rightarrow$ "thắng seasonal naive"	mẫu số là sai số một bước trong mẫu	chạy seasonal naive trên cùng backtest
Tối ưu MAE/MASE cho chuỗi bán gián đoạn	tối ưu trung vị $\rightarrow$ thưởng dự báo 0	RMSSE (lý do M5 dùng) hoặc chỉ số theo chi phí tồn kho
Chọn mô hình theo MAPE	MAPE thưởng dự báo thấp (Gneiting 2011)	chỉ số khớp với hàm chi phí
Chỉ báo coverage	khoảng rộng vô tận cũng phủ 100%	Winkler/WIS/CRPS kèm coverage
Trộn pinball có và không nhân 2	chênh đúng 2 lần	ghi quy ước; WIS dạng quantile có nhân 2
WIS "bằng" CRPS	chỉ xấp xỉ, sát hơn khi nhiều khoảng	ghi rõ số khoảng K
Brier skill score để tối ưu	không strictly proper	tối ưu Brier, báo skill để so sánh
DM với ngưỡng chuẩn trên mẫu nhỏ	bác bỏ quá dễ	bản HLN với t_{n-1}
WRMSSE trọng số theo số lượng bán	M5 dùng doanh thu 28 ngày cuối	số lượng $\times$ giá

Nguồn

Truy cập ngày 2026-09-17. Nhật ký research: [tools/NGHIEN-CUU.md](https://tools/ngghien-cuu.md).

- Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. et al. *FPP, the Pythonic Way* — mục 5.8, 5.9: <https://otexts.com/fpppy/05-toolbox.html>

- Hyndman, R.J. & Koehler, A.B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting* 22(4), 679–688. Preprint: <https://robjhyndman.com/papers/mase.pdf>
- Hyndman, R.J. (2025). WAPE (Hyndsight): <https://robjhyndman.com/hyndsight/wape.html>
- Makridakis, S. et al. M5 Competitors' Guide: <https://github.com/Mcompetitions/M5-methods/blob/master/M5-Competitors-Guide.pdf>
- Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *JASA* 106(494), 746–762. <https://arxiv.org/abs/0912.0902>
- Gneiting, T. & Raftery, A.E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *JASA* 102, 359–378. <https://sites.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf>
- Bracher, J., Ray, E.L., Gneiting, T. & Reich, N.G. (2021). Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLoS Computational Biology* 17(2), e1008618. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008618>
- Murphy, A.H. (1973). A new vector partition of the probability score. *J. Applied Meteorology* 12, 595–600 (qua trang WWRP/WGNE: <https://www.cawcr.gov.au/projects/verification/>)
- Harvey, D., Leybourne, S. & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting* 13, 281–291.
- `utilsforecast` 0.2.16 (đọc mã nguồn `losses.py` trong gói): <https://pypi.org/project/utilsforecast/>
- `scoringrules` 0.11.0: <https://pypi.org/project/scoringrules/>