**TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ**
**TỔ LÍ – HÓA – CÔNG NGHỆ**
**ĐỀ CHÍNH THỨC**
*(Đề thi có 03 trang)*

**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2026 – 2027**
**MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12**
*Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)*
**MÃ ĐỀ: 101**

*Họ, tên thí sinh: .....Lớp: .....Số báo danh: .....*

*(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Ag = 108).*

## (BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

## BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO NHANH (MÃ ĐỀ 101)

### 1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (12 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đ/A | B | B | C | A | C | A | D | A | B | A | B | C |

### 2. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

| Câu | Lệnh a) | Lệnh b) | Lệnh c) | Lệnh d) |
|---|---|---|---|---|
| Câu 1 | Đ | S | Đ | Đ |
| Câu 2 | Đ | Đ | S | Đ |

### 3. PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

| Câu hỏi | Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đáp án | 3 | 4 | 2 | 16,3 |

### 4. PHẦN IV: TỰ LUẬN (3 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

- **Câu 1 (1,0 điểm):** a) Ống 1 không tráng bạc; Ống 2 xuất hiện lớp bạc sáng bóng bám vào thành ống. b) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+,\ t^\circ} C_6H_{12}O_6$ (glucose) + $C_6H_{12}O_6$ (fructose).
- **Câu 2 (1,0 điểm):** a) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \longrightarrow 3\,C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$. b) $m_{\text{glycerol}} =$ **1,656** kg. c) Số bánh xà phòng tối đa: **209 bánh**.
- **Câu 3 (1,0 điểm):** a) $m_{\text{ethanol (LT)}} =$ **368** kg. b) Thể tích cồn y tế 70° tối đa: **525,71 lít**.

colorhfGreen height 0.5pt

## PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Chất nào sau đây là ester?

**A.** $CH_3COOH$. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C.** $C_2H_5OH$. **D.** $CH_3CHO$.

**Câu 2.** Thủy phân hoàn toàn ethyl acetate trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm

**A.** $CH_3COONa$ và $CH_3OH$. **B.** $CH_3COONa$ và $C_2H_5OH$.

**C.** $C_2H_5COONa$ và $CH_3OH$. **D.** $HCOONa$ và $C_2H_5OH$.

**Câu 3.** Phát biểu nào sau đây **không đúng** về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp?

**A.** Xà phòng thường là muối sodium hoặc potassium của các acid béo.

**B.** Khi giặt rửa trong nước cứng, xà phòng bị giảm tác dụng tẩy rửa do tạo muối kết tủa.

**C.** Phân tử chất giặt rửa tổng hợp không có đầu ưa nước và đuôi kị nước như xà phòng.

**D.** Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là có thể sử dụng được trong nước cứng và môi trường acid nhẹ.

**Câu 4.** Carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

**A.** Glucose. **B.** Saccharose. **C.** Maltose. **D.** Tinh bột.

**Câu 5.** Trong điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn màu trắng, dạng sợi, không mùi, không tan trong nước và là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật?

**A.** Glucose. **B.** Saccharose. **C.** Cellulose. **D.** Amylose.

**Câu 6.** Thuốc thử dùng để nhận biết hồ tinh bột bằng phản ứng tạo dung dịch màu xanh tím đặc trưng là

**A.** dung dịch iodine ($I_2$). **B.** thuốc thử Tollens. **C.** dung dịch $Cu(OH)_2$. **D.** nước bromine.

**Câu 7.** Trong các chất sau, chất nào có lực base **yếu nhất**?

**A.** Methylamine. **B.** Dimethylamine. **C.** Ammonia. **D.** Aniline.

**Câu 8.** Amino acid đơn giản nhất có tên gọi là glycine. Công thức phân tử của glycine là

**A.** $C_2H_5NO_2$. **B.** $C_3H_7NO_2$. **C.** $C_4H_9NO_2$. **D.** $C_5H_9NO_4$.

**Câu 9.** Số liên kết peptide trong một phân tử tripeptide Gly-Ala-Val là

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

**Câu 10.** Hiện tượng protein bị đông tụ và tách ra khỏi dung dịch xảy ra khi

**A.** đun nóng dung dịch lòng trắng trứng.

**B.** hòa tan lòng trắng trứng vào nước lạnh.

**C.** thêm nước cất vào dung dịch lòng trắng trứng.

**D.** khuấy đều dung dịch lòng trắng trứng ở nhiệt độ thường.

**Câu 11.** Thuốc thử dùng để phân biệt tripeptide với dipeptide bằng phản ứng màu biuret là

**A.** dung dịch $AgNO_3/NH_3$. **B.** $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm.

**C.** nước bromine. **D.** dung dịch $I_2$ trong KI.

**Câu 12.** Phát biểu nào sau đây về enzyme là **không đúng**?

**A.** Hầu hết các enzyme có bản chất là protein.

**B.** Enzyme là chất xúc tác sinh học có tính đặc hiệu rất cao.

**C.** Enzyme xúc tác cho các phản ứng sinh hóa ở nhiệt độ rất cao (trên 150°C) để tăng tốc độ phản ứng.

**D.** Tốc độ của phản ứng do enzyme xúc tác thường lớn hơn rất nhiều so với chất xúc tác hóa học thông thường.

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 13.** Glucose và cellulose là hai carbohydrate phổ biến trong tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong sự sống và sản xuất công nghiệp. Cho các phát biểu sau:

**a)** Glucose có công thức phân tử là $C_6H_{12}O_6$, ở dạng mạch hở phân tử có chứa 5 nhóm hydroxy (−OH) và 1 nhóm aldehyde (−CHO)..

**b)** Phân tử cellulose được cấu tạo từ các đơn vị $\alpha$-glucose liên kết với nhau qua liên kết $\alpha$-1,4-glycoside tạo thành mạch phân nhánh..

**c)** Thủy phân hoàn toàn cellulose trong môi trường acid vô cơ đun nóng thu được sản phẩm duy nhất là glucose, dung dịch sản phẩm có phản ứng tráng bạc với thuốc thử Tollens..

**d)** Đun nóng 32,4 kg cellulose với lượng dư hỗn hợp $HNO_3$ đặc trong $H_2SO_4$ đặc, thu được cellulose trinitrate $[C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n$ dùng làm thuốc súng không khói. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%, khối lượng cellulose trinitrate thu được là 47,52 kg..

**Câu 14.** Cho các hợp chất hữu cơ chứa nitrogen gồm: methylamine ($CH_3NH_2$), aniline ($C_6H_5NH_2$), glycine ($H_2N-CH_2-COOH$), glutamic acid và tripeptide Gly-Ala-Val. Cho các phát biểu sau:

**a)** Ở điều kiện thường, methylamine là chất khí có mùi khai khó chịu, độc, tan nhiều trong nước và làm quỳ tím ẩm hóa xanh..

**b)** Glycine là amino acid đơn giản nhất, ở trạng thái tinh thể tồn tại chủ yếu dưới dạng ion lưỡng cực ($^+H_3N-CH_2-COO^-$)..

**c)** Dung dịch glutamic acid làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh tương tự như dung dịch lysine..

**d)** Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptide Gly-Ala-Val trong dung dịch chứa 0,4 mol NaOH đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 38,7 gam chất rắn khan..

## PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.*

**Câu 15.** Cho các chất sau: sodium stearate, sodium dodecylbenzenesulfonate, saccharose, glycerol, potassium palmitate, ethyl acetate. Có bao nhiêu chất là thành phần chính của xà phòng hoặc chất giặt rửa tổng hợp?

**Câu 16.** Trong các amine sau: methylamine, dimethylamine, trimethylamine, ethylamine, aniline; có bao nhiêu amine ở thể khí ở điều kiện thường?

**Câu 17.** Nhỏ từng giọt dung dịch của mỗi chất sau vào các mẩu giấy quỳ tím riêng biệt: glycine, ethylamine, aniline, lysine, glutamic acid. Có bao nhiêu chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

**Câu 18.** Cho 9,0 gam ethylamine ($C_2H_5NH_2$) tác dụng vừa đủ với dung dịch hydrochloric acid (HCl). Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng muối ethylammonium chloride ($C_2H_5NH_3Cl$) thu được là bao nhiêu gam?

## PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

*Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi hoặc giấy làm bài thi. Điểm tối đa: 3,0 điểm.*

**Câu 19.** **(1,0 điểm)** Có hai ống nghiệm chứa dung dịch saccharose không màu. Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- *Ống nghiệm 1:* Thêm lượng dư thuốc thử Tollens $[Ag(NH_3)_2]OH$, sau đó ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng (khoảng $70-80°C$) trong 5 phút.
- *Ống nghiệm 2:* Thêm 1 mL dung dịch $H_2SO_4$ 10% rồi đun nóng nhẹ trong 5 phút. Để nguội, trung hòa acid dư bằng dung dịch NaOH loãng, sau đó thêm lượng dư thuốc thử Tollens và ngâm trong cốc nước nóng.

a) Hãy nêu hiện tượng quan sát được ở mỗi ống nghiệm.
b) Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân xảy ra ở ống nghiệm 2 và phản ứng tráng bạc giải thích hiện tượng quan sát được.

**Câu 20.** **(1,0 điểm)** Một cơ sở sản xuất xà phòng thủ công tiến hành xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 kg một loại chất béo chứa 90% khối lượng là tristearin $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ (còn lại là tạp chất trơ không phản ứng) bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, đun nóng.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH.
b) Tính khối lượng glycerol thu được sau phản ứng (giả sử hiệu suất phản ứng xà phòng hóa đạt 100%).
c) Toàn bộ lượng muối sodium stearate ($C_{17}H_{35}COONa$) thu được sau khi cô đặc và phối trộn phụ gia (chiếm 25% khối lượng bánh xà phòng thương phẩm) được ép thành các bánh xà phòng. Mỗi bánh xà phòng có khối lượng 100 gam và hiệu suất thu hồi xà phòng đạt 95%. Tính số bánh xà phòng tối đa mà cơ sở trên sản xuất được.

**Câu 21.** **(1,0 điểm)** Để sản xuất cồn y tế 70° (dung dịch ethanol 70% theo thể tích) phục vụ sát trùng trong y tế, người ta sử dụng nguyên liệu ban đầu là 1 tấn hạt ngô chứa 64,8% tinh bột (còn lại là chất xơ và tạp chất trơ không sinh cồn). Quá trình sản xuất trải qua hai giai đoạn theo sơ đồ sau:

$$(C_6H_{10}O_5)_n \xrightarrow{+H_2O,\ \text{enzyme/acid}} nC_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{lên men}} 2\,nC_2H_5OH + 2\,nCO_2$$

a) Tính khối lượng ethanol lý thuyết thu được từ 1 tấn hạt ngô trên.
b) Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất trên đạt 80% và khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là $D = 0{,}8$ g/mL. Tính thể tích (lít) dung dịch cồn y tế 70° tối đa pha chế được từ lượng ethanol thực tế thu được.

**———- HẾT ———-**