SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 6
(HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID)
MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

MÃ ĐỀ: 117

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Chất nào sau đây là acetic aldehyde?
A. HCHO. **B.** CH_3CHO. **C.** C_2H_5OH. **D.** C_2H_6.

Câu 2. Tên theo danh pháp thay thế của chất $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$ là gì?
A. Propan-1-al. **B.** propanal. **C.** butanal. **D.** butyraldehyde.

Câu 3. Benzaldehyde tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường base ($t°C$) thu được kết tủa màu đỏ gạch là
A. Cu. **B.** Cu_2O. **C.** CuO. **D.** Cu_2O, Cu.

Câu 4. Phản ứng giữa CH_3CHO với HCN thuộc loại phản ứng
A. phản ứng thuận nghịch. **B.** phản ứng cộng.
C. phản ứng thế. **D.** phản ứng phân hủy.

Câu 5. **[KNTT - SBT]** Có bốn chất lỏng có thể tích bằng nhau là ethanol, acetone, acetaldehyde, acetic acid. Tiến hành chưng cất hỗn hợp này, sau một thời gian, hàm lượng chất nào trong bình chưng cất còn lại lớn nhất?
A. Ethanol. **B.** Acetone. **C.** Acetaldehyde. **D.** Acetic acid.

Câu 6. **[KNTT - SBT]** Cho ba chất lỏng riêng biệt sau: C_2H_5OH, CH_3CHO, CH_3COOH. Cách nào sau đây phù hợp để phân biệt ba chất lỏng trên?
A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng dung dịch NaOH.
B. Dùng quỳ tím, sau đó dùng dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3.
C. Dùng Na sau đó dùng dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3.
D. Dùng Na sau đó dùng quỳ tím.

Câu 7. **(SBT - CD)** Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$?
A. Acetaldehyde, but-1-yne, ethylene. **B.** Acetaldehyde, acetylene, but-2-yne.
C. Formaldehyde, vinylacetylene, propyne. **D.** Formaldehyde, acetylene, ethylene.

Câu 8. **(SBT - CD)** Trong các chất sau: (1) CH_3CH_2CHO, (2) $CH_3CH(OH)CH_3$, (3) $(CH_3)_2CHCHO$, (4) $CH_2=CHCH_2OH$. Những chất nào phản ứng với H_2 (Ni, $t°$) hoặc $NaBH_4$ sinh ra cùng một sản phẩm?
A. (1) và (4). **B.** (2) và (4). **C.** (1) và (2). **D.** (3) và (4).

Câu 9. **(SBT - CTST)** Cho dãy các chất sau: HCHO, CH_3COOH, CH_3CHO, HCOOH, C_2H_5OH. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 10. Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử $C_3H_6O_2$. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với $NaHCO_3$ còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. C_2H_5COOH và $HCOOC_2H_5$.
B. $HCOOC_2H_5$ và $HOCH_2COCH_3$.
C. $HCOOC_2H_5$ và $HOCH_2CH_2CHO$.
D. C_2H_5COOH và $CH_3CH(OH)CHO$.

Câu 11. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra acetic acid là:

A. CH_3CHO, C_2H_5OH, $C_2H_5COOCH_3$.
B. CH_3CHO, $C_6H_{12}O_6$ (glucose), CH_3OH.
C. CH_3OH, C_2H_5OH, CH_3CHO.
D. $C_2H_4(OH)_2$, CH_3OH, CH_3CHO.

Câu 12. Để điều chế CH_3CHO từ Al_4C_3 cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 13. Cho dãy các chất: HCHO, CH_3COOH, HCOONa, HCOOH, C_2H_5OH, $HCOOCH_3$. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 14. Aldehyde bị khử bằng $NaBH_4$ hoặc $LiAlH_4$ sinh ra

A. alcohol bậc hai. **B.** alcohol bậc một. **C.** ketone. **D.** alcohol bậc ba.

Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng: $C_2H_5OH \longrightarrow X \longrightarrow CH_3COOH$ (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Chất X là

A. HCHO. **B.** C_2H_5CHO. **C.** CH_4. **D.** CH_3CHO.

Câu 16. **(SBT - CTST)** Trung hoà 100 mL dung dịch carboxylic acid (X) nồng độ 0,1 M cần vừa đủ 16 gam dung dịch NaOH 5%, thu được 1,48 gam muối. Công thức cấu tạo của (X) là

A. $HOOC-CH_2-COOH$.
B. $HOOC-COOH$.
C. CH_3-COOH.
D. $HOOC-CH_2-CH_2-COOH$.

Câu 17. **(SBT - CTST)** Cho dung dịch acetic acid có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 20% thu được dung dịch muối sodium acetate có nồng độ 10,25%. Giá trị của x là

A. 10%. **B.** 15%. **C.** 18,67%. **D.** 20%.

Câu 18. **(SBT - CD)** Acetic acid được tổng hợp từ nguồn khí than đá theo các phản ứng sau:

$$(1)\ CO + 2\,H_2 \xrightarrow{t^\circ,\ xt} CH_3OH$$

$$(2)\ CH_3OH + CO \xrightarrow{t^\circ,\ xt} CH_3COOH$$

Giả sử hiệu suất của các phản ứng (1) và (2) đều đạt 90%. Để sản xuất 1000 lít acetic acid ($D = 1,05$ g mL^{-1}), cần thể tích khí CO và H_2 (ở điều kiện chuẩn) lần lượt là

A. $964,06$ m^3 và $1\,928,12$ m^3.
B. $535,6$ m^3 và $1\,071,17$ m^3.
C. $964,06$ m^3 và $964,06$ m^3.
D. $1\,017,6$ m^3 và $1\,071,2$ m^3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Cinnamaldehyde ($C_6H_5CH{=}CHCHO$) là hợp chất tạo mùi đặc trưng của tinh dầu quế. Cho các nhận định sau đây về Cinnamaldehyde:

a) Cinnamaldehyde có đồng phân hình học.
b) Cinnamaldehyde có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
c) Ở điều kiện thường 1 mol Cinnamaldehyde có thể làm mất màu tối đa 1 mol bromine.
d) Cinnamaldehyde phản ứng với Na kim loại giải phóng khí hydrogen.

Câu 20. Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:
Bước 1: Cho 2 mL dung dịch NaOH 10% và 2 mL dung dịch I_2/KI vào ống nghiệm có chứa 0,5 mL


CH_3CHO 10%.
Bước 2: Lắc nhẹ ống nghiệm, hơ nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn hoặc đặt vào cốc nước nóng, sau đó làm nguội.

a) Đây là thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tạo iodoform.
b) Có thể thay CH_3CHO bằng CH_3COCH_3 vẫn thu được hiện tượng tương tự.
c) Sau bước 2, thu được kết tủa màu trắng.
d) Trong phản ứng trên, I_2 đóng vai trò là chất khử.

Câu 21. Malic acid là hợp chất hữu cơ có công thức cấu tạo $HOOC-CH(OH)-CH_2-COOH$, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả táo.

a) Cứ 1 mol malic acid phản ứng được với tối đa 2 mol $NaHCO_3$.
b) Malic là hợp chất hữu cơ đa chức.
c) Công thức phân tử của Malic là $C_5H_8O_4$.
d) Làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu 22. $CH_3(CH_2)_3COOH$ (chất A) là chất lỏng không màu, có mùi khó chịu. Đun nóng A với methanol (CH_3OH) có mặt của chất xúc tác acid sau một vài giờ thu được hỗn hợp chứa A, methanol và một sản phẩm hữu cơ $CH_3(CH_2)_3COOCH_3$ (chất V) có mùi trái cây dễ chịu. Một hợp chất hữu cơ được xác định bằng máy quang phổ IR như sau:



a) Dựa vào quang phổ IR xác định có nhóm chức $-COOH$ của (A).
b) Phổ MS sẽ xác định được khối lượng của chất V thu được từ thí nghiệm trên.
c) Phản ứng của chất A với methanol tạo thành chất V là phản ứng thuận nghịch.
d) Dựa vào quang phổ IR có thể xác định được công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 23. Cho các chất sau: CH_3-CH_2-CHO (1), $CH_2=CH-CHO$ (2), $(CH_3)_2CH-CHO$ (3), $CH_2=CH-CH_2-$ (4). Chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư [H] cùng tạo ra $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ là bao nhiêu chất?

Câu 24. Cho các tác nhân phản ứng: (a) H_2/Pd, $t°$; (b) $LiAlH_4$; (c) $NaBH_4$; (d) dung dịch bromine. Có bao nhiêu tác nhân ở trên có thể chuyển hóa RCHO thành RCH_2OH?

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(1) Aldehyde phản ứng được với nước bromine.

(2) Ketone không phản ứng được với $Cu(OH)_2/OH^-$.


(3) Aldehyde tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ tạo ra bạc.

(4) Trong các hợp chất carbonyl, chỉ aldehyde bị khử bởi $NaBH_4$.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

Câu 26. Để điều chế CH_3CHO từ Al_4C_3 cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng?

Câu 27. Quế có vị cay, mùi thơm nồng, được sử dụng phổ biến làm gia vị, vị thuốc trong Đông y. Hợp chất hữu cơ cinnamaldehyde tạo mùi đặc trưng của quế. Trong phân tử cinnamaldehyde chứa vòng benzene có một nhóm thế. Cinnamaldehyde bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens và có đồng phân hình học dạng trans. Công thức cấu tạo của cinnamaldehyde là:



Phân tử khối của cinnamaldehyde là bao nhiêu?

Câu 28. Hợp chất hữu cơ X được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ. Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta xác định được X chứa 62,07% C; 10,34% H; còn lại là O. Trên phổ MS của X, người ta thấy có peak ion phân tử $[M^+]$ có giá trị m/z bằng 58. Trên phổ IR của X có một peak trong vùng 2380 – 2695 cm^{-1} và một peak trong vùng 1740 – 1685 cm^{-1}. Chất X phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm để tạo ra kết tủa màu đỏ gạch. Xác định tổng số nhóm CH_2 trong công thức cấu tạo của X.

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. *Thí sinh trình bày lời giải chi tiết vào giấy làm bài.*

Câu 29. **(SBT - CTST)** Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào không thể xảy ra? Hoàn thành phương trình hoá học các phản ứng xảy ra.

a) $CH_3CH_2-CO-CH_3 + [O] \longrightarrow$

b) $CH_3CH_2-OH + [O] \longrightarrow$

c) $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{FeBr_3,\ t^\circ}$

d) $(CH_3)_2C(OH)-CH_2CH_3 + [O] \longrightarrow$

Câu 30. Cho thí nghiệm: Chuẩn độ acetic acid bằng dung dịch sodium hydroxide 0,15 M. Sau khi thực hiện thí nghiệm chuẩn độ này 3 lần, thu được bảng dưới đây:

Số lần	**Thể tích acetic acid (mL)**	**Thể tích dung dịch NaOH cần dùng (mL)**
1	6,0	20,0
2	6,0	19,9
3	6,0	20,0

Xác định nồng độ mol của dung dịch acetic acid.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO PHẦN I

1. B	**2. C**	**3. B**	**4. B**	**5. D**	**6. B**	**7. C**	**8. A**	**9. A**
10. D	**11. C**	**12. B**	**13. C**	**14. B**	**15. D**	**16. A**	**17. A**	**18. D**

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO PHẦN II

Câu	**Ý a)**	**Ý b)**	**Ý c)**	**Ý d)**
Câu 1	Đ	Đ	S	S
Câu 2	Đ	Đ	S	S
Câu 3	Đ	S	S	Đ
Câu 4	Đ	S	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO PHẦN III

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**	**Câu 5**	**Câu 6**
3	3	3	3	132	1

———- HẾT ———-