SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang - 28 câu hỏi)

THI THỬ TN THPT QUỐC GIA LẦN 1 – NĂM HỌC 2026-2027
Môn: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian: 50 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: 013

Họ, tên thí sinh: ..... *Lớp:* ..... *Số báo danh:* .....

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; S = 32; Cl = 35,5; Ba = 137)

colorhfGreen height 0.5pt

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 013)

1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (18 CÂU)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đ/A	B	C	D	C	A	B	A	C	B	D
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18		
Đ/A	A	B	B	A	A	D	D	B		

2. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 CÂU)

Câu hỏi	Lệnh a)	Lệnh b)	Lệnh c)	Lệnh d)
Câu 19	Đúng	Sai	Sai	Đúng
Câu 20	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
Câu 21	Đúng	Sai	Đúng	Sai
Câu 22	Sai	Đúng	Sai	Đúng

3. PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6 CÂU)

Câu	Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28
Đáp án	1256	3241	42	1686	29,9	3

colorhfGreen height 0.5pt

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây được sử dụng làm chất giặt rửa tổng hợp?

A. CH_3COOK. **B.** $CH_3[CH_2]_{11}OSO_3Na$. **C.** $C_{15}H_{31}COONa$. **D.** $C_{15}H_{31}COOCH_3$.

Câu 2. Cho dung dịch H_2SO_4 loãng vào dung dịch X thấy sủi bọt khí và sinh ra kết tủa. Dung dịch X là

A. Na_2SO_4. **B.** KNO_3. **C.** $Ba(HCO_3)_2$. **D.** $BaCl_2$.

Câu 3. Một dung dịch baking soda có pH = 8,3. Nồng độ ion OH^- trong dung dịch trên là

A. 5,7 M. **B.** 8,3 M. **C.** $10^{-8,3}$ M. **D.** $10^{-5,7}$ M.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amylose và amylopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Trong phân tử glucose chỉ có 4 nhóm alcohol (OH).


C. Saccharose không tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Glucose và fructose đều làm mất màu nước bromine.

Câu 5. Cho 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn sau: HCl, Na_2SO_4, NaCl, $Ba(OH)_2$. Chỉ dùng thêm 1 thuốc thử nào dưới đây để nhận biết các dung dịch trên?

A. quỳ tím. **B.** H_2SO_4. **C.** $AgNO_3$. **D.** $BaCl_2$.

Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại acid béo omega-3?



A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 7. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp phenyl acetate và ethyl acetate trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. 2 muối và 1 alcohol. **B.** 2 muối và 2 alcohol. **C.** 1 muối và 1 alcohol. **D.** 1 muối và 2 alcohol.

Câu 8. Ester X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$, X có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3. Số công thức cấu tạo của ester X thỏa mãn điều kiện trên là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 9. Các khí sinh ra trong thí nghiệm phản ứng của saccharose với dung dịch H_2SO_4 đặc bao gồm

A. SO_2, H_2S. **B.** CO_2, SO_2. **C.** CO_2, SO_3. **D.** CO_2, H_2S.

Câu 10. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng nhẹ 60–70°C. Chất X là

A. tinh bột. **B.** ethyl acetate. **C.** saccharose. **D.** glucose.

Câu 11. Trong quá trình trồng trọt, người nông dân được khuyến cáo không bón vôi sống (thành phần chính là CaO) cùng với phân đạm ammonium. Nguyên nhân của khuyến cáo này là

A. thất thoát đạm vì giải phóng ammonia. **B.** tạo thành hỗn hợp gây cháy nổ.

C. tạo acid làm ảnh hưởng tới cây trồng. **D.** làm tăng độ chua của đất.

Câu 12. Công thức phân tử nào sau đây không thể của ester?

A. $C_3H_6O_2$. **B.** $C_3H_8O_2$. **C.** $C_3H_4O_2$. **D.** $C_4H_6O_2$.

Câu 13. Polysaccharide X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi, trong bông nõn có gần 98% chất X. Chất X là

A. glucose. **B.** cellulose. **C.** maltose. **D.** saccharose.

Câu 14. Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Hàm lượng alcohol ethanol trong máu người lái xe không được vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng đó ta chuẩn độ alcohol bằng $K_2Cr_2O_7$ trong môi trường acid theo phản ứng:

$3CH_3CH_2OH + K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow 3CH_3CHO + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$

Khi chuẩn độ 25,0 gam huyết tương máu của một người lái xe cần dùng 20,0 mL dung dịch $K_2Cr_2O_7$ 0,010M. Nồng độ phần trăm ethanol trong 25 gam huyết tương máu của một người lái xe là

A. 0,11%. **B.** 0,03%. **C.** 0,05%. **D.** 0,027%.

Câu 15. Cho phản ứng hóa học sau: $CH_3COOH\,(l) + CH_3OH\,(l) \rightleftharpoons CH_3COOCH_3\,(l) + H_2O\,(l)$. Biểu thức tính hằng số cân bằng nồng độ K_C của phản ứng trên là


A. $K_C = \dfrac{[CH_3COOCH_3][H_2O]}{[CH_3COOH][CH_3OH]}$. **B.** $K_C = \dfrac{[CH_3COOCH_3]}{[CH_3COOH][CH_3OH]}$.

C. $K_C = \dfrac{[CH_3COOH][CH_3OH]}{[CH_3COOCH_3][H_2O]}$. **D.** $K_C = \dfrac{[CH_3COOH][CH_3OH]}{[CH_3COOCH_3]}$.

Câu 16. Methyl acrylate là một chất kích thích mạnh, có thể gây chóng mặt, đau đầu, hoa mắt và khó thở khi tiếp xúc với da hoặc hít phải, ester này có công thức cấu tạo thu gọn là

A. $CH_3COOC_2H_5$. **B.** CH_3COOCH_3. **C.** $C_2H_5COOCH_3$. **D.** $CH_2{=}CHCOOCH_3$.

Câu 17. Phương trình hoá học của phản ứng hydrate hóa ethylene để điều chế ethanol là: $CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3CH_2OH$. Giai đoạn (1) trong cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng**?

A. Phản ứng hydrate hóa ethylene là phản ứng cộng.

B. Trong giai đoạn (1) có sự phân cắt liên kết π.

C. Trong giai đoạn (1) có sự hình thành liên kết σ.

D. Trong phân tử ethylene có 6 liên kết σ.

Câu 18. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
• Bước 1: Cho khoảng 2mL dung dịch $AgNO_3$ 1% vào ống nghiệm sạch.
• Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch ammonia 5%, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.
• Bước 3: Thêm tiếp khoảng 2mL dung dịch glucose 2% lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thuỷ tinh chứa nước nóng trong vài phút.
Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là ammonium gluconate.

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.


C. Sau bước 3, có lớp bạc (silver) kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D. Trong phản ứng ở bước 3, glucose đóng vai trò là chất khử.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 19 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Methyl cinnamate là một ester có công thức phân tử $C_{10}H_{10}O_2$ và có mùi thơm của dâu tây (strawberry) được sử dụng trong ngành công nghiệp hương liệu và nước hoa.



a) Methyl cinnamate có đồng phân hình học..

b) Methyl cinnamate có công thức cấu tạo là $CH_3COO{-}CH{=}CH{-}C_6H_5$..

c) Methyl cinnamate phản ứng với NaOH với tỉ lệ 1 : 2..

d) Để điều chế 24,3 gam ester methyl cinnamate, người ta cho 29,6 gam cinnamic acid phản ứng với lượng dư methyl alcohol. Hiệu suất phản ứng ester hóa trong trường hợp này là 75%..

Câu 20. Tiến hành thí nghiệm điều chế ethyl acetate theo các bước sau đây:
• Bước 1: Cho 1mL C_2H_5OH, 1mL CH_3COOH và vài giọt dung dịch H_2SO_4 đặc vào ống nghiệm.
• Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 6 phút ở 60 – 70°C.
• Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2mL dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

a) Ở bước 1, có thể thay bằng dung dịch H_3PO_4 đậm đặc..

b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm..

c) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp..

d) H_2SO_4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm..

Câu 21. Hợp chất hữu cơ mạch hở X ($C_7H_{10}O_5$) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glycerol và hỗn hợp 2 muối carboxylate Y và Z ($M_Y < M_Z$).

a) Y tham gia phản ứng tráng bạc..

b) Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X..

c) X là hợp chất hữu cơ tạp chức..

d) Carboxylic acid của muối Z có đồng phân hình học..

Câu 22. Thực vật sử dụng quá trình quang hợp để chuyển đổi năng lượng ánh sáng từ mặt trời thành năng lượng hóa học. Trong quá trình quang hợp xảy ra phản ứng giữa khí carbonic và nước theo phương trình hóa học:

$6CO_2(g) + 6\,H_2O\,(l) \longrightarrow C_6H_{12}O_6(aq) + 6\,O_2(g)$

Cho enthalpy tạo thành chuẩn của $CO_2(g) = -393{,}5$ kJ/mol; $H_2O\,(l) = -285{,}8$ kJ/mol; $C_6H_{12}O_6(aq) = -1271$ kJ/mol.

a) Phản ứng quang hợp của cây xanh là phản ứng tỏa nhiệt..

b) Nhiệt tạo thành chuẩn của $O_2(g)$ bằng 0..

c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên có giá trị là $-2804{,}8$ kJ..

d) Trồng nhiều cây xanh sẽ làm giảm được nhiệt độ của môi trường xung quanh..

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 23 đến câu 28.

Câu 23. Có các phát biểu sau:

(1) Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glycerol.

(2) Triolein làm mất màu nước bromine.

(3) Các ester chỉ được điều chế từ carboxylic acid và alcohol.

(4) Benzyl acetate là ester có mùi chuối chín.

(5) Đốt cháy ethyl acetate thu được số mol nước bằng số mol khí carbonic.

(6) Hydrogen hoá hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, t°) thu được chất béo rắn.

Liệt kê theo trình tự từ nhỏ đến lớn các số ứng với các phát biểu đúng trên (ví dụ: 56, 124, 3456,...).

Câu 24. Cho các phản ứng được đánh số thứ tự như sau:

(1) $6nCO_2 + 5nH_2O \xrightarrow{\text{ánh sáng}} (C_6H_{10}O_5)_n + 6nO_2$

(2) $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{enzyme}} nC_6H_{12}O_6$


(3) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{enzyme}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$

(4) $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: lên men rượu, thủy phân, cháy, quang hợp và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số.

Câu 25. Một nhà máy đường trung bình mỗi ngày sử dụng 3000 tấn mía để sản xuất. Sau khi nước mía được cô đặc và kết tinh để lấy đường cát, phần chất lỏng màu nâu sẫm, đặc sệt còn lại chính là rỉ đường. Tỷ lệ rỉ đường bằng 4% khối lượng mía ban đầu. Thành phần chính của rỉ đường gồm: Saccharose (khoảng 40%), monosaccharide (tổng glucose và fructose khoảng 15%), nước và các khoáng chất. Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu, nhà máy dùng rỉ đường để sản xuất ethanol, người ta pha loãng rỉ đường và tiến hành lên men bằng nấm men (Saccharomyces cerevisiae). Quá trình gồm thuỷ phân saccharose và lên men monosaccharide (cả glucose và fructose đều lên men tạo ethanol). Hiệu suất thuỷ phân Saccharose và lên men đều đạt 90%, các thành phần khác không tham gia quá trình tạo ethanol. Thể tích dung dịch ethanol 88° trung bình nhà máy sản xuất được trong 1 ngày là V (m^3), biết khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,79 g/mL. Giá trị của V bằng bao nhiêu? (Không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

Câu 26. Xác định giá trị số sóng ν (cm^{-1}) hấp thụ đặc trưng của nhóm C=O (ketone) trên phổ hồng ngoại IR của methyl phenyl ketone cho dưới đây:



Câu 27. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là số mg KOH cần dùng để xà phòng hoá hoàn toàn 1 gam chất béo (bao gồm cả trung hoà acid béo tự do có trong chất béo). Cho bảng số liệu:

Chất béo	**Chỉ số xà phòng hoá**	**Chất béo**	**Chỉ số xà phòng hoá**
Dầu dừa	257	Dầu olive	188
Dầu cọ	**199**	Mỡ vịt	194
Dầu lạc	192	Mỡ gà	195
Dầu mè	188	Mỡ lợn	198

Giả sử quá trình thực hành điều chế xà phòng, học sinh được yêu cầu điều chế xà phòng từ 200 gam dầu cọ và NaOH (rắn). Biết xà phòng được điều chế bằng cách cho chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cần cân m (gam) hoá chất từ lọ đựng NaOH rắn trong phòng thí nghiệm, biết rằng loại NaOH được dùng trong phòng thí nghiệm đã hút ẩm nên lượng NaOH chiếm 95%. Giá trị của m bằng bao nhiêu? (Các quá trình tính toán không làm tròn, kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 28. Cho các chất: $CH_3[CH_2]_{14}COONa$, $CH_3[CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$, $CH_3[CH_2]_{16}COOK$, $CH_3[CH_2]_7CH{=}CH[CH_2]_7$ CH_3COONa, $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$. Có bao nhiêu chất có thể là thành phần chính của xà phòng?

———————- HẾT ———————-

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)