Predicted vs. Observed V_d, CL, and $t_{1/2}$ stratified by ionisation state

(A1) $A_{baseline}$: Volume of Distribution (V_d)
R^2 = 0.070 | N = 172



(A2) $A_{baseline}$: Clearance (CL)
R^2 = 0.066 | N = 166



(A3) $A_{baseline}$: Half-life ($t_{1/2}$)
R^2 = 0.116 | N = 215



(B1) B_{ion}: Volume of Distribution (V_d)
R^2 = 0.187 | N = 172



(B2) B_{ion}: Clearance (CL)
R^2 = 0.012 | N = 166



(B3) B_{ion}: Half-life ($t_{1/2}$)
R^2 = 0.096 | N = 215



(C1) PIPK-Net (C_{physio}): Volume of Distribution (V_d)
R^2 = 0.282 | N = 172



(C2) PIPK-Net (C_{physio}): Clearance (CL)
R^2 = 0.146 | N = 166



(C3) PIPK-Net (C_{physio}): Half-life ($t_{1/2}$)
R^2 = 0.128 | N = 215



(D1) ChemBERTa: Volume of Distribution (V_d)
R^2 = 0.041 | N = 172



(D2) ChemBERTa: Clearance (CL)
R^2 = 0.055 | N = 166



(D3) ChemBERTa: Half-life ($t_{1/2}$)
R^2 = 0.092 | N = 215



(E1) Chemprop: Volume of Distribution (V_d)
R^2 = 0.175 | N = 167



(E2) Chemprop: Clearance (CL)
R^2 = 0.117 | N = 161



(E3) Chemprop: Half-life ($t_{1/2}$)
R^2 = 0.086 | N = 210



Ionisation State
Neutral
Cationic
Anionic
Zwitterionic