Velocity and Acceleration of VVF

Section 12.3

9-21-24

HW 12.3 9/21

11) a) $v(t) = \langle 1, 2t, 6 \rangle$

$a(t) = \langle 0, 2, 12 \rangle$

$\|v(t)\| = \sqrt{1+4t^2}$

b) $v(2) = \langle 1, 9, 48 \rangle$

$a(2) = \langle 0, 2, 12 \rangle$

13) a) $v(t) = \left\langle 1, 1, \frac{-2t}{\sqrt{4-t^2}} \right\rangle$

$a(t) = \left\langle 0, 0, \frac{-8}{(4-t^2)^{3/2}} \right\rangle$

$\|v(t)\| = \frac{\sqrt{12-t^2}}{\sqrt{4-t^2}}$

b) $v(0) = \langle 1, 1, 0 \rangle$

$a(0) = \langle 0, 0, -\frac{1}{8} \rangle$

17) a)

$v(t) = \langle e^t \cos t - \sin t\, e^t, \sin t + e^t \cos t, e^t \rangle$

$\|v(t)\| = e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 + 1}$

$= e^t \sqrt{\cos^2 t - 2\cos t \sin t + \sin^2 t + \sin^2 t + 2\cos t \sin t + \cos^2 t + 1}$

$a(t) = \langle -2e^t \sin t, 2e^t \cos t, e^t \rangle$

b)

$v(0) = \langle 1, 1, 1 \rangle$

$a(0) = \langle 0, 2, 1 \rangle$

21) $a(t) = \langle 0, 6, 6 \rangle$

$v(t) = \langle c_0, \frac{t^2}{2} + c_1, \frac{t^3}{2} + c_2 \rangle$

$v(1) = \langle 0, 5, 0 \rangle$

$v(t) = \langle 0, \frac{t^2}{2} + \frac{9}{2}, \frac{t^3}{2} - \frac{1}{2} \rangle$

$r(t) = \langle c_1, \frac{t^3}{6} + \frac{9}{2}t + c_3, \frac{t^4}{8} - \frac{t}{2} + c_4 \rangle$

$r(1) = \langle 0, 0, -1 \rangle$

$r(t) = \langle 0, \frac{t^3}{6} + \frac{9}{2}t - \frac{28}{3}, \frac{t^4}{8} - \frac{t}{2} + \frac{3}{2} \rangle$

$r(3) = \langle 0, \frac{17}{3}, \frac{23}{8} \rangle$

23) $a(t) = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$

$v(t) = \langle -\sin t + c_1, \cos t + c_2, c_3 \rangle$

$v(0) = \langle 0, 1, 1 \rangle$

$v(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$

$r(t) = \langle \cos t + c_1, \sin t + c_2, t + c_3 \rangle$

$r(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$


$r(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$

$r(2) = \langle \cos 2, \sin 2, 2 \rangle$

B) Projectile Motion

$x(t) = v_0 t \cos\theta$

$y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 t \sin\theta + h$



Ex) A baseball is hit 3ft above the ground at velocity 50 ft/sec with an θ of 45°

$x(t) = 50\frac{\sqrt{2}}{2}(t)$

$y(t) = -16t^2 + 50\frac{\sqrt{2}}{2}t + 3$



a) find the peak height

$t = \frac{50\frac{\sqrt{2}}{2}}{32}$

$-16\left(\frac{50\frac{\sqrt{2}}{2}}{32}\right)^2 + \frac{50\frac{\sqrt{2}}{2}}{32}\left(50\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 3$

$\frac{(50\sqrt{2})^2}{32}\left(-\frac{1}{2}+1\right) + 3$

b) will it clear a fence 100 away?

$\frac{100}{50\frac{\sqrt{2}}{2}} = 50\frac{\sqrt{2}}{2}t$

$\frac{6}{\sqrt{2}} = t$

$-16\left(3\sqrt{2}\right)^2 + 50$

HW 12.3 9/22

27) $\langle v_0\frac{\sqrt{2}}{2}t, -16t^2 + v_0\frac{\sqrt{2}}{2}t + 3 \rangle$

$200 = v_0\frac{\sqrt{2}}{2}t \qquad -16t^2 + v_0\frac{\sqrt{2}}{2}t + 3 = y$

$200\sqrt{2} = v_0 t \qquad -16t^2 = 300$

$\frac{200\sqrt{2}}{t} = v_0 \qquad b = \sqrt{\frac{300}{16}}$

$\frac{300\sqrt{2}}{\sqrt{300/16}} = \frac{300\sqrt{2}}{\frac{10\sqrt{3}}{4}}$

$\frac{1200\sqrt{2}}{10\sqrt{3}} = \sqrt{40\sqrt{6}}$

28) a)



$x(t) = v_0\cos 33 \cdot t$

$\frac{90}{\cos 33} = v_0 \cdot t$

$x(t) = -16t^2 + v_0 \sin 33 t + 7$

$4 = -16t^2 + v_0 \sin 33 t + 7$

$0 = -16t^2 + \left(\frac{90}{\cos 33}\right)\sin 33\, t - 3$

$t = \sqrt{\frac{90\sin 33}{16}}$

$v_0 = \frac{90}{t\cos 33}$

34) $x(t) = 7632t$

$y(t) = -16t^2 + 3800$

$1600 = -16t^2 + 3800$

$t'(t) = v(t) = \langle 7632, -32t \rangle$

$v(15\sqrt{15}) = \langle 7632, -32(15\sqrt{15}) \rangle$

$\|v(15\sqrt{15})\| = 60\sqrt{3481}$

$\tan\theta = \frac{32(15\sqrt{15})}{7632} = \frac{240\sqrt{15}}{763}$

$\theta = 81.1786$ below the horizontal

35)



$x(t) = 1000t\cos\theta$

$y(t) = -16t^2 + 1000t\sin\theta$

$3000 = 1000t\cos\theta$

$\frac{3}{\cos\theta} = 10t$

$x = \frac{1200^2}{32}\sin(2\theta) = 3000 \Rightarrow \sin(2\theta) = \frac{1}{15}$

$\theta = 1.71$

36)

$R = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g}$

$v_0 = \sqrt{\frac{R \cdot g}{\sin(2\theta)}}$

$\sin(2\theta) = 0.4906733$

$v_0 = 123.4394415$