

Xenon Equilibrium Equations

R. A. BORRELLI

Nuclear Engineering Program, University of Idaho-Idaho Falls

Center for Advanced Energy Studies

995 MK Simpson Boulevard, Idaho Falls, Idaho

r.angelo.borrelli@gmail.com

2019.08.12

1 Mathematical models

1.1 Iodine

$$\begin{aligned}\frac{dI}{dt} &= \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \lambda_I I \\ I(0) &= 0\end{aligned}$$

1.2 Xenon

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dt} &= \lambda_I I + \gamma_X \Sigma_F \phi_T - \lambda_X X - \sigma_A \phi_T X \\ X(0) &= 0\end{aligned}$$

2 Solutions

2.1 Iodine

Laplace

$$\frac{dI}{dt} = \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \lambda_I I$$

$$s\tilde{I} = \frac{1}{s} \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \lambda_I \tilde{I}$$

Rearrange

$$\tilde{I} = \frac{1}{s(s+\lambda_I)} \gamma_I \Sigma_F \phi_T$$

Solve

$$I(t) = \frac{\gamma_I \Sigma_F \phi_T}{\lambda_I} (1 - e^{-\lambda_I t})$$

2.2 Xenon

Laplace

$$\frac{dX}{dt} = \lambda_I \frac{\gamma_I \Sigma_F \phi_T}{\lambda_I} (1 - e^{-\lambda_I t}) + \gamma_X \Sigma_F \phi_T - \lambda_X X - \sigma_A \phi_T X$$

$$\frac{dX}{dt} = \gamma_I \Sigma_F \phi_T (1 - e^{-\lambda_I t}) + \gamma_X \Sigma_F \phi_T - \lambda_X X - \sigma_A \phi_T X$$

$$\frac{dX}{dt} = \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \gamma_I \Sigma_F \phi_T e^{-\lambda_I t} + \gamma_X \Sigma_F \phi_T - \lambda_X X - \sigma_A \phi_T X$$

$$\frac{dX}{dt} = \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \gamma_I \Sigma_F \phi_T e^{-\lambda_I t} + \gamma_X \Sigma_F \phi_T - (\lambda_X + \sigma_A \phi_T) X$$

$$s\tilde{X} = \frac{1}{s} \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \frac{1}{s+\lambda_I} \gamma_I \Sigma_F \phi_T + \frac{1}{s} \gamma_X \Sigma_F \phi_T - (\gamma_X + \sigma_A \phi_T) \tilde{X}$$

Rearrange

$$(s + [\gamma_X + \sigma_A \phi_T]) \tilde{X} = \frac{1}{s} \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \frac{1}{s+\lambda_I} \gamma_I \Sigma_F \phi_T + \frac{1}{s} \gamma_X \Sigma_F \phi_T$$

$$\tilde{X} = \frac{1}{s(s+[\gamma_X + \sigma_A \phi_T])} \gamma_I \Sigma_F \phi_T - \frac{1}{(s+\lambda_I)(s+[\gamma_X + \sigma_A \phi_T])} \gamma_I \Sigma_F \phi_T + \frac{1}{s(s+[\gamma_X + \sigma_A \phi_T])} \gamma_X \Sigma_F \phi_T$$

Solve

$$X(t) = \frac{\gamma_I \Sigma_F \phi_T}{\gamma_X + \sigma_A \phi_T} (1 - e^{-(\gamma_X + \sigma_A \phi_T)t}) - \frac{\gamma_I \Sigma_F \phi_T}{\gamma_X + \sigma_A \phi_T - \lambda_I} (e^{-\lambda_I t} - e^{-(\gamma_X + \sigma_A \phi_T)t}) + \frac{\gamma_X \Sigma_F \phi_T}{\gamma_X + \sigma_A \phi_T} (1 - e^{-(\gamma_X + \sigma_A \phi_T)t})$$