


**Figura 2.-**

X **Nodo 2** : $p = F$ Con este valor deducimos:

$(q \vee r) = V$ o F depende de q y r

$P_1 = [(q \vee r) \rightarrow p] = V$ o F depende de $(q \vee r)$


$(p \wedge q) = F$ por ser $p = F$

$P_2 = [(p \wedge q) \rightarrow r] = V$ por ser $(p \wedge q) = F$

$\neg P_2 = \neg[(p \wedge q) \rightarrow r] = F$ por ser $P_2 = V$

$P_1 \wedge \neg P_2 = F$ por ser $\neg P_2 = F$

Conclusión: Cuando $p = F$ podemos asegurar que $P_1 \wedge \neg P_2 = F$

**Figura 3.-**

X **Nodo 3** : $p = V$ y $q = V$ Con estos valores deducimos:

$(q \vee r) = V$

$P_1 = [(q \vee r) \rightarrow p] = V$ por ser $(q \vee r) = V$ y $p = V$


$(p \wedge q) = V$ por ser $p = q = V$

$P_2 = [(p \wedge q) \rightarrow r] = V$ o F depende de r

$\neg P_2 = \neg[(p \wedge q) \rightarrow r] = V$ o F depende de P_2

$P_1 \wedge \neg P_2 = V$ o F

Conclusión: Cuando $p = q = V$ no podemos asegurar nada sobre $P_1 \wedge \neg P_2$

**Figura 4.-**

X **Nodo 4** : $p = V$ y $q = F$ Con estos valores deducimos:

$(q \vee r) = V$ o F depende de r

$P_1 = [(q \vee r) \rightarrow p] = V$ por ser $p = V$

$(p \wedge q) = F$ por ser $p = V$ y $q = F$

$P_2 = [(p \wedge q) \rightarrow r] = V$ por ser $(p \wedge q) = F$

$\neg P_2 = \neg[(p \wedge q) \rightarrow r] = F$

$P_1 \wedge \neg P_2 = F$

Conclusión: Cuando $p = V$ y $q = F$ podemos asegurar que $P_1 \wedge \neg P_2 = F$

Nótese que hasta ahora todo lo que hemos obtenido es que $P_1 \wedge \neg P_2$ es FALSO para las distintas interpretaciones analizadas. Esto nos obliga a continuar con el proceso para comprobar si nos encontramos ante una contradicción o una indeterminación.