


## Vzorové řešení zadání N

1) Funkce  $f$  a  $g$  jsou zadány předpisy  $f(x) = \begin{cases} 1-|x| & |x| \leq 1 \\ x^2 - 1 & |x| > 1 \end{cases}$ ,  $g(x) = \begin{cases} 1-x & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$ .

Najděte předpis pro složenou funkci  $g \circ f$  a určete  $f^{-1}(\langle 1, 2 \rangle)$ .



$$f^{-1}(\langle 1, 2 \rangle) = \langle -\sqrt{3}, -\sqrt{2} \rangle \cup \{0\} \cup \langle \sqrt{2}, \sqrt{3} \rangle$$

$$g(f(x)) = \begin{cases} 1-f(x) & f(x) < 0 \\ 1 & f(x) \geq 0 \end{cases} \quad \text{vyřešíme nerovnosti napravo:}$$

$$|x| \leq 1 \Rightarrow 1 - |x| \geq 0$$

$$|x| > 1 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x^2 - 1 > 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ což se dalo zjistit z grafu funkce } f.$$

$$g(f(x)) = \begin{cases} 1-f(x) & f(x) < 0 \\ 1 & f(x) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow g(f(x)) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

*neplatí nikdy*      *platí vždy*

2) U každého z následujících výroků rozhodněte, zda je pravdivý nebo nepravdivý. Je-li nepravdivý, uveďte protipříklad.

a)  $(\exists y \in \mathbb{R} : \sin^2 y + \cos^2 y = 13) \Rightarrow$  alespoň jeden student dnes zkoušku z IMA neudělá.

pravdivý

b) Je-li funkce  $f$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$  spojitá, je na  $\langle a, b \rangle$  ohraničená.

pravdivý

c) Platí-li  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , je  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergentní.

nepravdivý protipříklad:  $a_n = \frac{1}{n}$

3) Najděte největší a nejmenší hodnotu funkce  $f$  na intervalu  $I$ , je-li  $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^2}$ ,  $I = \langle -2, 3 \rangle$ .

$$f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^2} = (x^2 - 2x)^{\frac{2}{3}}, \quad f'(x) = \frac{2}{3} \frac{2x - 2}{(x^2 - 2x)^{\frac{1}{3}}} = \frac{4}{3} \frac{x - 1}{x^{\frac{1}{3}} (x - 2)^{\frac{1}{3}}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1, \quad f'(x) \not\equiv 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2 \quad 0 \in I, \quad 1 \in I, \quad 2 \in I$$

$$f(-2) = \sqrt[3]{(4 + 4)^2} = \sqrt[3]{64} \quad \text{max}$$

$$f(0) = 0 \quad \text{min}$$

$$f(1) = \sqrt[3]{(1 - 2)^2} = 1$$

$$f(2) = 0 \quad \text{min}$$

$$f(3) = \sqrt[3]{(9 - 6)^2} = \sqrt[3]{9}$$

**maximum v bodě**  $x = -2$ ,  $f_{\max} = \sqrt[3]{64}$ ,      **minimum v bodech**  $x = 0, x = 2$ ,  $f_{\min} = 0$ .

4) Pro  $n$ -tý částečný součet nekonečné řady  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  platí  $s_n = 1 - \frac{1}{3^n}$ . Určete  $a_n$  a  $s$ .

$$a_n = s_n - s_{n-1} = 1 - \frac{1}{3^n} - \left(1 - \frac{1}{3^{n-1}}\right) = \frac{1}{3^{n-1}} - \frac{1}{3^n} = \frac{3-1}{3^n} = \frac{2}{3^n} \quad s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right) = 1$$

$$\underline{a_n = \frac{2}{3^n}}$$

$$\underline{s = 1}$$

5)  $f(x, y) = \ln \frac{y^3}{x}$ . Najděte bod, ve kterém je  $\text{grad } f(x, y) = (1, 1)$ .

$$f(x, y) = \ln \frac{y^3}{x} = 3 \ln y - \ln x, \quad f'_x = -\frac{1}{x}, \quad f'_y = \frac{3}{y}, \quad \text{grad } f(x, y) = \left(-\frac{1}{x}, \frac{3}{y}\right).$$

$$\left(-\frac{1}{x}, \frac{3}{y}\right) = (1, 1) \Leftrightarrow x = -1, y = 3$$

$$\underline{[x, y] = [-1, 3]}$$


6) Vypočítejte integrál  $I = \int_M x \, dx \, dy$ , je-li  $M$  ohraničená grafy funkcí  $y = \cos x$ ,  $y = \sin 2x$  a osou  $y$  ( $x \geq 0$ ).

Určíme průsečíky grafů:

$$\cos x = \sin 2x \Leftrightarrow \cos x = 2 \sin x \cos x \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \vee \cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$M = \left\{ (x, y) \left| \begin{array}{l} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \\ \sin 2x \leq y \leq \cos x \end{array} \right. \right\}$$



$$I = \int_M x \, dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{6}} x \, dx \int_{\sin 2x}^{\cos x} dy = \int_0^{\frac{\pi}{6}} x [y]_{\sin 2x}^{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} x (\cos x - \sin 2x) dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & u' = 1 \\ v' = \cos x - \sin 2x & v = \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| =$$

$$= \left[ x \left( \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) \right]_0^{\frac{\pi}{6}} - \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left( \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx = \frac{\pi}{6} \left( \sin \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{3} \right) - \left[ -\cos x + \frac{1}{4} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$= \frac{\pi}{6} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) - \left( -\cos \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} \right) + \left( -\cos 0 + \frac{1}{4} \sin 0 \right) = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{4} \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = \frac{\pi}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8} - 1$$

$$\underline{I = \frac{1}{8}(\pi + 3\sqrt{3}) - 1}$$