

**Министерство образования Республики Беларусь**

**Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»**

---

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ**

**Кафедра интеллектуальных информационных технологий**

**Отчет  
Лабораторная работа №5**

**По дисциплине: Численные методы**

**Выполнил: Рассохов Е.П., гр. 421703**

**Проверил: Князева Л.П.**

**Минск, 2025**

# Вычисление определенных интегралов

Вариант: 8

**Задание 3:** вычислите приближенное значение определенного интеграла (согласно номера вашего варианта), разбив область интегрирования на  $n = 5, 10, 20, 50, 100$  частей, следующими методами:

- левых прямоугольников;
- правых прямоугольников;
- средних прямоугольников;
- трапеций;
- Симпсона.

Составьте таблицу приближенных значений интеграла  $I_h$ , полученных этими пятью методами, для каждого разбиения отрезка интегрирования. Сравните с точным значением интеграла, полученным с помощью функций Mathematica, и сделайте выводы о точности формул.

Реализация методов:

```
exact = NIntegrate[f[x], {x, a, b}]
      |квadrатурное интегрирование
:
0.695791

hf[n_] := (b - a) / n;

LeftRect[n_] := hf[n] * Sum[f[a + i hf[n]], {i, 0, n - 1}]
      |сумма

RightRect[n_] := hf[n] * Sum[f[a + i hf[n]], {i, 1, n}]
      |сумма

MidRect[n_] := hf[n] * Sum[f[a + (i + 0.5) hf[n]], {i, 0, n - 1}]
      |сумма

Trap[n_] := (hf[n] / 2) (f[a] + 2 Sum[f[a + i hf[n]], {i, 1, n - 1}] + f[b])
      |сумма

Simpson[n_] := (hf[n] / 3) (f[a] + f[b] + 4 Sum[f[a + (2 k - 1) * hf[n]], {k, 1, n / 2}] + 2 Sum[f[a + 2 k * hf[n]], {k, 1, n / 2 - 1}])
      |сумма      |сумма
```

Приближенные значения интегралов:

n	h	left	right	mid	trap	simpson
5	0.16	0.735576	0.657583	0.695396	0.696579	–
10	0.08	0.715486	0.67649	0.695693	0.695988	0.695791
20	0.04	0.705589	0.686091	0.695767	0.69584	0.695791
50	0.016	0.699699	0.691899	0.695787	0.695799	0.695791
100	0.008	0.697743	0.693843	0.69579	0.695793	0.695791

Абсолютные погрешности:

n	h	left	right	mid	trap	simpson
5	0.16	0.0397847	0.0382082	0.000394982	0.000788217	-
10	0.08	0.0196948	0.0193016	0.0000983637	0.000196618	$5.82296 \times 10^{-7}$
20	0.04	0.00979824	0.00969999	0.0000245669	0.0000491269	$3.66206 \times 10^{-8}$
50	0.016	0.00390751	0.00389179	$3.92963 \times 10^{-6}$	$7.85908 \times 10^{-6}$	$9.39079 \times 10^{-10}$
100	0.008	0.00195179	0.00194786	$9.82368 \times 10^{-7}$	$1.96473 \times 10^{-6}$	$5.87072 \times 10^{-11}$

**Вывод:** Не смотря на то, что метод Симпсона не работает на нечетных разбиениях, он оказался наиболее точным. Наименее точные - методы левого и правого треугольников.

**Задание 4:** Примените формулы Рунге для уточнения значение интеграла (уточнения значения интеграла по Ричардсону), используя  $I_h$  и  $I_{2h}$  для каждого метода, и сделайте вывод.

Для уточнения по Ричардсона было произведено деление на 2 и 4 части:

left: 0.695693; абсолютная погрешность: 0.0000983637

right: 0.695693; абсолютная погрешность: 0.0000983637

mid: 0.695791; абсолютная погрешность:  $3.20361 \times 10^{-8}$

trap: 0.695791; абсолютная погрешность:  $3.66206 \times 10^{-8}$

simpson: 0.695791; абсолютная погрешность:  $2.42255 \times 10^{-10}$

**Вывод:** При использовании уточнения по Ричардсону, значительно уменьшились абсолютные погрешности, при этом метод Симпсона остался самым точным, а методы левого и правого треугольников также наименее точными и примерно равными между собой.

**Задание 5:** Вычислите с заданной точностью ( $\epsilon = 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}$ ) определенный интеграл, тот же, что и в задании 3, теми же методами. Составьте таблицу приближенных значений интеграла  $I_h$  и числа разбиений, необходимого для достижения точности рассмотренными методами. Сравните с точным значением интеграла, полученным с помощью функций Mathematica. Сделайте выводы о точности формул, сравнив количество потребовавшихся разбиений.

eps	left	right	mid	trap	simpson
0.0001	976	975	5	8	2
0.00001	9750	9749	16	23	4
$1. \times 10^{-6}$	97492	97492	50	71	6

**Вывод:** В силу схожести методов левого и правого треугольников, их количество итераций примерно равны, меньше всего итераций ушло на метод Симпсона

**Задание 6:** Вычислите определенный интеграл с помощью квадратурной формулы Гаусса с  $n$  узлами. Сравнить с точным значением интеграла.

```
GausseSq[f_, a_, b_, n_] := Module[{x, r, dPn, w, c},
    [программный модуль]
    r = x /. NSolve[LegendreP[n, x] == 0, x, Reals];
    [число... [P-функция Лежандра первого... [множество дейст
    dPn = D[LegendreP[n, x], x];
    [.. [P-функция Лежандра первого рода
    w[t_] := 2 / ((1 - t^2) (dPn /. x -> t)^2);
    c = (b - a) / 2;
    N[Sum[(c w[r[[i]])] f[a + c (1 + r[[i]])], {i, n}], 30]
    [.. [сумма
];
```

Таблица истинных значений и значений метода Гаусса:

n	value	exact	error
1	0.897556	0.903332	0.00577605
2	0.90305	0.903332	0.000281846
3	0.903332	0.903332	$3.7067 \times 10^{-7}$
4	0.903332	0.903332	$7.57669 \times 10^{-9}$
5	0.903332	0.903332	$2.97408 \times 10^{-11}$

**Вывод:** Метод Гаусса позволяет достичь наивысшей точности при ограниченном и сравнительно небольшом числе вычислений подынтегральной функции. В то же время его использование связано с необходимостью заранее находить узлы и веса, что делает алгоритм немного более сложным по сравнению с методами равномерного шага.