

FEALPy 偏微分方程数值解程序设计与实现： 拉格朗日有限元求解 **Poisson** 方程

魏华祎

weihuayi@xtu.edu.cn

湘潭大学 • 数学与计算科学学院

July 20, 2020

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

Poisson 方程

给定区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 其边界 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N \cup \Gamma_R$

$$-\Delta u = f, \quad \text{in } \Omega$$

$$u = g_D, \quad \text{on } \Gamma_D \leftarrow \textbf{Dirichlet}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = g_N, \quad \text{on } \Gamma_N \leftarrow \textbf{Neumann}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \kappa u = g_R, \quad \text{on } \Gamma_R \leftarrow \textbf{Robin}$$

其中

- $\Delta u(x) = u_{xx}$
- $\Delta u(x, y) = u_{xx} + u_{yy}$
- $\Delta u(x, y, z) = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$
- $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$

连续的弱形式

方程两端分别乘以测试函数 $v \in H_{D,0}^1(\Omega)$, 则连续的弱形式可以写为

$$(f, v) = -(\Delta u, v)$$

再分部积分

$$\begin{aligned}(f, v) &= -(\Delta u, v) \\ &= (\nabla u, \nabla v) - \langle \nabla u \cdot \mathbf{n}, v \rangle_{\partial\Omega} \\ &= (\nabla u, \nabla v) - \langle g_N, v \rangle_{\Gamma_N} + \langle \kappa u, v \rangle_{\Gamma_R} - \langle g_R, v \rangle_{\Gamma_R}\end{aligned}$$

整理可得

$$(\nabla u, \nabla v) + \langle \kappa u, v \rangle_{\Gamma_R} = (f, v) + \langle g_R, v \rangle_{\Gamma_R} + \langle g_N, v \rangle_{\Gamma_N}$$

Remark

测试函数 $v|_{\Gamma_D} = 0$!

离散的弱形式

给定 Ω 上一个单纯形网格离散 \mathcal{T} , 构造连续的分片 p 次有限元空间 $V_h \subset H^1(\Omega)$, 其基函数向量记为:

$$\phi = [\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{N-1}],$$

则离散的弱连续形式: 求解 $u_h = \phi u \in V_h(\Omega)$, 对于任意 ϕ_i 有

$$(\nabla u_h, \nabla \phi_i) + \langle \kappa u_h, \phi_i \rangle_{\Gamma_R} = (f, \phi_i) + \langle g_R, \phi_i \rangle_{\Gamma_R} + \langle g_N, \phi_i \rangle_{\Gamma_N},$$

其中 u 是 u_h 在基函数 ϕ 下的坐标**列向量**。

Remark

注意, 基函数向量 ϕ 中包括内部和边界的所有基函数, 而其中的 Dirichlet 边界对应的基函数会留到后面处理。

离散的代数系统

$$(\mathbf{A} + \mathbf{R})\mathbf{u} = \mathbf{b} + \mathbf{b}_N + \mathbf{b}_R$$

$$\mathbf{A} = \int_{\Omega} (\nabla \phi)^T \nabla \phi \, d\mathbf{x} = \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_{\tau} (\nabla \phi|_{\tau})^T \nabla \phi|_{\tau} \, d\mathbf{x}$$

$$\mathbf{R} = \int_{\Gamma_R} \phi^T \phi \, ds = \sum_{e_R \in \Gamma_R} \int_{e_R} (\phi|_{e_R})^T \phi|_{e_R} \, ds$$

$$\mathbf{b} = \int_{\Omega} f \phi^T \, d\mathbf{x} = \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_{\tau} f(\phi|_{\tau})^T \, d\mathbf{x}$$

$$\mathbf{b}_N = \int_{\Gamma_N} g_N \phi^T \, ds = \sum_{e_N \in \Gamma_N} \int_{e_N} g_N (\phi|_{e_N})^T \, ds$$

$$\mathbf{b}_R = \int_{\Gamma_R} g_R \phi^T \, ds = \sum_{e_R \in \Gamma_R} \int_{e_R} g_R (\phi|_{e_R})^T \, ds$$

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

Dirichlet 边界

纯 Dirichlet 边界条件处理

如果 Poisson 方程只有 Dirichlet 边界条件, 则最终代数方程变为

$$Au = b$$

把 u 进行向量分解

$$u = u_I(\text{区域内部自由度}) + u_D(\text{Dirichlet 边界自由度})$$

代入离散代数系统, 可得

$$Au_I = F := b - Au_D$$

Dirichlet 边界

纯 Dirichlet 边界条件处理

$$Au_I = F := b - Au_D$$

接着有两种方法进行离散系统求解

- 在 A 和 F 中, 只区域内部自由度对应的子矩阵和子向量进行求解, 这样会改变原始离散系统的规模。
- 把 F 中 Dirichlet 边界自由度对应的分量设真解的值, 并把 A 中 Dirichlet 边界自由度对应的行列的主对角元素改为 1, 其它元素改为 0。

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

纯 Neumann 边界条例处理

如果 Poisson 方程只有 Neumann 边界条件, 则离散代数系统变为

$$\mathbf{A}u = \mathbf{b} + \mathbf{b}_N$$

而模型真解是关于常数唯一, 需要再加一个条件, 常用的条件是:

$$\int_{\Omega} u \, dx = 0 \rightarrow \int_{\Omega} \phi u \, dx = 0 \rightarrow \mathbf{C}u = 0$$

其中 $\mathbf{C} = [\int_{\Omega} \phi_0 \, dx, \dots, \int_{\Omega} \phi_{N-1} \, dx]$ 。最终系统化为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C}^T \\ \mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ \xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

纯 Robin 边界条件处理

如果 Poisson 方程只有 Robin 边界条件, 则离散代数系统变为

$$(A + R)u = b + b_R$$

直接求解即可。

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

混合边界条件

如果 Poisson 方程是混合边界条件,

$$(A + R)u = b + b_R + b_N$$

Remark

首先处理 Neumann 和 Robin 边界, 最后处理 Dirichlet 边界。

Outline

- 1 Poisson 方程变分与离散
- 2 边界条件处理
 - Dirichlet 边界
 - Neumann 边界
 - Robin 边界
 - 混合边界条件
- 3 作业

作业

根据下面椭圆方程模型, 构造一个二维有真解模型例子, 用 p 次有限元进行求解, 画出误差阶, 并输出误差表格。

$$-\Delta u + 3u = f, \quad \text{in } \Omega$$

$$u = g_D, \quad \text{on } \Gamma_D \leftarrow \mathbf{Dirichlet}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = g_N, \quad \text{on } \Gamma_N \leftarrow \mathbf{Neumann}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + u = g_R, \quad \text{on } \Gamma_R \leftarrow \mathbf{Robin}$$

求解区域为 $[0, 1]^2$, 其中在 $x = 0$ 上是 Robin 边界条件, 在 $x = 1$ 的边界上为 Neumann 边界条件, 其余边界为 Dirichlet 边界。