

Podstawy matematyki

Filip Fijałkowski

26 czerwca 2018

Spis treści

1	Teoria mnogości	1
1.1	Aksjomatyka teorii zbiorów	1
1.2	Operacje na zbiorach	3
1.3	Funkcje	3
1.4	Relacje równoważności.	4
1.5	Porządki na zbiorach	4
1.6	Liczby naturalne	5
1.7	Liczebność zbioru	6
1.8	Podstawowe struktury algebraiczne	7
1.9	Wielomiany	8
2	Przestrzenie metryczne	9
2.1	Odległość punktów	9
2.2	Topologia	9
2.3	Zbieżność ciągów	12
2.4	Funkcje ciągłe.	12
2.5	Zbieżność funkcji	14
2.6	Zbiory zwarte.	14
2.7	Zbiory zupełne.	16
2.8	Zbiory spójne	18
3	Liczby rzeczywiste	19
3.1	Aksjomatyka liczb rzeczywistych	19
3.2	Ciągi rzeczywiste	20
3.3	Szeregi rzeczywiste	20
4	Algebra liniowa	21
4.1	Podstawowe definicje	21
4.2	Przestrzenie o skończonym wymiarze	22
4.3	Suma prosta przestrzeni.	23
4.4	Przestrzeń dualna.	24
4.5	Przestrzeń ilorazowa.	24

5	Przestrzenie unormowane	27
5.1	Przestrzenie z normą	27
5.2	Norma homomorfizmu	28
5.3	Norma iloczynu przestrzeni	31
6	Różniczka funkcji	33
6.1	Małe wyższego rzędu	33
6.2	Definicja i algebraiczne własności różniczki	33
6.3	Twierdzenie o wartości średniej	35
6.4	Pochodne cząstkowe	36
6.5	Twierdzenie u funkcji uwikłanej	39
7	Algebra wieloliniowa	43
7.1	Iloczyn tensorowy przestrzeni.	43
7.2	Iloczyn tensorowy przestrzeni o skończonym wymiarze.	44
7.3	Przestrzenie wyższego rzędu.	45
7.4	Operatory wieloliniowe jako tensory.	46
7.5	Iloczyn zewnętrzny.	46
8	Iloczyn skalarny	47
9	Rozmaitości	49
10	Teoria miary	51
11	Całka Lebesgue'a	53

Rozdział 1

Teoria mnogości

1.1 Aksjomatyka teorii zbiorów

Aksjomat 1.1. Istnieje zbiór \emptyset nie zawierający żadnych elementów.

Dowód. Istotnie, dla dowolnego zbioru X zachodzi $x \notin X \implies x \notin \emptyset$ lub równoważnie $\forall x \in \emptyset \implies x \in X$ \square

Aksjomat 1.2. Jeśli $X \subseteq Y$ oraz $Y \subseteq X$ to $X = Y$.

Wniosek 1.3. Istnieje tylko jeden, unikalny zbiór pusty \emptyset .

Dowód. Przypuśćmy, że \emptyset oraz \emptyset' są zbiorami pustymi. Wówczas $\emptyset \subseteq \emptyset' \wedge \emptyset' \subseteq \emptyset \implies \emptyset = \emptyset'$. \square

Aksjomat 1.4. Dla dowolnych obiektów x, y istnieją zbiory $\{x\}, \{y\}, \{x, y\}$.

Aksjomat 1.5. Dla jakiegokolwiek rodziny zbiorów \mathcal{F} , istnieje zbiór $\bigcup \mathcal{F}$ spełniający warunek:

$$x \in \bigcup \mathcal{F} \iff \exists X \in \mathcal{F} : x \in X$$

Aksjomat 1.6. Dla dowolnego zbioru X , istnieje zbiór $\mathcal{P}(X)$ spełniający:

$$Y \in \mathcal{P}(X) \iff Y \subseteq X$$

Aksjomat 1.7. Niech $P(x)$ będzie własnością elementu x przyjmującą wartości 0 (fałsz) albo 1 (prawda). Dla dowolnego zbioru X istnieje zbiór Y taki, że:

$$x \in Y \iff x \in X \wedge P(x) = 1$$

Piszemy wówczas:

$$Y = \{x \in X | P(x)\}.$$

Wniosek 1.8. (Paradoks Russel'a) Nie istnieje „zbiór wszystkich zbiorów”.

Dowód. Dążąc do sprzeczności przypuśćmy, iż S jest „zbiorem wszystkich zbiorów”. Wówczas [Aks.1.7] gwarantuje istnienie:

$$X = \{x \in S \mid x \notin x\}.$$

Istnieją dwie wykluczające się możliwości:

1. $X \notin X$ co implikuje na podstawie definicji, że $X \in X$.
2. $X \in X$ co z kolei oznacza $X \notin X$.

Jak widać żadne z powyższych nie może zachodzić - nie ma takiego zbioru X , że jednocześnie $X \in X$ oraz $X \notin X$. S nie spełnia zatem [Aks.1.7] i nie może być zbiorem. \square

Aksjomat 1.9. (Aksjomat wyboru) Dla dowolnej rodziny niepustych zbiorów rozłącznych istnieje również zbiór zawierający dokładnie po jednym elemencie z każdego ze zbiorów rodziny.

Aksjomat 1.10. (Aksjomat nieskończoności) Istnieje zbiór I taki, że:

$$\emptyset \in I \wedge \forall_{x \in I} : x \cup \{x\} \in I.$$

Twierdzenie 1.11. [istnienie]: Niech I będzie dowolnym zbiorem opisanym w [Aks.1.10]. Istnieje dokładnie jeden zbiór J , że niezależnie od wyboru I zachodzi $J \subseteq I$.

Dowód. Ustalmy:

$$\mathcal{F} = \{X \in \mathcal{P}(I) \mid X \text{ spełnia [Aks.1.10]}\},$$

$$J = \bigcap \mathcal{F}.$$

Jak łatwo sprawdzić J spełnia warunek:

$$\emptyset \in J \wedge \forall_{x \in J} : x \cup \{x\} \in J. \quad (1.1)$$

[jednoznaczność]: Wybierzmy dowolny I' dla którego zachodzi (1.1) oraz J' spełniający warunki twierdzenia. Wówczas:

$$J = J' \iff \begin{cases} \emptyset \in I' \cap J \implies J' \subseteq J \\ J \subseteq J' \end{cases}$$

\square

Definicja 1.12. Zbiór J z tezy [Tw.1.11] nazywamy zbiorem **liczb naturalnych** \mathbb{N} .

Twierdzenie 1.13. Ustalmy funkcję:

$$f : \mathbb{N} \ni x \rightarrow x \cup \{x\} \in \mathbb{N}.$$

Dowolny element $n \in \mathbb{N} \setminus \emptyset$ można przedstawić w postaci:

$$n = f \circ \dots \circ f(\emptyset), \quad (1.2)$$

gdzie $f \circ \dots \circ f$ symbolizuje pewną skończoną liczbę złożień funkcji f .

Dowód. Wybierzmy podzbiór:

$$S = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ma przedstawienie postaci (1.2)}\}.$$

S spełnia warunki z [Aks.1.10], zatem:

$$S \subseteq \mathbb{N} \wedge \mathbb{N} \subseteq S \implies S = \mathbb{N}.$$

□

1.2 Operacje na zbiorach

Definicja 1.14. Niech A będzie podzbiorem X . *Dopełnieniem* A (względem X) nazywamy:

$$A' = X \setminus A$$

Twierdzenie 1.15. (Prawa De Morgana) Dla dowolnej rodziny zbiorów \mathcal{A} takiej, że $\forall A \in \mathcal{A} : A \subseteq X$ oraz $A' = X \setminus A$, zachodzą równości:

$$\left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A\right)' = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A', \quad \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A\right)' = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A'.$$

Dowód.

$$x \in \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A\right)' \iff \exists A \in \mathcal{A} : x \notin A \iff x \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A'.$$

Teraz do tej równości podstawmy $B = A'$ otrzymując:

$$\begin{aligned} \left(\bigcap_{B=A'} B\right)' &= \bigcup_{B=A'} B', \\ \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A'\right)' &= \bigcup_{A \in \mathcal{A}} (A')' = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A, \end{aligned}$$

□

1.3 Funkcje

Definicja 1.16. Zbiór wszystkich funkcji ze zbioru X w Y oznaczamy Y^X .

Definicja 1.17. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Wówczas:

- X nazywamy **domeną** f .
- Y nazywamy **kodomeną** f .
- $\text{Im}(f) = f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X : y = f(x)\}$ nazywamy **obrazem** f .
- $\text{graph}(f) = \{(x, y) \in X \times Y \mid x \in X, y = f(x)\}$ nazywamy **grafem** f .

- $f^{-1}(Z) = \{x \in X \mid f(x) \in Z\}$ nazywamy **przeciwbrazem** $Z \subseteq Y$.
- Jeśli $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ to funkcja jest **suriekcją**.
- Jeśli $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ to funkcję nazywamy **iniekcją**.
- Funkcję będącą zarazem iniekcją i suriekcją nazywamy **bijekcją**.

Definicja 1.18. Niech $\{X_i\}_{i \in I}$ będzie rodziną zbiorów. Iloczynem kartezjańskim rodziny nazywamy $\prod_{i \in I} X_i$ będący zbiorem funkcji $\phi : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i$ spełniających warunek $\phi(i) \in X_i$.

1.4 Relacje równoważności.

Definicja 1.19. Relacją równoważności na zbiorze X nazywamy podzbiór $\mathcal{R} \subseteq X \times X$ spełniający warunki:

1. $\forall x \in X : (x, x) \in \mathcal{R}$,
2. $(x, y) \in \mathcal{R} \wedge (y, z) \in \mathcal{R} \implies (x, z) \in \mathcal{R}$,
3. $(x, y) \in \mathcal{R} \implies (y, x) \in \mathcal{R}$.

Klasą abstrakcji elementu $x \in X$ względem relacji \mathcal{R} nazywamy:

$$[x]_{\mathcal{R}} = \{y \in X \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}.$$

Zbiór klas abstrakcji oznaczamy:

$$X/\mathcal{R} = \{[x]_{\mathcal{R}} \mid x \in X\}$$

Twierdzenie 1.20. Niech \mathcal{R} będzie relacją równoważności na zbiorze X . Istnieje funkcja rzutu na przestrzeń klas:

$$\pi : X \ni x \rightarrow [x]_{\mathcal{R}} \in X/\mathcal{R}$$

Dowód. Należy wykazać jedynie, że element $[x]_{\mathcal{R}}$ jest wyznaczony jednoznacznie niezależnie od wyboru reprezentanta. Przypuśćmy, że $x \in [x]_{\mathcal{R}}$ oraz $x \in [y]_{\mathcal{R}}$. Wówczas:

$$z \in [y]_{\mathcal{R}} \iff \begin{cases} z \in [x]_{\mathcal{R}} \implies (x, z) \in \mathcal{R}, \\ x \in [y]_{\mathcal{R}} \implies (y, x) \in \mathcal{R}, \end{cases}$$

skąd $[y]_{\mathcal{R}} \subseteq [x]_{\mathcal{R}}$. W analogiczny sposób możemy wykazać $[x]_{\mathcal{R}} \subseteq [y]_{\mathcal{R}}$. \square

1.5 Porządkowanie na zbiorach

Definicja 1.21. Porządkiem na zbiorze X nazywamy podzbiór $\leq \subseteq X \times X$ spełniający warunki:

1. $\forall x \in X : (x, x) \in \leq$

2. $(x, y) \in \leq \wedge (y, z) \in \leq \implies (x, z) \in \leq$
3. $(x, y) \in \leq \wedge (y, x) \in \leq \implies x = y$

Fakt, że $(x, y) \in \leq$ zapisujemy symbolicznie: $x \leq y$. Parę (X, \leq) nazywamy zbiorem uporządkowanym.

Definicja 1.22. Porządek jest **liniowy** jeśli spełniony jest warunek:

$$\forall x, y \in X \ x \leq y \vee y \leq x.$$

Definicja 1.23. Porządek na zbiorze X jest **dobry** jeśli każdy niepusty podzbiór $Y \subseteq X$ posiada element najmniejszy, to znaczy:

$$Y \subseteq X \implies \exists y_0 \in Y \forall y \in Y : y_0 \leq y$$

Definicja 1.24. Ograniczeniem **dolnym**(górnym) podzbioru zbioru uporządkowanego $A \subseteq X$ nazywamy element $x_0 \in X$ taki, że $\forall a \in A \ x_0 \leq a$ ($x_0 \geq a$).

Definicja 1.25. Element a_0 podzbioru $A \subseteq X$ jest **minimum**(maksimum) A jeśli $a_0 \in A$ i równocześnie a_0 jest ograniczeniem dolnym(górnym) tego podzbioru. Piszemy wtedy $a_0 = \min A$ ($\max A$).

Definicja 1.26. Na podzbiorze $A \subseteq X$ zbioru uporządkowanego definiujemy **supremum** i **infimum** wzorami:

$$\begin{aligned} \sup A &= \min \{x \in X \mid x \text{ jest ograniczeniem górnym } A\}, \\ \inf A &= \max \{x \in X \mid x \text{ jest ograniczeniem dolnym } A\}. \end{aligned}$$

Definicja 1.27. Niech (X, \leq) będzie zbiorem uporządkowanym. Wówczas zbiór $Y \subseteq X$ nazywamy **łańcuchem** jeśli zbiór $(Y, \leq|_Y)$ jeśli porządek określony na Y jest liniowy, gdzie:

$$\leq|_Y = (Y \times Y) \cap \leq$$

Twierdzenie 1.28. (Kuratowski-Zorn) Jeśli X jest zbiorem uporządkowanym oraz każdy łańcuch w X ma ograniczenie górne, to X ma element maksymalny.

Dowód. Można wykazać równoważność z [Aks.1.9], co mogę zrobić w razie nadmiaru czasu. \square

1.6 Liczby naturalne

Definicja 1.29. Porządkiem liczb naturalnych nazywamy relację:

$$x \leq y \iff x \subseteq y,$$

gdzie $x, y \in \mathbb{N}$.

Twierdzenie 1.30. Porządek liczb naturalnych jest dobry.

Dowód. Rozumując przez zaprzeczenie przypuśćmy, że pewien niepusty podzbiór $S \subseteq \mathbb{N}$ nie ma elementu najmniejszego. Zbiór:

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ jest ograniczeniem dolnym } S\}$$

Jest niepusty, gdyż na podstawie [Tw.1.11] $\emptyset \in B$. Przyjmijmy oznaczenia z [Tw.1.13].

Niech $n \in B$, skoro S nie ma minimum to $n \notin S$ oraz $\forall m \in S : n < m$. Stąd $f(n) \leq m \implies f(n) \in B \implies B = \mathbb{N}$. A zatem $m \in A \implies m \in \mathbb{N} \implies m \in B \implies m$ jest elementem najmniejszym A . \square

Uwaga 1.31. Elementy zbioru liczb naturalnych:

$$\mathbb{N} = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots\},$$

oznaczamy:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Twierdzenie 1.32. (Zasada indukcji) Niech $S \subseteq \mathbb{N}$, natomiast $S \ni p \mapsto P(x) \in \{0, 1\}$ pewną funkcją logiczną. Wówczas jeśli:

$$(\forall_{S \ni x \leq y} : P(x) = 1) \implies P(y) = 1, \quad (1.3)$$

to zachodzi:

$$\forall_{y \in S} : P(y) = 1.$$

Dowód. Niech $Z = \{x \in S \mid \neg P(x)\}$, a z_0 będzie elementem najmniejszym Z . Jeśli $\forall_{S \ni x \leq y} : P(x)$ to $\forall_{x \leq z_0} : P(x) \implies P(z_0) \implies z_0 \notin Z \implies Z = \emptyset$. \square

1.7 Liczebność zbioru

Definicja 1.33. Zbiory A i B są **równoliczne** jeśli istnieje bijekcja $f : A \rightarrow B$. Jest to relacja równoważności oznaczana często przez $A \sim B$.

Uwaga 1.34. Równoliczność zbiorów jest relacją równoważności.

Definicja 1.35. Zbiór nazywamy **policzalnym** jeśli jest równoliczny z jakimś podzbiorem zbioru liczb naturalnych.

Twierdzenie 1.36. Dla żadnego X nie istnieje suriekcja $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$.

Dowód. Weźmy funkcję $\phi : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Wykażemy, że ϕ nie jest suriekcją pokazując, że:

$$Y = \{x \in X \mid x \notin \phi(x)\} \quad (1.4)$$

nie należy do $\text{Im}(\phi)$.

Dążąc do sprzeczności przypuśćmy $\phi(y) = Y$. Wówczas:

1. $y \in Y \implies y \notin \phi(y) = Y$, albo
2. $y \notin Y \implies y \in \phi(y) = Y$,

co doprowadza nas do sprzeczności - nie możemy wybrać takiego y , że jego obrazem jest (1.4). \square

Twierdzenie 1.37. (Cantor-Bernstein-Schröder) Jeśli A ma podzbiór równoliczny z B , a B ma podzbiór równoliczny z A , to $A \sim B$.

Dowód. Zgodnie z założeniem możemy znaleźć bijekcje f, g takie, że:

$$f(A) = B_1 \subseteq B, \quad g(B) = A_1 \subseteq A.$$

Ustalmy też dwa ciągi:

$$B_n = f(A_{n-1}), \quad A_n = g(B_{n-1})$$

Możemy przedstawić:

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \cup (A \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots,$$

$$A_1 = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup \dots,$$

lub jako:

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \cup M \cup N, \quad A_1 = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \cup M \cup N_1,$$

gdzie:

$$M = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup (A_5 \setminus A_6) \cup \dots,$$

$$N = (A \setminus A_1) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup (A_4 \setminus A_5) \cup \dots,$$

$$N_1 = (A_2 \setminus A_3) \cup (A_4 \setminus A_5) \cup (A_6 \setminus A_7) \cup \dots$$

Zauważmy, że $f \circ g$ jest bijekcją oraz: $f \circ g(A \setminus A_1) = A_2 \setminus A_3$, skąd wynika również $N \sim N_1$. Stąd $A_1 \sim A$ i rezultacie $A \sim B$, jako że równoliczność zbiorów jest relacją równoważności oraz $A \sim B$. \square

1.8 Podstawowe struktury algebraiczne

Definicja 1.38. Funkcję postaci $\odot : X \times X \rightarrow X$ nazywamy **działaniem na zbiorze** X . Jeśli ponadto:

1. $\forall_{x,y,z \in X} : x \odot (y \odot z) = (x \odot y) \odot z$ to działanie nazywamy **łącznym**.
2. $\forall_{x,y \in X} : x \odot y = y \odot x$ to działanie nazywamy **przemienne**.
3. $\exists e \in X \forall_{x \in X} : x \odot e = e \odot x = x$ to e nazywamy **elementem neutralnym działania**.

Definicja 1.39. Niech dwie pary $(S, \odot_1), (P, \odot_2)$ będą odpowiednio dwoma zbiorami z działaniami. **Homomorfizmem** nazywamy funkcję $f : S \rightarrow P$ taką, że:

$$\forall a, b \in S : f(a \odot_1 b) = f(a) \odot_2 f(b),$$

czyli zachowującą działanie.

Definicja 1.40. **Izomorfizmem** nazywamy homomorfizm będący bijekcją.

Definicja 1.41. **Grupa** to trójka $(G, \cdot, \mathbb{1})$, gdzie:

1. G jest zbiorem.
2. \cdot jest działaniem łącznym.
3. $\mathbb{1}$ jest elementem neutralnym działania.
4. $\forall g \in G \exists g^{-1} \in G : g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = \mathbb{1}$

Jeśli ponadto działanie \cdot jest przemienne to grupę nazywamy **abelową**.

Definicja 1.42. **Pierścień** to piątka $(R, +, \cdot, 0, \mathbb{1})$, gdzie:

1. $(R, +, 0)$ jest grupą abelową.
2. \cdot jest działaniem łącznym.
3. $\mathbb{1}$ jest elementem neutralnym działania „ \cdot ”.
4. Zachodzi **rozdzielność** dodawania względem mnożenia:

$$\forall a, b, c \in R : (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Definicja 1.43. **Ideałem** w pierścieniu R nazywamy $I \subseteq R$ spełniający:

1. $(I, +, 0)$ jest grupą.
2. $\forall a \in I \forall x \in R : a \cdot x \in I \wedge x \cdot a \in I$
3. $\mathbb{1} \notin I$

Definicja 1.44. **Ciało** to piątka $(\mathbb{K}, +, \cdot, 0, \mathbb{1})$, gdzie:

1. $(\mathbb{K}, +, \cdot, 0, \mathbb{1})$ jest pierścieniem.
2. $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot, \mathbb{1})$ jest grupą abelową.
3. $\mathbb{1} \neq 0$

1.9 Wielomiany

Definicja 1.45. Niech P będzie pierścieniem. **Pierścień wielomianów** $P[x]$ to przestrzeń funkcji postaci:

$$P \ni x \rightarrow \sum_{i=1}^n \in P,$$

gdzie $n \in \mathbb{N}$

Twierdzenie 1.46. Niech $P[x]$ będzie pierścieniem wielomianów, a $I \subseteq P[x]$ ideałem. Istnieje taki element $w(x) \in P[x]$ dla którego:

$$I = \{f(x) \in P[x] | f(x) = w(x) \cdot p(x), p(x) \in P[x]\}.$$

Rozdział 2

Przestrzenie metryczne

2.1 Odległość punktów

Definicja 2.1. Niech S będzie dowolnym zbiorem, a $\rho : S \times S \rightarrow [0, \infty]$ funkcją spełniającym warunki:

1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$,
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$,
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Wówczas funkcję ρ nazywamy **metryką** na zbiorze S . Para (S, ρ) to **przestrzeń metryczna**.

Definicja 2.2. Niech S będzie przestrzenią metryczną. **Średnicą** podzbioru $A \subseteq S$ liczbę:

$$\sup \{\rho(x, y) | x, y \in A\}.$$

2.2 Topologia

Definicja 2.3. Niech S będzie przestrzenią metryczną. **Kulą otwartą** o środku $x_0 \in S$ i promieniu $r \in \mathbb{R} \ni r > 0$ nazywamy zbiór:

$$B(x_0, r) = \{x \in S : \rho(x_0, x) < r\}.$$

Definicja 2.4. Niech S będzie przestrzenią metryczną. Mówimy, że $X \subseteq S$ jest **podzbiorem otwartym przestrzeni metrycznej** jeśli każdy jego punkt jest środkiem pewnej kuli w nim zawartej. Równoważnie można napisać:

$$\forall x \in X \exists r > 0 : B(x, r) \subseteq X.$$

Twierdzenie 2.5. Kula otwarta jest zbiorem otwartym.

Dowód. Rozważmy dowolną kulę $\mathcal{B}(x_0, R)$ i jakikolwiek należący do niej punkt $x \in \mathcal{B}(x_0, R)$. Dla wygody wprowadźmy oznaczenie $\rho(x, x_0) = r$.

Wykażemy, że $\mathcal{B}(x, R - r) \subseteq \mathcal{B}(x_0, R)$. Wówczas, skoro x jest wybrany dowolnie, dowód będzie zakończony. Istotnie, dla dowolnego $y \in \mathcal{B}(x, R - r)$ mamy:

$$\rho(x_0, y) \leq \rho(x_0, x) + \rho(x, y) = r + (R - r) = R.$$

□

Twierdzenie 2.6. Niech \mathcal{T} będzie rodziną wszystkich otwartych podzbiorów przestrzeni metrycznej \mathcal{S} . Spełnia ona warunki:

1. Dla dowolnej podrodziny $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{T}$, suma $\bigcup_{X \in \mathcal{P}} X \in \mathcal{T}$.
2. Dla dowolnej skończonej podrodziny $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{T}$, przecięcie $\bigcap_{X \in \mathcal{P}} X \in \mathcal{T}$.
3. $\emptyset, \mathcal{S} \in \mathcal{T}$.

Dowód. (1): Skoro każdy punkt każdego zbioru jest środkiem pewnej kuli w tym zbiorze, to tym bardziej jest również środkiem kuli w sumie zbiorów.

(2): Ponieważ rodzina \mathcal{P} jest skończona, to możemy ponumerować zbiory w niej zawarte w następujący sposób: $\mathcal{P} = \{X_1, X_2, \dots, X_k\}$, gdzie $k \in \mathbb{N}$. Wówczas zachodzi:

$$\forall_{x \in \bigcap_{i=1}^k X_i} \forall_{i \in \{1, \dots, k\}} \exists_{\varepsilon_k > 0} : \mathcal{B}(x, \varepsilon_k) \subseteq X_i.$$

Jeśli wprowadzimy oznaczenie $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k\}$ to $\mathcal{B}(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^k X_i$.

(3): \mathcal{S} oraz \emptyset należą do \mathcal{T} wprost z definicji kuli [Def.2.4].

□

Definicja 2.7. Niech X będzie dowolnym zbiorem, a rodzina \mathcal{T} jego podzbiorów spełnia trzy warunki wymienione w [Tw.2.6]. Rodzinę \mathcal{T} nazywamy wówczas **topologią** X . Para (X, \mathcal{T}) to **przestrzeń topologiczna**. Każdy zbiór $X \in \mathcal{T}$ nazywamy **otwartym**.

Uwaga 2.8. Każda przestrzeń metryczna jest topologiczna.

Definicja 2.9. **Otoczeniem** punktu x w przestrzeni topologicznej (X, \mathcal{T}) nazywamy dowolny zbiór $\mathcal{N}_x \subseteq X$, że dla pewnego $U \in \mathcal{T}$ zachodzi $x \in U \subseteq \mathcal{N}_x$.

Definicja 2.10. Podzbiór $A \subseteq X$ przestrzeni topologicznej X nazywamy **domkniętym** jeśli jego dopełnienie $A' = X \setminus A$ jest otwarte.

Twierdzenie 2.11. Niech \mathcal{T}' będzie rodziną wszystkich zamkniętych podzbiorów przestrzeni topologicznej \mathcal{S} . Spełnia ona warunki:

1. Dla dowolnej podrodziny $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{T}'$, przecięcie $\bigcap_{X \in \mathcal{P}} X \in \mathcal{T}'$.
2. Dla dowolnej skończonej podrodziny $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{T}'$, suma $\bigcup_{X \in \mathcal{P}} X \in \mathcal{T}'$.
3. $\emptyset, \mathcal{S} \in \mathcal{T}'$.

Dowód. Wystarczy zastosować [Tw.1.15] do tezy [Tw.2.6].

□

Definicja 2.12. Niech \mathcal{S} będzie przestrzenią topologiczną, a $A \subseteq X$ jej podzbiorem. **Domknięciem** tego podzbioru nazywamy przecięcie \bar{A} wszystkich zbiorów zamkniętych zawierających A .

Wniosek 2.13. Zbiór A jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy $A = \bar{A}$.

Wniosek 2.14. W szczególności z [Def.2.12] wynika $A \subseteq \bar{A}$.

Twierdzenie 2.15. Punkt x należy do domknięcia \bar{A} zbioru A w przestrzeni topologicznej wtedy i tylko wtedy, gdy dowolne otoczenie x przecina A .

Dowód. Dowód podzielimy na dwie części najpierw z lewej strony równoważności wyprowadzając prawą, a następnie z prawej wyprowadzając lewą.

(\Rightarrow): Przyjmijmy, że $x \in \bar{A}$, ale istnieje otoczenie otwarte \mathcal{U}_x tego punktu które nie przecina A . Wówczas zbiór $Z = \bar{A} \cap (X \setminus \mathcal{U}_x)$ jest domknięty na mocy [Tw.2.11.1] oraz $A \subseteq Z \subseteq \bar{A}$ i $Z \neq \bar{A}$, co przeczy [Def.2.12].

(\Leftarrow): Jeśli dowolne otoczenie x przecina A , ale istnieje zbiór domknięty Z taki, że $A \subseteq Z$ i $x \notin Z$, to $x \in Z'$ oraz Z' jest otwarty. Jest to niemożliwe, gdyż nie istnieje kula $\mathcal{B}(x, \varepsilon) \subseteq Z'$. \square

Definicja 2.16. Niech $A \subseteq X$ będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej. **Wnętrzem** zbioru A nazywamy $A^\circ \subseteq X$ będący sumą wszystkich zbiorów otwartych zawartych w A .

Definicja 2.17. **Brzegiem** podzbioru A przestrzeni topologicznej nazywamy $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$.

Wniosek 2.18. Ponieważ dla dowolnych zbiorów $A \setminus B = A \cap B'$, brzeg można zdefiniować równoważnie jako $\partial A = \bar{A} \cap \overline{A'}$.

Definicja 2.19. Niech (X_i, \mathcal{T}_i) dla $i = 1, \dots, n$ będzie rodziną przestrzeni topologicznych. **Iloczynem przestrzeni topologicznych** nazywamy parę $(X_1 \times \dots \times X_n, \mathcal{T}_1 \times \dots \times \mathcal{T}_n)$.

Definicja 2.20. Niech $(X_i, \mathcal{T}_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ będzie rodziną przestrzeni topologicznych. **Iloczynem kartezjańskim przestrzeni topologicznych** nazywamy zbiór $X = X_1 \times \dots \times X_n$ wraz z topologią:

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 \times \dots \times \mathcal{T}_n$$

Twierdzenie 2.21. Niech $(X_1 \times \dots \times X_n)$ będzie iloczynem przestrzeni metrycznych (X_i, ρ_i) . Wówczas topologia iloczynu kartezjańskiego jest generowana przez metrykę:

$$\rho(x, y) = \min_i \rho_i(x_i, y_i),$$

gdzie $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$.

Dowód. Dla wygody oznaczmy przez \mathcal{S} topologię generowaną przez metrykę ρ . Jeśli kula $\mathcal{B}_\mathcal{S}(x, r) \in \mathcal{S}$, to $\mathcal{B}_\mathcal{S}(x, r) = X \setminus \overline{\mathcal{B}_\mathcal{T}(x, r)} \in \mathcal{T}$.

Odwrotnie dla $\mathcal{B}_\mathcal{T}(x, r) \in \mathcal{T}$ zachodzi $\mathcal{B}_\mathcal{T}(x, r) = X \setminus \overline{\mathcal{B}_\mathcal{S}(x, r)} \in \mathcal{S}$ \square

2.3 Zbieżność ciągów

Definicja 2.22. Ciąg elementów X nazywamy funkcję $f \in X^{\mathbb{N}}$.

Definicja 2.23. Niech S będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy, że ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ **zbiega** do punktu $x \in S$ jeśli dla dowolnego $\mathcal{N}_x \subseteq S$ będącego otoczeniem x :

$$\exists N \forall n > N : x_n \in \mathcal{N}_x.$$

Innymi słowy do dowolnie małej kuli wokół x należą wszystkie elementy ciągu poza co najwyżej skończenie wieloma. Stosujemy notację:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x.$$

Wniosek 2.24. Następujące warunki są równoważne:

1. Punkt x należy do domknięcia \bar{A} zbioru A .
2. istnieje ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ zbieżny do x .

Dowód. Trywialne z [Tw.2.15]. □

Definicja 2.25. Niech $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S$ będzie ciągiem w przestrzeni metrycznej. Mówimy, że jest on **ciągłem Cauchy'ego** jeśli:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n, m > N_\varepsilon : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon,$$

albo równoważnie:

$$\rho(x_m, x_n) \xrightarrow[n, m \rightarrow \infty]{} 0 \quad (2.1)$$

Uwaga 2.26. Jeśli ciąg jest zbieżny w przestrzeni metrycznej to spełnia Warunek Cauchy'ego.

Dowód. Dla ciągu $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zbieżnego do x zachodzi $\exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$, a wtedy $\forall m, n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. □

2.4 Funkcje ciągłe.

Definicja 2.27. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ między przestrzeniami topologicznymi (X, \mathcal{T}_X) i (Y, \mathcal{T}_Y) jest **ciągła** jeśli przeciwobraz każdego podzbioru $\tau \in \mathcal{T}_Y$ jest otwarty, to znaczy:

$$\forall \tau \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(\tau) \in \mathcal{T}_X.$$

Twierdzenie 2.28. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją między przestrzeniami topologicznymi. Następujące warunki są równoważne:

1. f jest ciągła.
2. A jest domknięty w $Y \implies f^{-1}(A)$ jest domknięty w X .
3. $\forall A \subseteq X : f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

4. Dla każdego $x \in X$ i otoczenia $\mathcal{N}_{f(x)}$ punktu $f(x)$ istnieje otoczenie \mathcal{N}_x punktu x spełniające: $f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{N}_{f(x)}$.

Dowód. (1) \implies (4): Dla dowolnego otoczenia $\mathcal{N}_{f(x)}$ punktu $f(x)$ można wybrać zbiór otwarty $\mathcal{U}_{f(x)} \subseteq \mathcal{N}_{f(x)}$ oraz zbiór $\mathcal{N}_x = f^{-1}(\mathcal{U}_{f(x)}) = \{x : f(x) \in \mathcal{U}_{f(x)}\}$. \mathcal{N}_x jest otwartym otoczeniem x oraz $f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{N}_{f(x)}$.

(4) \implies (3): Weźmy dowolne $x \in \bar{A}$. i otoczenie $\mathcal{N}_{f(x)}$. Istnieje \mathcal{N}_x dla którego $f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{N}_{f(x)}$. Z [Tw. 2.15]:

$$\mathcal{N}_x \cap A \neq \emptyset \implies \emptyset \neq f(\mathcal{N}_x \cap A) \subseteq \mathcal{N}_{f(x)} \cap f(A)$$

Zatem dowolne otoczenie $f(x)$ przecina $f(A)$.

(3) \implies (2): Niech $F \subseteq Y$ będzie domkniętym zbiorem. Oznaczmy $A = f^{-1}(F)$. Wówczas $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \bar{F} = F \implies \bar{A} \subseteq A \implies \bar{A} = A$

(2) \implies (1): Trywialne z [Def.2.10]. \square

Definicja 2.29. $f : X \rightarrow Y$ jest **ciągła w punkcie** x jeśli dla dowolnego otoczenia $\mathcal{N}_{f(x)}$ punktu $f(x)$ można znaleźć takie otoczenie \mathcal{N}_x punktu x , że $f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{N}_{f(x)}$.

Twierdzenie 2.30. Niech \mathcal{S}, \mathcal{R} będą przestrzeniami metrycznymi. Następujące warunki są równoważne:

1. Przekształcenie $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{R}$ jest ciągłe w x .
2. Dla każdego ciągu $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}$:

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

Dowód. (1) \implies (2): Z [Def.2.29] wynika, iż dla dowolnej kuli $\mathcal{B}_{f(x)}$ wokół $f(x)$ znajdziemy kulę \mathcal{B}_x wokół x spełniającą: $f(\mathcal{B}_x) \subseteq \mathcal{B}_{f(x)}$.

Zatem jeśli \mathcal{B}_x zawiera prawie wszystkie elementy $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ to $\mathcal{B}_{f(x)}$ zawiera prawie wszystkie elementy $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$.

(2) \implies (1): Gdyby f nie było ciągłe w x to możemy wybrać takie otoczenie $\mathcal{N}_{f(x)}$, że żadne otoczenie punktu x nie spełnia warunku $f(\mathcal{N}_x) \subseteq \mathcal{N}_{f(x)}$. To znaczy możemy wybrać taki ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, że:

$$x_n \in \mathcal{B}\left(x, \frac{1}{n}\right) \wedge x_n \notin \mathcal{N}_{f(x)}.$$

Co implikuje:

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies f(x_n) \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

\square

Definicja 2.31. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ między przestrzeniami metrycznymi (X, ρ_X) oraz (Y, ρ_Y) jest **jednostajnie ciągła** jeśli:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \rho_X(x, y) \leq \delta \implies \rho_Y(f(x), f(y)) \leq \varepsilon.$$

Definicja 2.32. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ między przestrzeniami metrycznymi (X, ρ_X) i (Y, ρ_Y) spełnia **warunek Lipchitza** jeśli istnieje liczba $\mathbb{R} \ni L > 0$ taka, że:

$$\forall x_1, x_2 \in X : \rho_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot \rho_X(x_1, x_2)$$

Twierdzenie 2.33. Funkcja f spełniająca warunek Lipchitza jest ciągła.

Dowód. f spełnia [Tw. 2.30.2], gdyż jeśli ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ jest zbieżny, to:

$$\rho_X(x_n, x_m) \rightarrow 0 \implies 0 \leq \rho_Y(f(x_n), f(x_m)) \leq L \cdot \rho_X(x_n, x_m) \rightarrow 0$$

□

2.5 Zbieżność funkcji

Definicja 2.34. Niech $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ będzie ciągiem funkcji $f_n : X \rightarrow Y$. Jeśli zbiega on do $f : X \rightarrow Y$ w metryce:

$$\rho_{\text{sup}}(f_n, f) = \sup_{x \in X} \rho(f_n(x), f(x)),$$

gdzie (Y, ρ) jest przestrzenią metryczną, to mówimy, że ciąg f_n **zbiega jednostajnie** do f .

Twierdzenie 2.35. Niech ciąg funkcji $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zbiega jednostajnie do $f : X \rightarrow Y$, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi.

Wtedy, jeśli prawie wszystkie funkcje f_n są ciągłe w $x \in X$ to f jest ciągła w x .

Dowód.

$$\begin{aligned} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x &\implies d(f(x_n), f(x)) \leq \\ &\leq d(f(x_n), f_n(x_n)) + d(f_n(x_n), f(f_n(x))) + d(f_n(x), f(x)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

□

2.6 Zbiory zwarte.

Definicja 2.36. Rodzina \mathcal{F} podzbiorów przestrzeni topologicznej (S, \mathcal{T}) nazywamy **pokryciem** zbioru $X \subseteq S$ jeśli:

$$X \subseteq \bigcup \mathcal{F}$$

Gdy $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{T}$ pokrycie nazywamy **otwartym**.

Definicja 2.37. Przeliczalny ciąg $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ podzbiorów przestrzeni topologicznej jest **zstępujący** jeśli każde skończone przecięcie zbiorów A_n jest niepuste:

$$\forall m \in \mathbb{N} \bigcap_{n=1}^m A_n \neq \emptyset$$

Definicja 2.38. Zbiór X nazywamy **zwartym** jeśli z dowolnego jego pokrycia otwartego można wybrać podpokrycie skończone.

Lemat 2.39. (Liczba Lesbegue'a) Niech $A \subseteq (\mathcal{M}, \rho)$ będzie podzbiorem przestrzeni metrycznej, natomiast \mathcal{F} jego pokryciem. Jeśli z każdego ciągu w A można wybrać podciąg zbieżny do jakiegoś punktu $a \in A$, to istnieje liczba $\mathbb{R} \ni \delta > 0$, że dla dowolnego $x \in A$ kula $\mathcal{B}(x, \delta)$ jest w całości zawarta w jednym z elementów rodziny \mathcal{F} .

Dowód. Dążąc do sprzeczności przypuśćmy, że taka liczba nie istnieje. Możemy zatem wybrać ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ spełniający warunek:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in A : \mathcal{B}\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \text{ nie jest zawarta w żadnym z elementów } \mathcal{F}.$$

Wybermy takie a , że istnieje podciąg:

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \supseteq \{x_{n_m}\}_{m \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a.$$

Musi istnieć zbiór U otwarty spełniający $a \in U \in \mathcal{F}$ oraz kula $\mathcal{B}(a, \varepsilon) \subseteq U$ zawierająca prawie wszystkie elementy podciągu. Dla dostatecznie dużego $m \in \mathbb{N}$ zachodzi:

1. $\frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$
2. $d(x_{n_m}, a) < \frac{\varepsilon}{2}$

Wówczas kula $\mathcal{B}\left(x_{n_m}, \frac{1}{m}\right) \subseteq U$ co przeczy założeniu. \square

Twierdzenie 2.40. Niech $X \subseteq \mathcal{M}$ będzie podzbiorem przestrzeni metrycznej. Następujące warunki są równoważne:

1. Zbiór X jest zwarty.
2. Każdy zstępujący ciąg $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ niepustych zbiorów domkniętych w X (traktowanego jako podprzestrzeni metryczna) ma niepuste przecięcie.
3. Z każdego ciągu $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ można wybrać podciąg zbieżny do pewnego $x \in X$.

Dowód. (1) \implies (2): Załóżmy wbrew tezie, iż $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$. Zdefiniujmy rodzinę:

$$\mathcal{U} = \{X \setminus A_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

\mathcal{U} jest otwartym pokryciem X , gdyż:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_n) = X \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = X,$$

z drugiej strony z \mathcal{U} nie da się wybrać skończonego podpokrycia X , co jest skutkiem [Def.2.37]. Zatem przestrzeń X nie jest zwarta.

(2) \implies (3): Weźmy dowolny ciąg oraz rodzinę zbiorów domkniętych $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ określoną:

$$F_n = \overline{\{x_m : m \geq n\}}.$$

Zgodnie z (2) istnieje punkt $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Każde otoczenie a przecina dowolny ze zbiorów $\{x_n : n \geq m\}$. Zatem zgodnie z [Def.2.23] możemy wybrać podciąg $\{x_{n_m}\} \subseteq \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ taki, że:

$$x_{n_m} \in \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \cap B\left(a, \frac{1}{m}\right), \text{ więc } x_{n_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} a.$$

(3) \implies (1): Niech \mathcal{U} będzie otwartym pokryciem X , a δ liczbą Lesbegue’a tego pokrycia wybraną zgodnie z [Lem.2.39]. Dążąc do sprzeczności przypuścimy, że zbioru X nie da się pokryć skończoną liczbą elementów \mathcal{U} .

Rodzina $\{B(x, \delta) : x \in X\}$ jest otwartym pokryciem, ale nie można z niej wybrać pokrycia skończonego X . Gdyby się dało znaleźć takie $\{B_1, \dots, B_m\}$, to $\{U_1, \dots, U_m\} \subseteq \mathcal{U}$, gdzie $B_i \subseteq U_i$ byłoby również skończonym pokryciem.

Możemy zatem wziąć taki ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, że $x_m \notin \bigcup_{n < m} B(x_n, \delta)$. Ale wtedy dla $n \neq m$ mamy $d(x_n, x_m) > \frac{\delta}{2}$. Tak wybrany ciąg nie może mieć podciągu zbieżnego. \square

Twierdzenie 2.41. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie ciągłą funkcją między dwoma przestrzeniami metrycznymi. Jeśli $A \subseteq X$ jest zbiorem zwartym, to $f(X)$ jest też zwarty.

Dowód. Trywialny wniosek z [Tw.2.30] oraz [Tw.2.40.3]. Wybierzmy dowolny ciąg $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ i odpowiadający mu ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ taki, że $f(x_n) = y_n$. Ten drugi ma podciąg $x_{n_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x$, którego obraz zbiega do $y = f(x)$. \square

Twierdzenie 2.42. Domknięty podzbiór K przestrzeni zwartej S jest zwarty.

Dowód. Niech \mathcal{U} będzie otwartym pokryciem K . $\mathcal{U} \cup (S \setminus K)$ jest otwartym pokryciem S z którego możemy wybrać podpokrycie skończone. \square

Definicja 2.43. Niech S będzie przestrzenią metryczną. Podzbiór $X \subseteq S$ nazywamy *ograniczonym* jeśli jest zawarty w jakiejś kuli.

2.7 Zbiory zupełne.

Definicja 2.44. Przestrzeń metryczna \mathcal{M} jest *zupełna* jeśli każdy ciąg Cauchy’ego w niej zawarty ma granicę należącą do \mathcal{M} .

Definicja 2.45. Niech (\mathcal{M}, ρ) będzie przestrzenią metryczną. Funkcję $f : X \rightarrow X$ nazywa się *kontrakcją* jeśli istnieje $\lambda \in]0, 1[$ spełniająca:

$$\forall x, y \in X : \rho(f(x), f(y)) \leq \lambda \cdot \rho(x, y).$$

Definicja 2.46. Punktem stałym funkcji $f : X \rightarrow X$ nazywamy taki $x \in X$, że $f(x) = x$.

Twierdzenie 2.47. (Banacha o punkcie stałym) Jeśli (X, ρ) jest przestrzenią metryczną zupełną, a $f : X \rightarrow X$ kontrakcją, to f ma dokładnie jeden punkt stały.

Dowód. (1): Przypuśćmy, że istnieją dwa punkty stałe x i y :

$$\rho(x, y) = \rho(f(x), f(y)) = \lambda \cdot d(x, y) \implies x = y$$

(2): Z powyższego wyniku unikalność punktu stałego. Pozostaje udowodnić jego istnienie.

Wybermy dowolny $x_0 \in X$ i zdefiniujmy rekurencyjnie ciąg: $x_{n+1} = f(x_n)$. Przyjmując bez utraty ogólności $m > n$ i korzystając z nierówności trójkąta wykażemy, że to ciąg Cauchy'ego:

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + \dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq \sum_{i=1}^m \lambda^i \cdot d(x_1, x_0) \leq \\ &\leq \lambda^n \cdot \frac{d(x_1, x_0)}{1-\lambda} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Skoro przestrzeń X jest zupełna, to istnieje granica ciągu $x \in X$ i:

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x_n) = x$$

Gdyż kontrakcja jako funkcja lipschizowska jest ciągła na mocy [Stw.2.33]. \square

Twierdzenie 2.48. Następujące warunki są równoważne:

1. Przestrzeń metryczna \mathcal{M} jest zupełna.
2. Każdy zstępujący ciąg niepustych kul zamkniętych w \mathcal{M} , o średnicach dążących do 0, ma niepuste przecięcie.

Dowód. (1) \implies (2): Dążąc do sprzeczności przypuśćmy, że zstępujący ciąg kul \overline{B}_n w przestrzeni metrycznej zupełnej ma puste przecięcie. Wówczas dowolny ciąg $x_n \in \overline{B}_n$ spełnia warunek Cauchy'ego (co wynika z definicji średnicy [Def.2.2]), zatem $x_n \rightarrow x$ dla jakiegoś $x \in X$. W świetle [Tw.2.15] $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \overline{B}_n$.

(2) \implies (1): Przypuśćmy, że $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ jest ciągiem Cauchy'ego. Wówczas istnieje ciąg kul domkniętych $\{\overline{B}(x_n, r_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ gdzie, $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq \overline{B}(x_n, r_n)$ oraz punkt $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}(x_n, r_n)$ będący granicą ciągu x_n . \square

Definicja 2.49. Niech (X, \mathcal{T}) będzie przestrzenią topologiczną. Zbiór $\Omega \subseteq X$ jest **gęsty** w $S \subseteq X$ jeśli $S \subseteq \overline{\Omega}$.

Definicja 2.50. Niech (X, \mathcal{T}) będzie przestrzenią topologiczną. Zbiór $\Omega \subseteq X$ jest **nigdziegęsty** jeśli nie jest gęsty w żadnym $\tau \in \mathcal{T}$.

Twierdzenie 2.51. (Baire) Zupełna przestrzeń metryczna \mathcal{M} nie może być sumą przeliczalnie wielu zbiorów nigdziegęstych.

Dowód. Dążąc do sprzeczności przyjmijmy, że $\mathcal{M} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ gdzie A_n jest zbiorem nigdziegęstym w \mathcal{M} . Niech $B_1 \subseteq \mathcal{M}$ będzie dowolną zamkniętą kulą o promieniu $1/2$. Wówczas ponieważ A_1 jest nigdzie gęsty, istnieje punkt $x_1 \in \overline{B_1} \setminus \overline{A_1}$. Postępując w sposób rekurencyjny, możemy wybrać dowolną kulę $B_{n+1} \subseteq B_n$ o promieniu mniejszym niż $(1/2)^{n+1}$. Zawsze istnieje $x_{n+1} \in \overline{B_{n+1}} \setminus \overline{A_{n+1}}$. Z zupełności \mathcal{M} oraz [Stw.2.48] wynika, iż wybrany ciąg ma granicę $x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} (\overline{B_i} \setminus \overline{A_i})$. Jest to sprzeczne z założeniem o zupełności \mathcal{M} . \square

2.8 Zbiory spójne

Definicja 2.52. Niech (X, \mathcal{T}) będzie przestrzenią topologiczną. Zbiór $S \subseteq X$ jest **spójny** jeśli nie można rozłożyć go na sumę dwóch rozłącznych, niepustych i domkniętych podzbiorów X .

Rozdział 3

Liczby rzeczywiste

3.1 Aksjomatyka liczb rzeczywistych

Aksjomat 3.1. *Liczby rzeczywiste są ciałem.*

Aksjomat 3.2. *Przestrzeń metryczna liczb rzeczywistych (\mathbb{R}, ρ) , gdzie $\rho(x, y) = |x - y|$ jest zupełna.*

Aksjomat 3.3. *Porządek (\mathbb{R}, \leq) liczb rzeczywistych jest liniowy.*

Lemat 3.4. *Przedział $\mathbb{R} \supseteq [a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$ jest domknięty.*

Dowód. Nie wchodząc w szczegóły: nietrudno pokazać iż:

$$\mathbb{R} \setminus [a, b] =]-\infty, a[\cup]b, \infty[$$

jest zbiorem otwartym. □

Lemat 3.5. *Przedział domknięty $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ jest zbiorem zwartym.*

Dowód. Niech $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq [a, b]$ będzie ciągiem. Oznaczmy $[a, b] = [a_0, b_0]$ i wybierzmy ciąg odcinków $\{[a_n, b_n]\}$ taki, że:

1. $[a_n, b_n] \subseteq [a_{n-1}, b_{n-1}]$.
2. $|b_n - a_n| = (1/2)^n \cdot |b - a|$.
3. $[a_n, b_n]$ zawiera nieskończenie wiele wyrazów wybranego ciągu.

Istnieje podciąg $\{x_{n_m}\}_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ taki, że $x_{n_m} \in [a_m, b_m]$. Jest on ciągiem Cauchy'ego. Zgodnie z [Aks.3.2] ma granicę $x \in \mathbb{R}$. Ponieważ z [Lem.3.4] przedział jest domknięty, $x \in [a, b]$. □

Lemat 3.6. *Kostka $[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$ jest zbiorem zwartym.*

Dowód. Wybierzmy ciąg $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zawarty w kostce. Niech dla dowolnego $i \in \{1, \dots, n\}$ funkcja:

$$\pi_i : [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \ni (x_1, \dots, x_n) \rightarrow x_i \in [a_i, b_i]$$

będzie rzutem. Zgodnie z [Lem.3.4] z ciągu można wybrać podciąg y_n taki, że $\pi_1(y_n)$ jest zbieżny. Z kolei dla podciagu y_n można wybrać kolejny z_n dla którego $\pi_2(z_n)$ jest zbieżny... Po wykonaniu tej operacji n razy dochodzimy do podciagu zbieżnego w kostce. \square

Lemat 3.7. Niech X będzie podzbiorem przestrzeni euklidesowej (\mathbb{R}^n, d_e) . Następujące warunki są równoważne:

1. X jest zwarty.
2. X jest domknięty i ograniczony.

Dowód. (1) \implies (2): Z [Tw.2.40.3] wynika, że zbiór musi być domknięty. Żeby wykazać ograniczoność wystarczy zauważyć, że rodzina kul $\{\mathcal{B}(0, n) : n \in \mathbb{N}\}$ pokrywa X , więc można z niej wybrać podpokrycie skończone.

(2) \implies (1): Każdy zbiór ograniczony A leży w pewnej domkniętej kostce $[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ która jest zbiorem zwartym. Na mocy [Lem.3.4] z domkniętości A wynika zwartość. \square

Twierdzenie 3.8. (Bolzano-Weierstraß) Niech $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą, określoną na zwartym podzbiorku przestrzeni metrycznej $X \subseteq \mathcal{M}$. Istnieją punkty $a, b \in X$, że:

$$f(a) = \sup_X f \qquad f(b) = \inf_X f$$

Dowód. Zastosujmy [Tw.2.41] i zastanówmy się jak wygląda zwarty podzbiór \mathbb{R} . Zgodnie z [Lem.3.7] jest on domknięty i ograniczony co jest równoznaczne tezie. \square

3.2 Ciągi rzeczywiste

Twierdzenie 3.9. Niech $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ i $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ będą ciągami w \mathbb{R} oraz $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ oraz $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$, wówczas:

1. $\{a_n + b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + b$.
2. $\{a_n \cdot b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} ab$.
3. $\{a_n / b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a/b$ jeśli tylko $b_n, b \neq 0$.

Dowód. Trywialny. \square

3.3 Szeregi rzeczywiste

Rozdział 4

Algebra liniowa

4.1 Podstawowe definicje

Definicja 4.1. *Przestrzenią wektorową nad ciałem \mathbb{K} nazywamy piątkę $(V, \mathbb{K}, +, \cdot, 0)$, gdzie:*

1. $(V, +, 0)$ jest grupą abelową.
2. $\cdot : \mathbb{K} \times V \ni (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v \in V$ zwana **iloczynem skalarnym** jest funkcją spełniającą warunki rozdzielności:

$$(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v, \quad \lambda \cdot (u + v) = \lambda u + \lambda v,$$

łącznie:

$$(\lambda \cdot \mathbb{K} \mu) v = \lambda \cdot (\mu \cdot v),$$

gdzie „ $\cdot_{\mathbb{K}}$ ” oznacza działanie mnożenia w ciele. Z elementem neutralnym $1 \in \mathbb{K}$:

$$1 \cdot v = v.$$

Definicja 4.2. Niech V, W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem \mathbb{K} . **Operator liniowy** to homomorfizm przestrzeni liniowych, czyli funkcja $A : V \rightarrow W$ taka, że:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}; x, y \in V : A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay.$$

Przestrzeń operatorów liniowych oznaczamy $\text{Hom}(V, W)$. Jeśli $V = W$ to homomorfizm nazywamy **endomorfizmem** i oznaczamy $\text{End}(V)$.

Definicja 4.3. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad \mathbb{K} . Podzbiór $E \subseteq V$ jest **liniowo niezależny** jeśli nie ma skończonych, niezerowych ciągów $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{K}$ oraz $\{x_i\}_{i=1}^n \subseteq E$ takich, że $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$.

Definicja 4.4. Niech V będzie przestrzenią wektorową. **Bazą** przestrzeni nazywamy dowolny maksymalny liniowo niezależny podzbiór V . (Nieawarty w żadnym innym)

4.2 Przestrzenie o skończonym wymiarze

Definicja 4.5. Przestrzeń wektorowa ma *wymiar* $n \in \mathbb{N}$ jeśli istnieje jej baza posiadająca n elementów.

Twierdzenie 4.6. Niech zbiór $\{e_i\}_{i=1}^n$ stanowi bazę n -wymiarowej przestrzeni wektorowej V nad ciałem \mathbb{K} . Wówczas:

1. Każdy wektor $v \in V$ można przedstawić w postaci sumy $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$, gdzie $\alpha_i \in \mathbb{K}$.
2. Współczynniki $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ są wyznaczone jednoznacznie.

Dowód. (1): Przyjmijmy, że $v \notin \text{span}\{e_i\}_{i=1}^n$, gdyż wówczas teza jest oczywista. Rozważmy zbiór $\{e_i\}_{i=1}^n \cup \{v\}$. Nie może on być liniowo niezależny wprost z [Def.4.4], zatem istnieje zestaw skalarów, że:

$$\alpha_0 v + \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n,$$

gdzie $\alpha_0 \neq 0$. Wtedy:

$$v = -\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_0} e_1 + \dots + \frac{\alpha_n}{\alpha_0} e_n\right)$$

(2): Przypuśćmy, że:

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = v = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n.$$

Równanie odejmujemy stronami:

$$(\alpha_1 - \beta_1)e_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)e_n = 0.$$

Zgodnie z [Def.4.3] wszystkie współczynniki w tej równości muszą być zerami. \square

Twierdzenie 4.7. Niech V będzie przestrzenią wektorową o wymiarze n . Wówczas każda baza tej przestrzeni ma n elementów.

Dowód. Przypuśćmy, że istnieją dwie różne bazy $E = \{e_1, \dots, e_k\}$ oraz $F = \{f_1, \dots, f_m\}$, gdzie $k < m$ (co zakładamy bez straty ogólności). Rozważmy liniowo niezależny zbiór $B = \{e_1, \dots, e_s, f_p, \dots, f_q\}$. Wykażemy, że możemy w nim zastąpić jeden z wektorów f_i przez e_{s+1} w ten sposób, by pozostał liniowo niezależny. Istotnie mamy dwie możliwości:

(1): $B \cup \{e_{k+1}\}$ jest liniowo niezależny. Wówczas usuwamy z niego dowolny f_i .

(2): $B \cup \{e_{k+1}\}$ jest liniowo zależny i możemy zapisać:

$$e_{k+1} = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_n + \beta_1 f_p + \beta_{q-p+1} f_q, \quad (4.1)$$

gdzie przynajmniej jedno $\beta_i \neq 0$. Gdyby było inaczej to E byłby układem liniowo zależnym. Zastępujemy f_i wektorem e_{k+1} , a otrzymany zbiór B'

jest wciąż liniowo niezależny. (Gdyby było inaczej, to moglibyśmy wybrać $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{k+1} e_{k+1} + \alpha_{k+2} f_s + \dots + \alpha_m f_d = 0$, pod e_{k+1} podstawić (4.1) i wykazać liniową zależność B).

To znaczy, że możemy stworzyć liniowo niezależny zbiór:

$$\{e_1, \dots, e_k, f_k, \dots, f_l\},$$

łącząc wektory z obu baz, tak że całe E jest w nim zawarte. Jest to sprzeczne z definicją bazy jako maksymalnego zbioru liniowo niezależnego. \square

Uwaga 4.8. Każdy operator liniowy na przestrzeni o skończonym wymiarze jest jednoznacznie wyznaczony przez obrazy elementów bazy tej przestrzeni.

Uwaga 4.9. Przecięcie oraz suma dwóch przestrzeni wektorowych jest przestrzenią wektorową.

Twierdzenie 4.10. Niech W będzie przestrzenią wektorową o skończonym wymiarze, natomiast U, V jej podprzestrzeniami takimi, że $W \subseteq \{v + u | v \in V, u \in U\} = V + U$. Wówczas $\dim W = \dim U + \dim V + \dim U \cap V$.

Dowód. Wybierzmy bazę $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ przestrzeni W . Podzielmy ją na dwa podzbiory:

$$E_1 = \{e \in E | e \in V\} \quad E_2 = \{e \in E | e \in U\}$$

Wówczas, gdyby istniał wektor $e_j : e_j \in E \wedge e_j \notin (E_1 \cup E_2)$, to $e_j \notin V + U$. Zatem $E \subseteq E_1 \cup E_2$.

Jeśli $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$, to $E_1 \cap E_2$ jest bazą $U \cap V$. Istotnie, jeśli $w \in U \cap V$ to musi mieć swoje przedstawienie w bazie E , oraz musi składać się z elementów $E_1 \cap E_2$. Reszta dowodu składa się z prostych przekształceń arytmetycznych. \square

Definicja 4.11. Izomorfizm liniowy $T : V \rightarrow W$ nazwiemy **kanonicznym** jeśli możemy zdefiniować go niezależnie od wyboru baz przestrzeni V i W .

Definicja 4.12. Niech V, W będą przestrzeniami wektorowymi. Wówczas taki operator liniowy $P : V \rightarrow W$, że $\forall v \in V : P(v) = P(P(v))$ nazywamy **rzutem**.

4.3 Suma prosta przestrzeni.

Definicja 4.13. Niech W, V, U będą przestrzeniami wektorowymi. Mówimy, że W jest sumą prostą V i U co zapisujemy $W = V \oplus U$, jeśli każde $w \in W$ można jednoznacznie zapisać w postaci $w = v + u$, gdzie $v \in V$ oraz $u \in U$.

Twierdzenie 4.14. Zbiór $W = \{V + U | v \in V, u \in U\}$ jest sumą prostą przestrzeni V i U wtedy i tylko wtedy, gdy $V \cap U = \{0\}$.

Dowód. (\implies): Jeśli W jest sumą prostą, ale $\exists v \in V \cap U : v \neq 0$, to rozkład $0 = 0 + 0 = v + (-v)$ nie jest jednoznaczny.

(\impliedby): Jeśli $w = v_1 + u_1 = v_2 + u_2$, to $v_1 - v_2 = u_2 - u_1 \in V \cap U = \{0\}$. \square

Wniosek 4.15. Zbiór $W = \{V + U | v \in V, u \in U\}$ jest sumą prostą przestrzeni V i U wtedy i tylko wtedy, gdy $\dim W = \dim V + \dim U$.

Dowód. Wynika z [Stw.4.10]. □

4.4 Przestrzeń dualna.

Definicja 4.16. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad \mathbb{K} . Kowektorem nazywamy dowolny operator liniowy $f : V \rightarrow \mathbb{K}$.

Twierdzenie 4.17. Niech V będzie przestrzenią wektorową. Zbiór funkcjonałów na V ma strukturę przestrzeni wektorowej.

Dowód. □

WYMAGA SKOŃCZENIA

4.5 Przestrzeń ilorazowa.

Twierdzenie 4.18. Niech V będzie przestrzenią wektorową, natomiast W jej podprzestrzenią. Wprowadźmy na V następującą relację:

$$\forall x, y \in V : x \mathcal{R} y \iff x - y \in W.$$

Wówczas jest to relacja równoważności. Ponadto jeśli na tym zbiorze wprowadzimy działania:

$$[x] + [y] = [x + y], \quad \alpha[x] = [\alpha x],$$

to zyska on strukturę przestrzeni wektorowej.

Dowód. (1): Pokażmy najpierw, że relacja jest relacją równoważności. Ponieważ W jest podprzestrzenią:

- $x - x = 0 \in W$
- $x - y \in W \wedge y - z \in W \implies (x - y) + (y - z) = x - z \in W$
- $x - y \in W \implies -(x - y) = y - x \in W$

(2): Sprawdźmy, że działania są jednoznacznie zdefiniowane, to znaczy wykażmy:

$$x, x' \in [x]; y, y' \in [y] \implies [x + y] = [x' + y'] \wedge [\alpha x] = [\alpha x'],$$

ale to proste, bo $(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y') \in W$ oraz $[\alpha x - \alpha x'] \in W$. □

Definicja 4.19. Przestrzeń wektorową zdefiniowaną w [Stw.4.18] oznaczamy V/W i nazywamy **przestrzenią ilorazową**.

Uwaga 4.20. Rzut $\pi : V \rightarrow V/\ker A$ jest operatorem liniowym.

Lemat 4.21. Niech V, W, Q będą przestrzeniami wektorowymi, a $A : V \rightarrow W$ oraz $S : V \rightarrow Q$ operatorami liniowymi. Ponadto niech $H : W \rightarrow Q$ będzie operatorem liniowym dla którego $H \circ A = S$.

Wówczas H istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy $\ker S \subseteq \ker A$. Ponadto jest wyznaczone jednoznacznie na $\text{im} S$.

Dowód. (\Leftarrow): Jeśli H istnieje, to $S(v) = 0 \implies H \circ A(v) = 0$.

(\Rightarrow): Teraz założymy, że $\ker S \subseteq \ker A$. Na podprzestrzeni $\text{im}(S)$ możemy ustalić $H(S(v)) = H(u) = A(v)$, gdzie $u = S(v)$. Natomiast na zbiorze $W \setminus \text{im}(S)$ ustalmy $H = 0$. Tak zdefiniowane H jest liniowe, gdyż:

$$\begin{aligned} H(S(v+u)) &= A(v+u) = A(v) + A(u) = H(S(v)) + H(S(u)), \\ H(S(\alpha v)) &= \alpha A(v) = \alpha H(S(v)). \end{aligned}$$

Operator H jest dobrze określony, ponieważ:

$$\begin{aligned} S(v_1) = S(v_2) &\implies v_1 - v_2 \in \ker S \implies \\ &\implies v_1 - v_2 \in \ker A \implies A(v_1) = A(v_2) \end{aligned}$$

□

Twierdzenie 4.22. Niech V, W będą przestrzeniami wektorowymi nad \mathbb{K} . Ponadto niech $A : V \rightarrow W$ będzie operatorem liniowym. Wówczas istnieje jednoznacznie wyznaczony operator liniowy $\tilde{A} : V/\ker A \rightarrow W$ spełniający $\tilde{A} \circ \pi = A$, gdzie π jest rzutem na przestrzeń ilorazową.

Dowód. Skorzystajmy z [lem.4.21].

□

Rozdział 5

Przestrzenie unormowane

5.1 Przestrzenie z normą

Definicja 5.1. Niech \mathcal{V} będzie przestrzenią wektorową nad \mathbb{R} albo \mathbb{C} wówczas odwzorowanie $\|\bullet\| : \mathcal{V} \rightarrow [0, \infty]$ nazywamy **normą** jeśli spełnia warunki:

1. $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$
2. $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$
3. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

Definicja 5.2. Niech V będzie przestrzenią wektorową rzeczywistą albo zespoloną, natomiast $\|\bullet\|$ metryką. Wówczas parę $(\mathcal{V}, \|\bullet\|)$ nazywamy **przestrzenią unormowaną**.

Twierdzenie 5.3. Niech V będzie przestrzenią unormowaną. Wówczas odwzorowanie zdefiniowane wzorem $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ jest metryką.

Dowód.

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{y} \\ \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = |-1| \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \\ \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| + \|\mathbf{z} - \mathbf{y}\| = \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \rho(\mathbf{z}, \mathbf{y})\end{aligned}$$

□

Definicja 5.4. Dwie normy $d_1 = \|\bullet\|_1$ i $d_2 = \|\bullet\|_2$ na przestrzeni V są równoważne jeśli istnieją liczby $\alpha, b > 0$ dla których $d_1 < \alpha \cdot d_2$ oraz $d_2 < b \cdot d_1$.

Twierdzenie 5.5. Wszystkie normy na skończonej wymiarowej przestrzeni V są równoważne.

Dowód. Możemy wybrać skończoną bazę \mathcal{V} , równą:

$$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$$

Więc dowolny element $\mathbf{x} \in \mathcal{V}$ ma postać:

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$$

(1): Zaczniemy od zdefiniowania relacji dla dowolnych norm niech $\|\bullet\|_\alpha \sim \|\bullet\|_\beta$ oznacza, że są równoważne.

$$\begin{aligned} \|\bullet\|_\alpha \sim \|\bullet\|_\delta \wedge \|\bullet\|_\beta \sim \|\bullet\|_\delta &\implies A_1 \|\mathbf{x}\|_\delta \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq A_2 \|\mathbf{x}\|_\delta \\ B_1 \|\mathbf{x}\|_\delta \leq \|\mathbf{x}\|_\beta \leq B_2 \|\mathbf{x}\|_\delta &\implies \\ \implies \frac{B_1}{A_2} \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq \|\mathbf{x}\|_\beta \leq \frac{B_2}{A_1} \|\mathbf{x}\|_\alpha &\implies \|\bullet\|_\alpha \sim \|\bullet\|_\beta \end{aligned}$$

To znaczy relacja jest tranzytywna. Jej symetria i zwrotność wynikają wprost z [Def.5.4]. Jest to relacja równoważności.

(2): Biorąc konkretną normę $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \overline{1, n}} |x_i|$ oraz dowolną inną $\|\mathbf{x}\|$ wykażemy, że $\|\bullet\| \sim \|\mathbf{x}\|_\infty$:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\| &= \left\| \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i \mathbf{e}_i\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \|\mathbf{e}_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \|\mathbf{e}_i\| \right) \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty = C \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty \\ \|\mathbf{x}\|_\infty &= \max_{i \in \overline{1, n}} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \frac{\|\mathbf{e}_i\|}{\|\mathbf{e}_i\|} \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{\|\mathbf{e}_i\|} \right) \cdot \|\mathbf{x}\| \leq D \cdot \|\mathbf{x}\| \end{aligned}$$

(3): Skoro dowolna norma jest równoważna z $\|\bullet\|_\infty$ to na podstawie (1) wszystkie normy są równoważne. \square

Twierdzenie 5.6. Jeśli dwie normy są równoważne to generują identyczne topologie.

Dowód. Na mocy [Def.5.4] każda kula w jednej normie zawiera kulę w drugiej normie i odwrotnie. \square

Wniosek 5.7. Jeśli jakiś ciąg w skończenie-wymiarowej przestrzeni z normą zbiega do jakiegoś \mathbf{x} to ma tę własność w każdej normie.

Definicja 5.8. Przestrzeń wektorowa zupełna, unormowana to **przestrzeń Banacha**.

5.2 Norma homomorfizmu

Twierdzenie 5.9. Niech $A : V \rightarrow W$ będzie odwzorowaniem liniowym między przestrzeniami wektorowymi unormowanymi. Następujące warunki są równoważne:

1. A jest ciągłe w pewnym $\mathbf{a} \in V$.
2. A jest ciągłe na V .
3. Istnieje $C > 0$, że $\|A\mathbf{x}\| \leq C\|\mathbf{x}\|$

Dowód. (2) \implies (3): W szczególności A jest ciągła w 0 . Dążąc do zaprzeczenia przypuśćmy, że C nie istnieje, wówczas:

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in V : \|Ax_n\| &> n\|x_n\| \implies \\ \implies n\|x_n\| &< \|Ax_n\| = \|x_n\| \cdot \|A \frac{x_n}{\|x_n\|}\| \implies 1 < \|A \frac{x_n}{\|x_n\|}\| \implies \\ \implies c_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|} &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \wedge Ac_n \not\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Co przeczy ciągłości.

(3) \implies (1): A musi być ciągła w 0 z trywialnych powodów.

(1) \implies (2): Wybierzmy dowolny $b \in V$ oraz ciąg taki, że $\|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, wtedy:

$$A(b + x_n) = A(b - a) + A(a + x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A(b - a) + A(a) = A(b)$$

□

Definicja 5.10. Odwzorowanie liniowe ciągłe $A : V \rightarrow W$ między dwoma przestrzeniami unormowanymi nazywamy **homomorfizmem**.

Definicja 5.11. Homomorfizm który jest odwracalny nazywa się **izomorfizmem**.

Definicja 5.12. Standardową **normą operatora** liniowego w nazywamy:

$$\|A\| = \inf\{C > 0 : \forall x \|Ax\| \leq C\|x\|\}$$

Definicja 5.13. Operator między przestrzeniami topologicznymi nazywamy **otwartym** jeśli obrazem każdego zbioru otwartego jest zbiór otwarty.

Lemat 5.14. Niech przestrzenie X, Y będą unormowane, a $T : X \rightarrow Y$ będzie operatorem liniowym. Następujące warunki są równoważne:

1. Operator T jest otwarty.
2. Obraz $B(0_X, 1)$ zawiera pewną kulę $B(0_Y, r)$.

Dowód. (1) \implies (2): Obraz $B(0_X, 1)$ jest zbiorem otwartym oraz zawiera 0_Y .

(2) \implies (1): Wybierzmy dowolny zbiór otwarty \mathcal{O} w X .

$$\forall x \in \mathcal{O} \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) = x + \varepsilon \cdot B(0_X, 1) \subseteq \mathcal{O}$$

zatem:

$$T(B(x, \varepsilon)) = T(x) + \varepsilon \cdot T(B(0_X, 1)) \supseteq T(x) + \varepsilon \cdot B(0_Y, r)$$

□

Lemat 5.15. Niech $T : X \rightarrow Y$ będzie ograniczonym operatorem liniowym z przestrzeni Banacha w przestrzeń unormowaną. Jeśli domknięcie \overline{C} zbioru $C = T(B(0_X, 1))$ zawiera pewną kulę $B(0_Y, r)$ to operator T jest otwarty.

Dowód. Zgodnie z [Lem.5.14] wystarczy pokazać, że C zawiera kulę $\mathcal{B}(\mathbf{0}_Y, \frac{r}{3})$. Istnieje $\mathbf{y} \in \overline{C}$, że $\|\mathbf{y}\| \leq \frac{r}{3}$ oraz $\mathbf{y}_1 \in C$ dla którego $\|3\mathbf{y} - \mathbf{y}_1\| \leq \frac{r}{3}$. Podobnie ponieważ $3\mathbf{y} - \mathbf{y}_1 \in \overline{C}$ możemy wybrać $\mathbf{y}_2 \in C$, że:

$$\|3^2\mathbf{y} - 3\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \leq \frac{r}{3}$$

I tak dalej cały ciąg $\{\mathbf{y}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, gdzie:

$$\|3^n\mathbf{y} - 3^{n-1}\mathbf{y}_1 - \dots - 3^0\mathbf{y}_n\| \leq \frac{r}{3}$$

Tak więc $\|\mathbf{y} - \sum_{i=1}^n \mathbf{y}_i\| \leq \frac{r}{3^{n+1}}$. Istnieje ciąg $\{\mathbf{x}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ taki, że $T\mathbf{x}_n = \mathbf{y}_n$ oraz $\sum_{i=1}^n \|3^{-i}\mathbf{x}_i\| \leq \frac{1}{2}$, zatem szereg zbiega do $\mathbf{x} \in \mathcal{B}(\mathbf{0}_X, 1)$. Ponadto:

$$T\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{\infty} 3^{-i}T\mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^{\infty} 3^{-i}\mathbf{y}_i = \mathbf{y} \in C$$

□

Lemat 5.16. Niech $T : X \rightarrow Y$ będzie epimorfizmem z przestrzeni unormowanej w przestrzeń Banacha. Istnieją liczby $r, s > 0$ oraz $\mathbf{y}_0 \in Y$, że domknięcie \overline{C} zbioru $C = \{T\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathcal{B}(\mathbf{0}_X, s)\}$ zawiera kulę $\mathcal{B}(\mathbf{y}_0, r)$.

Dowód. Weźmy ciąg zbiorów:

$$C_n = \{T\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathcal{B}(\mathbf{0}_X, n)\}$$

Ma mocy twierdzenia Baire'a [Tw.2.51] któryś ze zbiorów C_n nie jest nigdzie-gęsty. □

Twierdzenie 5.17. (O operatorze otwartym) Ograniczony epimorfizm między przestrzeniami Banacha $T : X \rightarrow Y$ jest otwarty.

Dowód. Wybierzmy liczby s, r oraz $\mathbf{y}_0 \in Y$ jak w treści [Lem.5.16]. Z liniowości T wynika, że $\mathcal{B}(\mathbf{y}_0, s^{-1}r) \subseteq \overline{\{T\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathcal{B}(\mathbf{0}_X, 1)\}}$. Dla dowolnego $\mathbf{y} \in \mathcal{B}(\mathbf{0}_Y, s^{-1}r)$:

$$\mathbf{y} = \frac{1}{2} \cdot [(\mathbf{y}_0 + \mathbf{y}) - (\mathbf{y}_0 - \mathbf{y})] = \frac{1}{2} \cdot [T(\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}) - T(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})] \in \overline{\{T\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathcal{B}(\mathbf{0}_X, 1)\}}$$

Co pozwala nam z [Lem.5.15] wywnioskować, że T jest otwarty. □

Twierdzenie 5.18. (Banacha o operatorze odwrotnym) Każdy operator liniowy $A : V \rightarrow W$ między przestrzeniami Banacha, będący bijekcją ma ciągłą odwrotność A^{-1} .

Dowód. Przeciwobraz zbioru otwartego $\mathcal{U} \subseteq X$ pod działaniem T^{-1} jest równy $T\mathcal{U}$ zatem z [Tw.5.17] jest otwarty. □

Twierdzenie 5.19. *Zbiór epimorfizmów między przestrzeniami Banacha V i W jest otwarty w $\text{Hom}(V, W)$.*

Dowód. Niech $y \in W$, chcemy pokazać, że dla dowolnej surjekcji $T \in \text{Hom}(V, W)$ istnieje kula, że dla $S \in \mathcal{B}(T, \varepsilon)$ mamy $x \in V : Sx = y$. Naturalnie jest taki x_0 , że $Tx_0 = y$, oznaczmy $y_0 = Sx_0$.

Niech $y_1 = (T - S)x_0$, $\|y_1\| \leq \varepsilon\|x_0\|$, oraz $Tx_1 = y_1$

$y_2 = (T - S)x_1$, $\|y_2\| \leq \varepsilon\|x_1\| \leq \varepsilon^2\|T\|\|x_0\|$, oraz $Tx_2 = y_2$

Indukcyjnie definiujemy dwa ciągi $\{x_n\}$ i $\{y_n\}$, że $\|y_n\| \leq \varepsilon^n\|T\|^{n-1}\|x_0\|$

$\|x_n\| \leq \varepsilon\|T\|\|x_0\|$

$S[\sum_{i=0}^{\infty} x_i] = Tx_0 - y_1 + Tx_1 - y_2 \dots = Tx_0 - y_1 + y_1 - y_2 + y_2 - \dots = Tx_0 = y$ □

5.3 Norma iloczynu przestrzeni

Definicja 5.20. *Niech $\{(X_i, \|\bullet\|_i)\}_{i \in \overline{1, n}}$ będzie skończoną rodziną przestrzeni unormowanych. Wówczas każdą normę postaci:*

$$\|(x_1, \dots, x_n)\| = \|(\|x_1\|_1, \dots, \|x_n\|_n)\|_{\mathbb{R}^n}$$

Gdzie $\|\bullet\|_{\mathbb{R}^n}$ jest dowolną normą na \mathbb{R}^n , nazywamy **normą iloczynu przestrzeni**.

Lemat 5.21. *Powyższa konstrukcja spełnia definicję normy.*

Dowód. Z tego, że $\|\bullet\|_{\mathbb{R}^n}$ jest normą wynika niezdegenerowanie:

$$\|(x_1, \dots, x_n)\| = 0 \iff \|(\|x_1\|_1, \dots, \|x_n\|_n)\|_{\mathbb{R}^n} = 0 \iff \forall_{i \in \overline{1, n}} x_i = 0$$

Dodatnia jednorodność:

$$\begin{aligned} \|\alpha(x_1, \dots, x_n)\| &= \|(\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)\| = \|(\|\alpha x_1\|_1, \dots, \|\alpha x_n\|_n)\|_{\mathbb{R}^n} = \\ &= |\alpha| \cdot \|(\|x_1\|_1, \dots, \|x_n\|_n)\|_{\mathbb{R}^n} = |\alpha| \cdot \|(x_1, \dots, x_n)\| \end{aligned}$$

Nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|(x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m)\| &= \|(\|x_1 + y_1\|_1, \dots, \|x_m + y_m\|_m)\|_{\mathbb{R}^n} \leq \\ &\leq \|(\|x_1\|_1, \dots, \|x_m\|_m)\|_{\mathbb{R}^n} + \|(\|y_1\|_1, \dots, \|y_m\|_m)\|_{\mathbb{R}^n} \leq \\ &\leq \|(x_1, \dots, x_m)\| + \|(y_1, \dots, y_m)\| \end{aligned}$$

□

Definicja 5.22. *Iloczynem $\prod_{i=1}^n X_i$ skończonej rodziny przestrzeni unormowanych będziemy nazywać jej iloczyn kartezjański wraz z normą klasy zdefiniowanej w [Def.5.20].*

Twierdzenie 5.23. *Iloczyn $\prod_{i=1}^n X_i$ przestrzeni Banacha jest przestrzenią Banacha.*

Dowód. □

Rozdział 6

Różniczka funkcji

6.1 Małe wyższego rzędu

Lemat 6.1. Niech V, W będą unormowane, weźmy funkcję $f : V \supseteq \text{dom}(f) \rightarrow W$ zdefiniowaną na pewnym otoczeniu 0_V . Przez $o(V, W)$ oznaczmy rodzinę takich funkcji, że:

$$\frac{f(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} 0$$

Na rodzinie $o(V, W)$ wprowadźmy następującą relację równoważności:

$$u \sim g \iff \exists u_0 \in \mathcal{T} \forall x \in u_0 : u(x) = g(x)$$

Zbiór klas tej równoważności jest przestrzenią wektorową którą tradycyjnie oznaczamy $o(\mathbf{h})$. Funkcję $h \in o(\mathbf{h})$ nazywamy **małą wyższego rzędu** niż f .

Dowód. (1): Pokażmy, że liniowa kombinacja $\alpha u + \beta g \in o(\mathbf{h})$:

$$\frac{\alpha u + \beta g}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{\alpha u}{\|\mathbf{h}\|} + \frac{\beta g}{\|\mathbf{h}\|} \xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

(2): Zerem będzie funkcja zerująca się na dowolnym otoczeniu 0_V

(3): Funkcją odwrotną do h będzie funkcja odwrotna na pewnym otoczeniu 0_V . \square

6.2 Definicja i algebraiczne własności różniczki

Definicja 6.2. Niech V i W będą przestrzeniami metrycznymi. Funkcja $f : V \supseteq A \rightarrow W$ zdefiniowana na pewnym otoczeniu $\mathbf{x} \in A$ jest w tym punkcie **różniczkowalna** jeśli istnieje odwzorowanie $L \in \text{Hom}(V, W)$ takie, że:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - L\mathbf{h} \in o(\mathbf{h})$$

Takie L oznaczamy przez $Df(\mathbf{x})$ i nazywamy **różniczką** f w punkcie \mathbf{x} . Funkcja jest różniczkowalna jeśli posiada $Df(\mathbf{x})$ w każdym punkcie dziedziny.

Uwaga 6.3. Różniczka jest najlepszym afinicznym przybliżeniem funkcji w danym punkcie.

Twierdzenie 6.4. Powyższa definicja $Df(\mathbf{x})$ określa różniczkę jednoznacznie.

Dowód. Chcemy pokazać, że jeśli różniczka w punkcie istnieje to tylko jedno przekształcenie liniowe spełnia jej definicję. Przeprowadźmy dowód przez zaprzeczenie. Przypuśćmy, że istnieją dwa różne operatory liniowe L_1 i L_2 takie, że:

$$F_1 = f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - L_1 \mathbf{h} \in o(\mathbf{h})$$

$$F_2 = f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - L_2 \mathbf{h} \in o(\mathbf{h})$$

Jak wynika z Lem.6.1

$$F_1 - F_2 = (L_2 - L_1)\mathbf{h} \in o(\mathbf{h})$$

Co można zapisać w postaci granicy:

$$(L_2 - L_1) \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \mathbf{0}$$

Czyli $L_2 = L_1$ □

Twierdzenie 6.5. Funkcja różniczkowalna w punkcie \mathbf{x} jest w nim również ciągła.

Dowód. Wprost z definicji ciągłości:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) = L\mathbf{h} + (f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - L\mathbf{h}) \xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \mathbf{0}$$

Przypominamy, że L z definicji jest ciągła jako element $\text{Hom}(V, W)$. □

Twierdzenie 6.6. Niech V, W będą przestrzeniami unormowanymi, natomiast funkcje $f, g : V \supseteq \Omega \rightarrow W$ różniczkowalne w punkcie $\mathbf{x} \in \Omega$. Wówczas funkcja $\alpha f + \beta g$ jest różniczkowalna w tym punkcie, oraz:

$$D(\alpha f + \beta g)(\mathbf{x}) = \alpha Df(\mathbf{x}) + \beta Dg(\mathbf{x})$$

Dowód. Dowód przeprowadzimy po prostu wstawiając prawą część powyższej równości do definicji różniczki funkcji $\alpha f + \beta g$ w punkcie \mathbf{x} i przekonamy się, że warunki Def.6.2 są spełnione.

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - (\alpha f + \beta g)(\mathbf{x}) - \alpha Df(\mathbf{x}) + \beta Dg(\mathbf{x}) &= \\ = (\alpha f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - \alpha f(\mathbf{x}) - \alpha Df(\mathbf{x})) + (\beta g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - \beta g(\mathbf{x}) - \beta Dg(\mathbf{x})) \end{aligned}$$

□

Twierdzenie 6.7. Niech przestrzenie V, W, Z będą unormowane, a funkcja $f : V \supseteq \Omega_1 \rightarrow W$ będzie różniczkowalna w \mathbf{x} , natomiast funkcja $g : W \supseteq \Omega_2 \rightarrow Z$ w $f(\mathbf{x})$. Zakładamy, że oba Ω_1, Ω_2 są otwarte oraz $f(\mathbf{x}) \in \Omega_2$. Wówczas złożenie $g \circ f$ jest funkcją różniczkowalną w \mathbf{x} , a także:

$$D(g \circ f)(\mathbf{x}) = Dg(f(\mathbf{x})) \circ Df(\mathbf{x})$$

Dowód. Podobnie jak w poprzednim dowodzie podstawimy naszą postulowaną formę różniczki $g \circ f$ do Def.6.2 i sprawdzimy się, że jest to odpowiadająca forma.

$$\begin{aligned} F &= g \circ f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g \circ f(\mathbf{x}) - Dg(f(\mathbf{x})) \circ Df(\mathbf{x})\mathbf{h} = \\ &= g \circ (f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x})) - g \circ f(\mathbf{x}) - Dg(f(\mathbf{x})) \circ Df(\mathbf{x})\mathbf{h} = \\ &= g \circ (f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x})) - g \circ f(\mathbf{x}) - Dg(f(\mathbf{x})) \circ (f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x})) + \\ &\quad + Dg(f(\mathbf{x})) \circ (f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - Df(\mathbf{x})\mathbf{h}) \end{aligned}$$

Rozważmy oba składniki tej sumy i podzielmy przez $\|\mathbf{h}\|$:

$$\begin{aligned} \frac{g \circ (f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x})) - g \circ f(\mathbf{x}) - Dg(f(\mathbf{x})) \circ (f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}))}{\|\mathbf{h}\|} &\xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \mathbf{0} \\ \frac{Dg(f(\mathbf{x})) \circ (f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - Df(\mathbf{x})\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} &\xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} Dg(f(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Co pokazuje, że $F \in o(\mathbf{h})$. □

6.3 Twierdzenie o wartości średniej

Twierdzenie 6.8. (O wartości średniej) Niech V i W będą przestrzeniami unormowanymi, a funkcja $f : V \supseteq \Omega \rightarrow W$ będzie różniczkowalna na wypukłym zbiorze otwartym Ω . Wybierzmy dwa dowolne punkty $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \Omega$, wówczas:

$$\|f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a})\| \leq \sup_{t \in [0,1]} Df(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})) \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$$

Dowód. Zdefiniujmy funkcję:

$$\gamma(t) = f(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}))$$

Z otwartości Ω jest ona określona na przedziale $[-r, 1 + r]$. Skorzystajmy z faktu, że norma jest odwzorowaniem ciągłym oraz [Tw.3.8] i ustalimy:

$$C = \sup_{t \in [0,1]} Df(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}))$$

Korzystając z [Tw.6.7] możemy policzyć różniczkę:

$$\gamma'(t) = D\gamma(t) = Df(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}))\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$$

Z definicji różniczki:

$$\forall_{t \in [0,1]} \forall_{\epsilon > 0} \exists_{\delta_t > 0} : \|\mathbf{z}\| < \delta_t \implies$$

$$\implies \|f(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \mathbf{z}) - f(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})) - Df(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}))\mathbf{z}\| < \frac{\epsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} \|\mathbf{z}\|$$

Wybermy jakiegokolwiek $t_1, t_2 \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \|\gamma(t_2) - \gamma(t_1)\| &\leq \|\gamma(t_2) - \gamma(t_1) - \gamma'(t)(t_2 - t_1)\| + \|\gamma'(t)(t_2 - t_1)\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} \cdot |t_2 - t_1| + C \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \cdot |t_2 - t_1| = \\ &= \left(\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} + C \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \right) \cdot |t_2 - t_1| \end{aligned}$$

Gdzie biorąc odpowiednio mały przedział $|t_2 - t_1|$ można uczynić składnik $\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|}$ dowolnie małym.

Rodzina zbiorów otwartych:

$$\{]t - \delta_t, t + \delta_t[: t \in [0, 1]\}$$

Gdzie $\delta_t < r$, tworzy otwarte pokrycie zbioru zwartej $[0, 1]$ z którego możemy zgodnie z [Def.2.38] wybrać skończone pokrycie otwarte:

$$\{]t_i - \delta_{t_i}, t_i + \delta_{t_i}[, i \in \overline{1, n}\}$$

Zakładając bez straty ogólności, że $t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n$. Wybiermy punkty:

$$x_i \in]t_i - \delta_{t_i}, t_i + \delta_{t_i}[\cap]t_i, t_{i+1}[$$

W taki sposób by $x_0 = 0$ oraz $x_n = 1$. Nareszcie jesteśmy gotowi zakończyć dowód ostatnim ciągiem nierówności:

$$\begin{aligned} \|f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a})\| &= \|\gamma(1) - \gamma(0)\| \leq \sum_{i=1}^n \|\gamma(x_i) - \gamma(x_{i-1})\| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \|\gamma(x_i) - \gamma(t_i)\| + \sum_{i=1}^n \|\gamma(t_i) - \gamma(x_{i-1})\| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} + C \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \right) |x_i - t_i| + \\ &+ \sum_{i=1}^n \left(\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} + C \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \right) |t_i - x_{i-1}| \leq \\ &\leq \left(\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|} + C \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \right) \leq C \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| = \\ &= \sup_{t \in [0, 1]} Df(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})) \cdot \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \end{aligned}$$

□

6.4 Pochodne cząstkowe

Definicja 6.9. Rozważmy iloczyn przestrzeni unormowanych $X = \prod_{i=1}^m X_i$ oraz przestrzeń z normą Y . Dla funkcji $f : X \supseteq \Omega \rightarrow Y$ zdefiniowanej w $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) \in$

Ω° zdefiniujemy pomocniczą funkcję:

$$f_j^\alpha(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{j-1}, \mathbf{x}, \mathbf{a}_{j+1}, \dots, \mathbf{a}_n)$$

Jeśli różniczka $Df_j^\alpha(\mathbf{a}_j)$ istnieje to oznaczamy ją dla wygody przez $D_j f(\mathbf{a})$ i nazywamy *j-tą pochodną cząstkową* f .

Twierdzenie 6.10. Niech $X = \prod_{i=1}^n X_i$ będzie iloczynem przestrzeni z normą. Wówczas jeśli $f : X \supseteq \Omega \rightarrow Y$ jest funkcją różniczkowalną w $\mathbf{a} \in \Omega$ to istnieją wszystkie pochodne cząstkowe oraz dla dowolnego $\mathbf{h} = (\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n) \in X$ zachodzą równości:

$$D_j f(\mathbf{a})\mathbf{h}_j = Df(\mathbf{a}) \circ \theta_j \circ \pi_j \mathbf{h} \quad (6.1)$$

$$Df(\mathbf{a})\mathbf{h} = \sum_{j=1}^n D_j f(\mathbf{a})\mathbf{h}_j \quad (6.2)$$

Dowód. Najpierw zauważmy, że (6.1) \implies (6.2):

$$Df(\mathbf{a})\mathbf{h} = Df(\mathbf{a})\mathbf{1h} = Df(\mathbf{a}) \sum_{j=1}^n (\theta_j \circ \pi_j) \mathbf{h} = \sum_{j=1}^n D_j f(\mathbf{a})\mathbf{h}_j$$

A następnie udowodnimy równanie (6.1).

$$\begin{aligned} F &= f_j^\alpha(\mathbf{a}_j + \mathbf{h}_j) - f_j^\alpha(\mathbf{a}_j) - Df(\mathbf{a}) \circ \theta_j \circ \pi_j \mathbf{h} = \\ &= f_j^\alpha(\mathbf{a}_j + \mathbf{h}_j) - f_j^\alpha(\mathbf{a}_j) - Df(\mathbf{a})(\mathbf{0}, \dots, \mathbf{h}_j, \dots, \mathbf{0}) = \\ &= f(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j + \mathbf{h}_j, \dots, \mathbf{a}_n) - f(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) - Df(\mathbf{a})(\mathbf{0}, \dots, \mathbf{h}_j, \dots, \mathbf{0}) \end{aligned}$$

Co pokazuje prawdziwość równania (6.1) wprost z definicji różniczki. \square

Twierdzenie 6.11. Niech X będzie przestrzenią z normą, natomiast $Y = \prod_{i=1}^n Y_i$ iloczynem przestrzeni unormowanych. Wówczas dla rodziny funkcji $\{f_i : X \rightarrow Y_i : i \in \overline{1, n}\}$ funkcja $f = (f_1, \dots, f_n)$ jest różniczkowalna wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie funkcje f_i są różniczkowalne. Wówczas zachodzi:

$$Df(\mathbf{x}) = (Df_1(\mathbf{x}), \dots, Df_n(\mathbf{x}))$$

Dowód. Skorzystajmy z Tw.6.7 i zapiszmy naszą funkcję poprzez $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n (\theta_i \circ \pi_i) \circ f(\mathbf{x})$:

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{x}) &= D\left(\sum_{i=1}^n \theta_i \circ \pi_i \circ f\right)(\mathbf{x}) = D\left(\sum_{i=1}^n \theta_i \circ f_i\right)(\mathbf{x}) = \\ &= \sum_{i=1}^n D(\theta_i \circ f_i)(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n D(\theta_i)(f_i(\mathbf{x})) \circ Df_i(\mathbf{x}) = \\ &= \sum_{i=1}^n \theta_i \circ Df_i(\mathbf{x}) = (Df_1(\mathbf{x}), \dots, Df_n(\mathbf{x})) \end{aligned}$$

\square

Uwaga 6.12. Korzystam bez dowodu z faktu, że pochodna funkcji liniowej w każdym punkcie to ta funkcja. (dla θ_i)

Twierdzenie 6.13. Niech $X = \prod_{i=1}^n X_i$ będzie iloczynem przestrzeni z normą, a Y przestrzenią z normą. Weźmy funkcję $f : X \supseteq \Omega \rightarrow Y$ oraz ustalmy $\mathbf{a} \in \Omega$. Wówczas jeśli istnieją wszystkie pochodne cząstkowe f oraz każda z funkcji $\mathbf{x} \mapsto Df_i(\mathbf{x})$ jest ciągła w sensie metryki zbieżności jednostajnej to f jest różniczkowalna w \mathbf{a} .

Dowód. Przyjmijmy notację: $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$, $\mathbf{h} = (\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n)$.

Dowód jest nieco bardziej zawiły niż kilka poprzednich, jednak zaczniemy postępując podobnie jak zwykle. Dążymy do wykazania, że wskazana funkcja spełnia warunki stawiane różniczce:

$$\begin{aligned}
 & \|f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{i=1}^n D_i f(\mathbf{a}) \mathbf{h}_i\| \leq \\
 & \leq \sum_{i=1}^n \|f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{h}_i, \dots, \mathbf{a}_n) - f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) - D_i f(\mathbf{a}) \mathbf{h}_i\| = \\
 & = \sum_{i=1}^n \|f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{h}_i, \dots, \mathbf{a}_n) - f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) - \\
 & - D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \mathbf{h}_i + D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \mathbf{h}_i - D_i f(\mathbf{a}) \mathbf{h}_i\| \leq \\
 & \leq \sum_{i=1}^n \|f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{h}_i, \dots, \mathbf{a}_n) - f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) - \\
 & - D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \mathbf{h}_i\| + \\
 & + \sum_{i=1}^n \|D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \mathbf{h}_i - D_i f(\mathbf{a}) \mathbf{h}_i\|
 \end{aligned}$$

Powyższa suma składa się z dwóch składników po n elementów. Połowa z nich jest postaci:

$$\begin{aligned}
 F_i = & \|f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{h}_i, \dots, \mathbf{a}_n) - f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) - \\
 & - D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \mathbf{h}_i\|
 \end{aligned}$$

Ale przecież wprost z definicji różniczki $F_i \in o(\mathbf{h})$. Aby oszacować kolejne n składników użyjemy wprost Def.5.20. Ponieważ wszystkie metryki na \mathbb{R}^n są równoważne możemy badając zbieżność użyć konkretnej metryki:

$$\|\bullet\|_\infty = \max \{\|x_i\|_i : i \in \overline{1, n}\}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n \|D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \mathbf{h}_i - D_i f(\mathbf{a}) \mathbf{h}_i\| = \\
& = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{h}_i\|_i \|D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) \frac{\mathbf{h}_i}{\|\mathbf{h}_i\|_i} - D_i f(\mathbf{a}) \frac{\mathbf{h}_i}{\|\mathbf{h}_i\|_i}\| \leq \\
& \leq n \cdot \|\mathbf{h}\|_\infty \cdot \max_{i \in \overline{1, n}} \{\|D_i f(\mathbf{a}_1 + \mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1} + \mathbf{h}_{i-1}, \dots, \mathbf{a}_n) - D_i f(\mathbf{a})\|\} \in o(\mathbf{h})
\end{aligned}$$

□

Uwaga 6.14. Korzystam bez dowodu z równoważności metryk.

Uwaga 6.15. Dodać tu twierdzenie o pochodnej funkcjonału dwuliniowego.

6.5 Twierdzenie u funkcji uwikłanej

Uwaga 6.16. Ofc muszę dodać tw o punkcie stałym i definicję klasy C^1 i uwzględnić w poprzednim twierdzeniu lepszą terminologię. I o ograniczoności normy liniowego ciągłego.

Uwaga 6.17. Twierdzenie o odwracaniu operatora liniowego na jakimś otoczeniu.

Twierdzenie 6.18. (O funkcji uwikłanej) Niech X, Y, Z będą przestrzeniami Banacha. Dla otwartego podzbioru $\Omega \subseteq X \times Y$ i funkcji $f \in C^1(\Omega, Z)$ niech dla pewnego $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ zachodzi $f(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) = \mathbf{0}$ oraz $D_2 f(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) : Y \rightarrow Z$ będzie homeomorfizmem.

Wówczas istnieje takie otoczenie $\mathcal{N}_{\mathbf{x}_0} \subseteq X$ punktu \mathbf{x}_0 oraz jednoznacznie określona funkcja $g \in C^1(\mathcal{N}_{\mathbf{x}_0}, Z)$ taka, że:

$$g(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0 \qquad f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$$

A jej pochodna jest dana równością:

$$Dg(\mathbf{x}) = -(D_2 f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})))^{-1} \circ D_1 f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))$$

Dowód. (Istnienie): Dla wygody oznaczmy:

$$L = D_2 f(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \qquad h(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y} - L^{-1}[f(\mathbf{x}, \mathbf{y})]$$

Możemy wybrać liczbę $\delta > 0$ taką, że:

1. $\mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta) \subseteq \Omega$
2. Operator $D_2 f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ jest odwracalny na $\mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta)$.
3. $\forall_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta)} \|D_2 f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - D_2 f(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)\| \leq \frac{1}{2\|L^{-1}\|}$

Dla punktów takich, że $(\mathbf{x}, \mathbf{y}_i) \in \mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta)$ zachodzi:

$$\begin{aligned} \|h(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2) - h(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1)\| &= \|\mathbf{y}_2 - L^{-1}[f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2)] - \mathbf{y}_1 + L^{-1}[f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1)]\| = \\ &= \|L^{-1}[L[\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1] - (f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2) - f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1))]\| \leq \\ &\leq \|L^{-1}\| \cdot \|f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2) - f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) - D_2 f(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)[\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1]\| \leq \\ &\leq \|L^{-1}\| \cdot \sup_{t \in [0,1]} \|D_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1 + t(\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1)) - D_2 f(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)\| \|\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1\| \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1\| \end{aligned}$$

Dla dowolnego $\mathbf{x} \in \pi_1 \circ \mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta) = \mathcal{N}_{\mathbf{x}_0}$ funkcja $h(\mathbf{x}, \bullet) : \pi_2 \circ \mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta) \rightarrow \pi_2 \circ \mathcal{B}((\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0), \delta)$ ma zgodnie z twierdzeniem kontrakcji unikalny punkt stały, który oznaczmy $g(\mathbf{x})$. Zachodzi:

$$g(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}) - L^{-1}[f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))] \iff f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$$

(Ciągłość): Weźmy $\mathbf{z}_0 \in Z$, oznaczmy $g_0(\mathbf{x}) = \mathbf{z}_0$ i zdefiniujmy rekurencyjnie ciąg funkcji $g_n(\mathbf{x}) = h(\mathbf{x}, g_{n-1}(\mathbf{x}))$. Ciąg ten zbiega do g jednostajnie, więc na mocy [Tw.2.35] g jest ciągłe.

(Różniczkowalność): Skorzystamy z [Tw.6.10] i tw. o różniczce złożenia funkcji:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}, g(\mathbf{x} + \mathbf{h})) - f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) - Df_1(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))\mathbf{h} - Df_2(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))[g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})] \in o(\mathbf{h}, g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x}))$$

W pewnym otoczeniu w którym $f(\mathbf{x} + \mathbf{h}, g(\mathbf{x} + \mathbf{h})) = f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))$, mamy (można je wybrać z ciągłości g):

$$Df_1(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))\mathbf{h} + Df_2(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))[g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})] \in o(\mathbf{h}, g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x}))$$

Można przyłożyć po obu stronach L^{-1}

$$g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x}) - [-Df_2(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))]^{-1} \circ Df_1(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))\mathbf{h} \in o(\mathbf{h}, g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})) \quad (6.3)$$

Teraz pokażmy, że $o(\mathbf{h}, g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})) = o(\mathbf{h})$ Z równania (4.3):

$$\|g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})\| \leq \epsilon(\|g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})\| + \|\mathbf{h}\|) + \|[-Df_2(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))]^{-1} \circ Df_1(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))\mathbf{h}\|$$

Zatem istnieje stała $C > 0$:

$$\|g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})\| \leq A\|\mathbf{h}\|$$

zatem:

$$\frac{\|g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x}) - A\mathbf{h}\|}{\|g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{x})\| + \|\mathbf{h}\|} \xrightarrow{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} 0$$

□

Uwaga 6.19. Dopisać w kolejnym rozdziale że dla k -krotnie różniczkowalnej f , funkcja g też jest k -krotnie różniczkowalna.

Twierdzenie 6.20. (O funkcji odwrotnej) Niech V, W będą przestrzeniami Banacha, natomiast $f \in C^1(\Omega, W)$ funkcją określoną na otwartym podzbiorze $\Omega \subseteq V$ taką, że dla pewnego $\mathbf{x} \in \Omega$ różniczka $Df(\mathbf{x})$ jest odwracalna.

Wówczas istnieje otoczenie $\mathcal{N}_{\mathbf{x}}$ na którym funkcja f jest odwracalna, oraz:

$$Df^{-1}(f(\mathbf{x})) = (Df(\mathbf{x}))^{-1}.$$

Dowód. Jest to szczególny przypadek [Tw.6.18]. Ustalmy $g : W \times V \rightarrow W$ wzorem:

$$g(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \mathbf{y} - f(\mathbf{x}).$$

Wówczas $h(\mathbf{y})$ jest unikalnym rozwiązaniem równania $g(\mathbf{y}, h(\mathbf{y})) = 0$, a także:

$$Dh(f(\mathbf{x})) = -(D_2g(\mathbf{y}, \mathbf{x}))^{-1} \circ D_1g(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = -(D_2g(\mathbf{y}, \mathbf{x}))^{-1} = (Df(\mathbf{x}))^{-1},$$

na otoczeniu $\mathcal{N}_{\mathbf{x}}$. □

Rozdział 7

Algebra wieloliniowa

7.1 Iloczyn tensorowy przestrzeni.

Definicja 7.1. Rozważmy przestrzenie wektorowe V oraz W nad ciałem \mathbb{K} . Ponadto niech:

1. \mathcal{M} oznacza przestrzeń wektorową napisów postaci:

$$\left\{ \sum_{i,j}^k v_i \otimes w_j \mid v_i \in V, w_j \in W \right\}.$$

2. $\mathcal{M}_0 \subseteq \mathcal{M}$ oznacza podprzestrzeń wszystkich napisów, których składniki są sumami postaci:

- $\lambda(v \otimes w) - (\lambda v) \otimes w,$
- $\lambda(v \otimes w) - v \otimes (\lambda w),$
- $(v_1 + v_2) \otimes w - v_1 \otimes w - v_2 \otimes w,$
- $v \otimes (w_1 + w_2) - v \otimes w_1 - v \otimes w_2,$

gdzie $\lambda \in \mathbb{K}; v, v_1, v_2 \in V; w, w_1, w_2 \in W$.

Wówczas przestrzeń wektorową $\mathcal{M}/\mathcal{M}_0$ oznaczamy przez $V \otimes W$ i nazywamy **iloczynem tensorowym** przestrzeni.

Twierdzenie 7.2. Niech V, W, Q będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem \mathbb{K} . Odwzorowanie:

$$\pi : V \times W \ni (v, w) \mapsto v \otimes w \in V \otimes W,$$

jest dwuliniowe. Ponadto dla dowolnego odwzorowania dwuliniowego $f : V \times W \rightarrow Q$ istnieje dokładnie jedno $\bar{f} : V \otimes W \rightarrow Q$ takie, że $f = \bar{f} \circ \pi$.

Dowód. (1): Wykażmy najpierw, że π jest dwuliniowe:

$$\begin{aligned}
 (\alpha x + \beta y, w) &= (\alpha x + \beta y) \otimes w = \\
 &= (\alpha x + \beta y) \otimes w - \alpha x \otimes w - \beta y \otimes w + \alpha x \otimes w + \beta y \otimes w = \\
 &= \alpha x \otimes w + \beta y \otimes w, \\
 (v, \alpha x + \beta y) &= v \otimes (\alpha x + \beta y) = \\
 &= v \otimes (\alpha x + \beta y) - \alpha v \otimes x - \beta v \otimes y + \alpha v \otimes x + \beta v \otimes y = \\
 &= \alpha v \otimes x + \beta v \otimes y.
 \end{aligned}$$

(Korzystamy przy tym z własności przestrzeni ilorazowych).

(2): Teraz wykażemy istnienie i unikalność \bar{f} . Niech operator $g : V \times W \rightarrow Q$ będzie zadany wzorem:

$$g \left(\sum_{i,j=1}^k \alpha_{i,j} (v_i, w_j) \right) = \sum_{i,j=1}^k \alpha_{i,j} s(v_i, w_j)$$

Wprost z [Def.7.1] wynika, że $\mathcal{M}_0 \subseteq \ker g$ z powodu dwuliniowości s . Wówczas g generuje operator \bar{f} w sensie [Stw.4.22]. \square

7.2 Iloczyn tensorowy przestrzeni o skończonym wymiarze.

Lemat 7.3. Niech V, W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem \mathbb{K} , natomiast $\{v_1, \dots, v_n\}$ i $\{w_1, \dots, w_m\}$ bazami. Wówczas:

1. Każdy tensor $t \in V \otimes W$ może być przedstawiony w postaci sumy $t = \sum_{i,j=1}^{n,m} \alpha_{ij} v_i \otimes w_j$.
2. Tensor t może być zapisany również w postaci $\sum_{i=1}^k a_i \otimes b_i$, gdzie $a_i \in V$, $b_i \in W$ oraz $k = \min(n, m)$.

Dowód. (1): Wystarczy skorzystać z dwuliniowości π wykazanej w [Stw.7.2] i rozłożyć każdy z wektorów iloczynu w bazie.

(2): Bez utraty ogólności przyjmijmy $n \leq m$, wówczas $t = \sum_{i,j=1}^{n,m} \alpha_{ij} v_i \otimes w_j = \sum_{i=1}^n v_i \otimes b_i$, gdzie $b_i = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} w_j$. \square

Lemat 7.4. Niech V, W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem \mathbb{K} oraz $f^* \in V^*$. Wówczas funkcja f^* zdefiniowana jako:

$$f^* \left(\sum_i v_i \otimes w_i \right) = \sum_{i=1}^k f^*(v_i) w_i,$$

gdzie $v_i \in V$, $w_i \in W$, jest operatorem liniowym.

Dowód. Liniowość jest trywialna do udowodnienia. Musimy jedynie wykazać, że nasz operator jest dobrze zdefiniowany, to jest:

$$a \otimes b = c \otimes d \implies f^*(a \otimes b) = f^*(c \otimes d)$$

Niech $m_0 \in \mathcal{M}_0$ gdzie \mathcal{M}_0 jest zdefiniowany w [Def.7.1]. Wówczas $a \otimes b = c \otimes d \iff \exists m_0 a \otimes b = c \otimes d + m_0$, a wówczas $f^*(a \otimes b) = f^*(c \otimes d + m_0) = f^*(c \otimes d) + f^*(m_0) = f^*(c \otimes d)$. \square

Lemat 7.5. Niech $\{v_1, \dots, v_p\}$ oraz $\{w_1, \dots, w_q\}$ będą układami liniowo niezależnymi. Wówczas układ

$$\{v_i \otimes w_j | i \in \{1, \dots, p\}, j \in \{1, \dots, q\}\}$$

jest również liniowo niezależny.

Dowód. Rozważmy sumę:

$$\sum_{i,j=1}^{p,q} \alpha_{ij} v_i \otimes w_j = 0.$$

Dla dowolnego $f^* \in V^*$ stosujemy operator zdefiniowany w [Lem.7.4] do naszej liniowej kombinacji, otrzymując:

$$\begin{aligned} f^*\left(\sum_{i,j=1}^{p,q} \alpha_{ij} v_i \otimes w_j\right) &= \sum_{i,j=1}^{p,q} \alpha_{ij} f^*(v_i) w_j = 0 \iff \\ &\iff \forall_{i,j} \alpha_{ij} = 0. \end{aligned}$$

\square

Twierdzenie 7.6. Niech V, W będą przestrzeniami wektorowymi o skończonym wymiarze. Wówczas:

$$\dim V \otimes W = \dim V \cdot \dim W$$

Dowód. Niech $\{v_1, \dots, v_p\}$ oraz $\{w_1, \dots, w_q\}$ będą bazami odpowiednich przestrzeni. Na podstawie [Lem.7.3] układ:

$$\{v_i \otimes w_j | i \in \{1, \dots, p\}, j \in \{1, \dots, q\}\},$$

rozpina przestrzeń $V \otimes W$. Z [Lem.7.5] wynika, że jest liniowo niezależny. \square

7.3 Przestrzeń wyższego rzędu.

Twierdzenie 7.7. Iloczyn tensorowy jest łączny i przemienny, to znaczy:

1. $U \otimes (V \otimes W) \simeq (U \otimes V) \otimes W$
2. $V \otimes W \simeq W \otimes V$

Dowód. (1): Ustalmy odwzorowanie:

$$\sum u \otimes (v \otimes w) \mapsto \sum (u \otimes v) \otimes w. \quad (7.1)$$

Jest ono liniowe, gdyż:

$$\begin{aligned} \alpha \sum u \otimes (v \otimes w) &= \\ &= \sum \alpha u \otimes (v \otimes w) \mapsto \sum \alpha(u \otimes v) \otimes w = \\ &= \alpha \sum (u \otimes v) \otimes w. \end{aligned}$$

[*iniekcja*]: Łatwo zauważyć, iż tensory zerowe odpowiadają tensorom zerowym. Przypuśćmy, że:

$$\begin{aligned} \sum u \otimes (v \otimes w) &\mapsto \sum (u \otimes v) \otimes w, \\ \sum x \otimes (y \otimes z) &\mapsto \sum (u \otimes v) \otimes w, \end{aligned}$$

wówczas $\sum u \otimes (v \otimes w) - \sum x \otimes (y \otimes z) \mapsto (0 \otimes 0) \otimes 0$, zatem obie sumy są różnymi reprezentacjami tego samego tensora.

[*suriekcja*]: Każdy tensor w $(U \otimes V) \otimes W$ ma reprezentację $\sum (u \otimes v) \otimes w$ wprost z definicji odwzorowania (7.1).

(2): Definicja iloczynu tensorowego jest symetryczna. \square

7.4 Operatory wieloliniowe jako tensory.

Definicja 7.8. Niech V będzie przestrzenią wektorową. Tensory należące do przestrzeni:

$$V^* \otimes \dots \otimes V^* \otimes V \otimes \dots \otimes V,$$

nazywamy *tensorami rzędu* (p, q) .

Twierdzenie 7.9. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad \mathbb{K} . Istnieje kanoniczny izomorfizm między tensorami rzędu (p, q) , a odwzorowaniami $p + q$ liniowymi postaci $T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{K}$, dany wzorem:

$$\begin{aligned} f_1 \otimes \dots \otimes f_p \otimes v_1 \otimes \dots \otimes v_q &\mapsto T(u_1, \dots, u_p, g^1, \dots, g^q) = \\ &= f^1(u_1) \cdot \dots \cdot f^p(u_p) \cdot g^1(v_1) \cdot \dots \cdot g^q(v_q) \end{aligned}$$

Dowód. Wieloliniowość T nie wymaga dowodu. Należy sprawdzić czy dane odwzorowanie jest faktycznie izomorfizmem. Różnowartościowość jest prosta do wykazania z podstawowych własności przestrzeni dualnych.

(*suriekcja*): Niech B oznacza dowolne odwzorowanie $p + q$ liniowe. \square

7.5 Iloczyn zewnętrzny.

Rozdział 8

Iloczyn skalarny

Rozdział 9

Rozmaitości

Rozdział 10

Teoria miary

Rozdział 11

Całka Lebesgue'a

