

9. Логический вывод. Формальные понятия доказательства и правила вывода, пример. Разветвляющие и неразветвляющие правила. Существование конечного числа правил вывода и математического понятия доказательства, при помощи которых можно ответить на вопрос: “Верно ли, что $\Gamma \Rightarrow A$?”. Пример

Билеты 5, 19

Логический вывод — это рассуждение, в ходе которого осуществляется переход от исходного суждения (высказывания, формулы) с помощью логических правил к заключению — новому суждению (формуле). Доказательство – система утверждений, каждое из которых очевидно истинно или следует из уже доказанных утверждений.

Пример. Допустим мы доказали утверждение A , затем доказали, что из A следует утверждение B , тогда мы делаем вывод, что истинно утверждение B . Считая A и B предложениями логического языка, можно возвести такую ситуацию в ранг правила, по которому из истинности предложений (посылок) A и $A \rightarrow B$ можно в качестве заключения вывести истинность предложения B .

Правила вывода (сверху – посылка, снизу – заключение):

$$\begin{array}{c} \frac{A \& B}{A}, \quad \frac{A \vee B}{A|B}, \quad \frac{A \rightarrow B}{\neg A|B}, \quad \frac{\neg[A \& B]}{\neg A|\neg B}, \quad \frac{\neg[A \vee B]}{\neg A}, \quad \frac{\neg[A \rightarrow B]}{A}, \\ B \\ \frac{(\forall x|\alpha)A}{(\forall x|\alpha, b)A}, \quad \frac{(\exists x|\alpha)A}{A_x[b]}, \quad \frac{\neg(\forall x|\alpha)A}{(\exists x|\alpha)\neg A}, \quad \frac{\neg(\exists x|\alpha)A}{(\forall x|\alpha)\neg A}, \quad \frac{\neg B}{\neg A} \end{array}$$

Неразветвляющее правило: к каждому узлу приписывается одна вершина, т.е. утверждается истинность всех формул заключения.

Разветвляющее правило: к каждому узлу приписываем узлы, соответствующие разветвлению, т.е. утверждается истинность хотя бы одной формулы заключения.

Для ответа на вопрос «Верно ли, что $\Gamma \Rightarrow A$?» используются поисковые деревья. Решение методом от противного, пусть $\Gamma \not\models A$, тогда существует такая модель Γ , что она не является моделью A , т.е. $\exists I$, что $\Gamma_1^{(I)}, \dots, \Gamma_n^{(I)} = 1$, а $A^{(I)} = 0 \Rightarrow \neg[A]^{(I)} = 1$. Дерево вывода – является деревом доказательств, если каждая из его ветвей блокирована. Ветвь в дереве называется блокированной, если в ней одновременно получены формулы F и $\neg F$.

Пример: $\{\forall x [P(x) \rightarrow \neg M(x)], \exists y [S(y) \& M(y)]\} \Rightarrow \exists z [S(z) \& \neg P(z)]$.

