

Contents

1	Basisregels differentieren	2
2	Differentiaalquotient/analytisch differentieren	2
2.1	Notatie:	2
2.1.1	Aanpak:	2
3		2

1 Basisregels differentieren

- Met differentieren pak je de afgeleide van een functie, de helling. Hiermee kunnen veranderingen van de functie t.o.v de variabelen berekend worden

- De afgeleide van een functie die constant is, is altijd 0:

$$- f(x) = 27, f'(x) = 0$$

- Voor n -de graads vergelijkingen geldt de volgende regel:

$$- f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

- Dit geldt ook voor gebroken vormen:

$$- f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \Rightarrow f'(x) = -1x^{-2} = \frac{-1}{x^2}$$

- En voor wortels:

$$- \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

2 Differentiaalquotient/analytisch differentieren

2.1 Notatie:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

2.1.1 Aanpak:

- 1: Vul in
- 2: Bepaal differentiaalquotient $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
- 3: Bepaal differentiequotient $y'(x) \frac{dy}{dx}$

1. Voorbeeld:

2. TODO

3