

## מסדי נתונים - תרגיל בית 1.

מגישים: תומר זילברמן (326063047) ורון סנדרוביץי (215019803).







שאלה 2)

:N (.i

 $A(a,\underline{b},c,d,e)$  $B(\underline{e},f)$ 

:⊐

מבטאים רק את החץ העגול (בדיוק 1)

 $A(a,\underline{b},c,d,e)$  $B(\underline{e},f)$ 

## מבטאים רק את החץ הרגיל (לכל היותר אחד)

A(a,b,c,d)

 $B(\underline{e},f)$ 

 $R(\underline{e},b) / R(\underline{b},e)$ 

: ک

A(a, c, d)

B(<u>b</u>,e)

G(g)

 $F(\underline{f})$ 

 $R(\underline{g},\underline{f},\underline{b},c) / R(\underline{g},\underline{f},b,\underline{c})$ 

 $\underline{b}$ =0 אז נגדיר ש Gול-G, אז נגדיר ש B אם אין

:7

 $A(\underline{a},d)$ 

 $B(b,\underline{a})$ 

 $C(\underline{c}, e, \underline{b}, \underline{a})$ 

א: אי אפשר לדעת (לא ניתן לקבוע) (ii


 $|A| \leq |B| : \exists$ 

 $|B| \leq |A| : \lambda$ 

 $|B| \leq |A| : \mathsf{T}$ 

.3

:א



IncomeGroup(income group)

Region(<u>region</u>)

Country (country code, region, income\_group)

Year(<u>year</u>)

University(<u>iau\_id1</u>,phd\_granting,divisions,specialized,eng\_name,orig\_name,private\_01, latitude,longitude)

GotIn(<u>iau id1</u>,student5\_est,<u>year</u>) Founded(<u>iau id1</u>,year) Closed(<u>iau id1</u>,year)