

# Sobre el operador maximal de Hardy-Littlewood

Andrés David Cadena Simons    Oscar Riaño

Semillero de Análisis Armónico y Ecuaciones Diferenciales Parciales, Departamento de Matemáticas,  
Universidad Nacional de Colombia



## Conceptos y definiciones

### Función de distribución

Sea  $(X, \mu)$  un espacio de medida y sea  $f : X \rightarrow \mathbb{C}$  una función medible. Se llama función de distribución de  $f$  asociada a  $\mu$  a la función:

$$\begin{aligned} a_f : (0, \infty) &\rightarrow [0, \infty] \\ \lambda &\rightarrow \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}) \end{aligned}$$

### Desigualdades débiles y fuertes

Sean  $(X, \mu)$  y  $(Y, \nu)$  dos espacios de medida y sea  $T$  un operador de  $\mathcal{L}^p(X, \mu)$ , en el espacio de funciones medibles de  $Y$  en  $\mathbb{C}$ .

$$T : \mathcal{L}^p(X, \mu) \rightarrow \mathcal{M}(Y, \mathbb{C})$$

i. Se dice que  $T$  es  $(p, q)$ -débil (con  $q < \infty$ ) si para todo  $\lambda > 0$  existe  $C > 0$  tal que:

$$\nu(\{y \in Y : |(Tf)(y)| > \lambda\}) \leq \left( \frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q.$$

ii. Se dice que  $T$  es  $(p, \infty)$ -débil si está acotado de  $\mathcal{L}^p(X, \mu)$  en  $\mathcal{L}^\infty(Y, \nu)$ .

iii. Se dice que  $T$  es  $(p, q)$ -fuerte si está acotado de  $\mathcal{L}^p(X, \mu)$  en  $\mathcal{L}^q(Y, \nu)$ .

### Función Maximal de Hardy-Littlewood

Sea  $B_r$  la bola euclídea centrada en el origen y de radio  $r$ . Definiremos la función maximal de Hardy-Littlewood de una función localmente integrable  $f$  en  $\mathbb{R}^n$  como:

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy$$

### Espacios de Sobolev

Dado  $1 \leq p \leq \infty$ . Recordamos que el *espacio de Sobolev*  $W^{1,p}(\mathbb{R}^N)$  comprende todas las funciones  $f \in \mathcal{L}^p$  tales que  $f$  tiene gradiente débil y  $\nabla f \in \mathcal{L}^p$ . A este espacio se le asigna la norma

$$\|f\|_{W^{1,p}} = \|f\|_{L^p} + \|\nabla f\|_{L^p}.$$

## Resultados

**Teorema (Teorema de interpolación de Marcinkiewicz).** Sean  $(X, \mu)$  y  $(Y, \nu)$  espacios medibles,  $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$ , y tome  $T$  como un operador sublineal de  $L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$  a las funciones de medida de  $Y$  que es débil  $(p_0, p_0)$  y es débil  $(p_1, p_1)$ . Entonces  $T$  es fuerte  $(p, p)$  para  $p_0 < p < p_1$ .

### Algunas consecuencias:

La función maximal establece un operador fuerte  $(\infty, \infty)$ . Para ver esto, sea  $f \in \mathcal{L}^\infty$ , entonces para  $x \in \mathbb{R}^N$  y  $r > 0$  arbitrarios se tiene

$$\frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy \leq \|f\|_\infty.$$

Luego tomando el supremo en  $r > 0$ , tenemos  $\mathcal{M}f(x) \leq \|f\|_\infty$ . Ahora, como  $x \in \mathbb{R}^N$  es arbitrario, se deduce que

$$\|\mathcal{M}f\|_\infty \leq \|f\|_\infty.$$

Luego  $\mathcal{M}$  define un operador  $(\infty, \infty)$ .

**Teorema.** El operador  $\mathcal{M}$  es débil  $(1, 1)$ . Para ver esto  $\dots$

Como consecuencia del teorema de interpolación de Marcinkiewicz y lo anterior, tenemos que  $\mathcal{M}$  es un operador fuerte  $(p, p)$  para todo  $1 < p \leq \infty$ .

Notemos que dada  $f \in \mathcal{L}^1$ ,  $\mathcal{M}f \in \mathcal{L}^1$  si y solo si  $f = 0$ . Por lo que no se espera la acotación fuerte en  $\mathcal{L}^1$ .

**Teorema (Teorema de diferenciación de Lebesgue).** Sea  $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ , entonces

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} |f(y)| dy = f(x) \quad c.t.p.$$

**Teorema** Si  $\phi$  es una función positiva, radial, decreciente (como función de  $(0, \infty)$ ), entonces  $\sup_t |\phi_t * f(x)| \leq \|\phi\|_1 \mathcal{M}f(x)$ . Supongamos  $\phi$  función simple, entonces

$$\begin{aligned} |\phi * f(x)| &= \left| \left( \sum_{j=1}^{\infty} c_j \chi_{B_{r_j}(x_j)} * f \right) (x) \right|, \\ &= \left| \sum_{j=1}^{\infty} c_j |B_{r_j}(x_j)| \left( \frac{1}{|B_{r_j}(x_j)|} \chi_{B_{r_j}(x_j)} * f \right) (x) \right|, \\ &\leq \|\phi\|_1 \mathcal{M}f(x). \end{aligned}$$

Luego como  $\phi_t$  es una dilatación de  $\phi$  se puede hacer el mismo procedimiento y concluir el mismo resultado.

Como consecuencia tenemos que la función maximal  $\sup_t |\phi_t * f(x)|$  es débil  $(1, 1)$  y fuerte  $(p, p)$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Este resultado permite generalizar (sin usar secuencias  $\{t_n\}$ ) el resultado de convergencia mencionado anteriormente para aproximaciones de la identidad.

**Teorema [7]** Se verifica que

$$\mathcal{M} : W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

establece un operador acotado cuando  $1 < p \leq \infty$ .

## Trabajo Futuro

A different kind of highlighted block.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Interdum et malesuada fames {1,4,9,...} ac ante ipsum primis in faucibus. Cras eleifend dolor eu nulla suscipit suscipit. Sed lobortis non felis id vulputate.

### A heading inside a block

Praesent consectetur mi  $x^2 + y^2$  metus, nec vestibulum justo viverra nec. Proin eget nulla pretium, egestas magna aliquam, mollis neque. Vivamus dictum **u**<sup>**T**</sup>**v** sagittis odio, vel porta erat congue sed. Maecenas ut dolor quis arcu auctor porttitor.

### Another heading inside a block

Sed augue erat, scelerisque a purus ultricies, placerat porttitor neque. Donec  $P(y \mid x)$  fermentum consectetur  $\nabla_x P(y \mid x)$  sapien sagittis egestas. Duis eget leo euismod nunc viverra imperdiet nec id justo.

## Agradecimientos

Agradezco al Semillero de Análisis Armónico y Ecuaciones Diferenciales Parciales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, especialmente a los docentes Ricardo Ariel Pastrán Ramírez y Oscar Guillermo Riaño Castañeda, quienes orientaron el proceso de desarrollo de este póster, tanto en la parte teórica como en la presentación del mismo.

## Referencias

- [1] Joseph Bak and Donald J. Newman. *Complex analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, third edition, 2010. ISBN 978-1-4419-7287-3. doi: 10.1007/978-1-4419-7288-0. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7288-0>.
- [2] Emanuel Carneiro. Regularity of maximal operators: recent progress and some open problems. In *New trends in applied harmonic analysis. Vol. 2—harmonic analysis, geometric measure theory, and applications*, Appl. Numer. Harmon. Anal., pages 69–92. Birkhäuser/Springer, Cham, 2019. ISBN 978-3-030-32352-3.
- [3] Javier Duoandikoetxea. *Fourier analysis*, volume 29 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001. ISBN 0-8218-2172-5. doi: 10.1090/gsm/029. URL <https://doi.org/10.1090/gsm/029>. Translated and revised from the 1995 Spanish original by David Cruz-Uribe.
- [4] Lawrence C. Evans. *Partial differential equations*, volume 19 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, second edition, 2010. ISBN 978-0-8218-4974-3. doi: 10.1090/gsm/019. URL <https://doi.org/10.1090/gsm/019>.
- [5] Loukas Grafakos. *Classical Fourier analysis*, volume 249 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, third edition, 2014. ISBN 978-1-4939-1193-6. doi: 10.1007/978-1-4939-1194-3. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1194-3>.
- [6] Piotr Hajt asz and Jani Onninen. On boundedness of maximal functions in Sobolev spaces. *Ann. Acad. Sci. Fenn. Math.*, 29(1):167–176, 2004. ISSN 1239-629X,1798-2383.
- [7] Juha Kinnunen. The Hardy-Littlewood maximal function of a Sobolev function. *Israel J. Math.*, 100:117–124, 1997. ISSN 0021-2172,1565-8511. doi: 10.1007/BF02773636. URL <https://doi.org/10.1007/BF02773636>.
- [8] Juha Kinnunen and Peter Lindqvist. The derivative of the maximal function. *J. Reine Angew. Math.*, 503:161–167, 1998. ISSN 0075-4102,1435-5345.
- [9] Felipe Linares and Gustavo Ponce. *Introduction to nonlinear dispersive equations*. Universitext. Springer, New York, second edition, 2015. ISBN 978-1-4939-2180-5. doi: 10.1007/978-1-4939-2181-2. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2181-2>.