

Variable Compleja: Quiz III

26 de febrero de 2025

Universidad Nacional de Colombia

Cesar Augusto Gómez Sierra

Andrés David Cadena Simons

acadenas@unal.edu.co

Problema 1:

Calcular

$$\int_0^\pi \frac{\operatorname{sen}^4(x)}{a + b\cos(x)} dx, \quad 0 < a < b.$$

Solución:

Queremos resolver la integral:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(a - b\cos(x))^2}$$

donde $a > b > 0$.

Haciendo el cambio de variable $z = e^{ix}$, tenemos:

$$\cos(x) = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

y $dx = \frac{dz}{iz}$, lo que convierte la integral en un contorno en el plano complejo:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{1}{iz} dz}{\left(a - b\frac{z^2+1}{2z}\right)^2}$$

Simplificando:

$$I = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{(2az - b(z^2 + 1))^2}$$

$$I = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{(-bz^2 + 2az - b)^2}$$

Los polos se encuentran al resolver:

$$-bz^2 + 2az - b = 0$$

$$z = \frac{2a \pm \sqrt{4a^2 - 4b^2}}{2b} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$

Definiendo $k = \frac{a - \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$, tenemos un polo dentro del contorno unitario, ya que $k < 1$ cuando $a > b$.

El residuo en $z = k$ se calcula como:

$$\operatorname{Res} \left[\frac{2}{i} \frac{1}{(-b(z - k)(z - k'))^2}, z = k \right]$$

Realizando las operaciones, obtenemos:

$$I = \frac{2\pi}{a^2 - b^2}$$

Problema 2:

Encontrar el número de ceros de $z^4 - 6z + 3 = 0$, en la región $1 < |z| < 2$.

Solución:

Solución.

Problema 3:

Calcular

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^5 + 1} dx.$$

Solución:

Solución.

Problema 4:

Calcular

$$\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Solución:

Solución.