Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 1

27 de marzo de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Sejam $\alpha > 1$ e $c \in \mathbb{R}$. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$, definida no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$, cumpre a condição

$$|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|^\alpha \quad \text{para quaisquer } x, y \in U, \tag{1}$$

então f é constante em cada componente conexa de U.

Solução:

Suponha $K \subseteq U$ uma componente conexa. Então, como ela é conexa y aberta, sabemos que K é arco-conexa, pelo que, sem perdida de generalidade sabemos que dados $x, y \in K$ e $t \in [0, 1]$ o ponto $x + t(y - x) \in K$.
Vamos ver que f é diferenciável, ja que usando a condição (1) sabemos que tomando $t \in [0, 1]$ temos que como $\alpha > 1$ e portanto $\alpha - 1 > 0$ que

$$\lim_{t \to 0} \frac{|f(x + t(y - x)) - f(x)|}{|t(y - x)|} \leq \lim_{t \to 0} c|t(y - x)|^{\alpha - 1} = 0.$$

Logo como y e x são arbitrarios (pelo suficientemente pequenos) podemos afirmar que f é diferenciável, alem disso $df(x) \cdot v = 0$ para todo $x \in K$ e $v \in \mathbb{R}^m$ suficientemente pequeno.
Agora, definamos $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ por $\varphi(t) = f(x + t(y - x))$, logo

- $\varphi'(t) = df(x + t(y - x)) \cdot t(y - x) = 0$.
- $\varphi(1) - \varphi(0) = f(y) - f(x)$.

Portanto, pelo desigualdad de valor medio para caminhos, temos que

$$|\varphi(1) - \varphi(0)| = |f(y) - f(x)| \leq 0|y - x|.$$

Logo $f(x) = f(y)$ para tudo $x, y \in K$, e,i. f é constante em cada componente conexa de U.

Exercício 2:

Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciáveis no ponto $a \in U$, com $f(a) = g(a)$. A fim de que $f'(a) = g'(a)$, é necessário e suficiente que

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = 0.$$

Solução:

Como f e g são diferenciáveis no ponto a temos que dado $v \in \mathbb{R}^m$ suficientemente pequeno tal que $a + v \in U$ se cumpre que como $f(a) = g(a)$, temos

$$\begin{aligned} f(a+v) &= f(a) + f'(a) \cdot v + r(v) \\ g(a+v) &= f(a) + g'(a) \cdot v + \overline{r}(v), \end{aligned}$$

onde

$$\lim_{v \to 0} \frac{r(v)}{|v|} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{v \to 0} \frac{\overline{r}(v)}{|v|} = 0.$$

Necessário: Assim, como $f'(a) = g'(a)$, então $f(a+v) - g(a+v) = r(v) - \overline{r}(v)$, portanto

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = \lim_{v \to 0} \frac{r(v) - \overline{r}(v)}{|v|} = 0.$$

Suficiente: Assim, temos que por um lado

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = 0,$$

mas, por outro lado

$$\lim_{v \to 0} \frac{f(a+v) - g(a+v)}{|v|} = \lim_{v \to 0} \frac{f'(a) \cdot v - g'(a) \cdot v + r(v) - \overline{r}(v)}{|v|} = (f'(a) - g'(a)) \cdot v.$$

Assim, pelo anterior $f'(a) - g'(a) = 0$, e, i. $f'(a) = g'(a)$.

Exercício 3:

Sejam $V \subset U \subset \mathbb{R}^m$ abertos e $\delta > 0$ tais que $x \in V$, $|h| < \delta \Rightarrow x + h \in U$. Seja $B = B(0; \delta)$. Se $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável, então $\varphi : V \times B \to \mathbb{R}^n$, definida por $\varphi(x, h) = f(x + h)$, é diferenciável, sendo

$$\varphi'(x_0, h_0) \cdot (u, v) = f'(x_0 + h_0) \cdot (u + v).$$

Solução:

Solução.

Exercício 4:

Seja $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto. A fim de que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ seja diferenciável no ponto $a \in U$ é necessário e suficiente que exista, para cada $h \in \mathbb{R}^m$ com $a + h \in U$, uma transformação linear $A(h) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que $f(a + h) - f(a) = A(h) \cdot h$ e $h \mapsto A(h)$ seja contínua no ponto $h = 0$.

Solução:

Solução.

Exercício 5:

Dado $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto, seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U$. Prove que se $\lim v_k = v$ em $\mathbb{R}^m$ e $\lim t_k = 0$ em $\mathbb{R}$, então

$$\lim_{k\to\infty} \frac{f(a + t_k v_k) - f(a)}{t_k} = f'(a) \cdot v.$$

Solução:

Solução.

Exercício 6:

Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se, para algum $b \in \mathbb{R}^n$, o conjunto $f^{-1}(b)$ possui um ponto de acumulação $a \in U$, então $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ não é injetiva.

Solução:

Solução.

Exercício 7:

Dada $f : S^m \to \mathbb{R}^n$ defina a extensão radial de f como a aplicação $F : \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$ tal que $F(0) = 0$ e $F(x) = |x| \cdot f\left(\frac{x}{|x|}\right)$ se $x \neq 0$. Mostre que F é diferenciável na origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$ se, e somente se, f é (a restrição de uma aplicação) linear.

Solução:

Solução.

Exercício 8:

Sejam $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ e $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$, tal que $\sigma(I) \subset \mathbb{R}^n$ é um caminho. Se $\sigma(t)$ é diferenciável em $t_0 \in I$, e $f(x, y)$ é diferenciável em $\sigma(t_0) = (x_0, y_0)$, então a função composta

$$z = f(\sigma(t)), \quad t \in I,$$

é diferenciável em t_0 e

$$\frac{dz(t_0)}{dt} = \nabla f(\sigma(t_0)) \cdot \sigma'(t_0),$$

ou, na notação clássica,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Solução:

Solução.

Exercício 9:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ diferenciável, com $f(0) = 0$. Se a transformação linear $f'(0)$ não tem valor próprio igual a 1, então existe uma vizinhança V de 0 em $\mathbb{R}^m$ tal que

$$f(x) \neq x \quad \text{para todo } x \in V \setminus \{0\}.$$

Solução:

Solução.