Álgebra Avançada

"Mathematics is the art of giving the same name to different things."

Henri Poincaré

Author
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Grupos **3**
2.1 Definição . . . 3
2.2 Subgrupos . . . 5
2.3 Classes laterais . . . 6
2.4 Subgrupo normal . . . 8
2.5 Homomorfismos de grupos . . . 11
2.6 Classificação de alguns grupos . . . 13
2.6.1 Cíclicos . . . 13
2.6.2 Finítos com $n = 1, \cdots, 8$ . . . 13
2.7 Grupos finitamente gerados . . . 15
2.8 Subgrupos quocientes . . . 16
2.9 Grupos de automorfismos . . . 18
2.9.1 Automorfismos internos de um grupo . . . 19
2.10 Subgrupos característicos . . . 22
2.11 Grupos simétricos . . . 24
2.12 Grupos solúvels . . . 29
2.13 Teorema de Cauchy . . . 32
2.14 Teorema de Caley . . . 35
2.15 Teoremas de Sylow . . . 43
2.16 Grupos livres . . . 46

3 Sn é completo **54**
3.1 Propriedades do S_n . . . 54
3.2 S_n é completo com $n \geq 3$ e $n \neq 6$ . . . 59
3.3 S_6 não é completo . . . 64

4 Anéis **69**
4.1 Definição . . . 69

Bibliography **71**

Capítulo 1

Introdução

Estas notas foram elaboradas com o objetivo de acompanhar o curso de Álgebra Avançada, oferecendo uma apresentação organizada e detalhada dos principais conceitos, resultados e técnicas que constituem a base da álgebra moderna. O enfoque adotado busca equilibrar rigor matemático e clareza expositiva, servindo tanto como material de apoio para o estudo quanto como referência futura.

O curso está estruturado em três eixos fundamentais. No primeiro, desenvolve-se a teoria de grupos, incluindo o estudo de subgrupos, subgrupos normais e quocientes, a equação de classes e ações de grupos. São também abordados resultados centrais como os teoremas de Sylow, além de classes importantes de grupos, tais como grupos solúveis, simples e livres.

No segundo eixo, introduz-se a teoria de anéis e módulos, com ênfase em construções fundamentais como soma direta, produto direto e produto tensorial. Estudam-se anéis de polinômios e propriedades estruturais de domínios euclidianos, fatoriais e principais, bem como a teoria de ideais. A teoria de módulos sobre domínios de ideais principais permite aplicações relevantes, em particular à classificação de grupos abelianos finitamente gerados. Finalmente, discute-se a noção de anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

O terceiro eixo é dedicado à teoria de corpos e extensões, abrangendo extensões algébricas e transcendentes, corpos de decomposição, extensões normais e galoisianas. Estuda-se o grupo de Galois associado a um polinômio e culmina-se com o Teorema Fundamental da Teoria de Galois. Também são consideradas propriedades de corpos finitos e outros tópicos complementares.

Estas notas foram elaboradas com base em referências clássicas da literatura, entre as quais

destacam-se as obras de Hungerford, Dummit e Foote, Artin, Lang, entre outros, que constituem pilares no estudo da álgebra moderna.

Ementa

1. **Grupos:** subgrupos, subgrupos normais, quocientes; equação de classe, ações de grupos; p-grupos finitos e os teoremas de Sylow; grupos solúveis; grupos simples; grupos livres.

2. **Anéis e módulos:** a soma, o produto direto e o produto tensorial de módulos; anéis de polinômios e Lema de Gauss, domínios euclideanos, fatoriais e principais; ideais bilaterais e maximais; módulos sobre domínios de ideais principais; elementos e módulos de torção; aplicações a grupos abelianos finitamente gerados; anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert.

3. **Corpos:** extensões algébricas e transcendentes; corpos de decomposição; extensões normais e galoisianas; o grupo de Galois de um polinômio; Teorema Fundamental da Teoria de Galois; corpos finitos. Outros tópicos.

Bibliografia

1. Hungerford, T.W. *Algebra.* Springer-Verlag, 2000.

2. Isaacs, I.M. *Algebra: A Graduate Course.* Brooks/Cole Publishing Company, 1994.

3. Rotman, J.J. *Advanced Modern Algebra.* AMS, 2010 (second edition).

4. Dummit, D.; Foote, R. *Abstract Algebra.* Wiley, 2004.

5. Artin, M. *Algebra.* Pearson, 2nd ed.

6. Lang, S. *Algebra.* GTM 211.

7. Lorenz, F. *Algebra*, Vol. 1. Springer-Verlag, 2006.

8. Herstein, I.N. *Topics in Algebra.*

Capítulo 2

Grupos

2.1 Definição

Definição 2.1.1 (Grupo)**.** Um Grupo $(G, *)$ é um conjunto G não vazio com uma operação $*$ que satisfaz as seguintes propriedades

- **Fechamento:** Se $a, b \in G$, então $a * b \in G$.
- **Associatividade:** Para quaisquer $a, b, c \in G$, tem-se que $a * (b * c) = (a * b) * c$.
- **Existência do Elemento Identidade:** Existe um elemento $e \in G$ tal que $e * a = a = a * e$ para tudo $a \in G$.
- **Existência do Elemento Inverso:** Para cada $a \in G$, existe um elemento $b \in G$ tal que $a * b = e = b * a$. Geralmente o elemento identidade se denota por e o 1.

Definição 2.1.2 (Grupo Abeliano)**.** Um Grupo $(G, *)$ é um grupo abeliano si ele é Grupo y alem do mais, ele satisfaz

- **Comutatividade:** Para todo par $a, b \in G$, tem-se que $a * b = b * a$.

A partir de agora, usaremos notação multiplicativa.

Definição 2.1.3 (Ordem do grupo)**.** Definimos ordem do grupo a o número de elementos do conjunto G, denotado por $|G|$.

Definição 2.1.4 (Ordem do elemento)**.** A ordem de um elemento $a \in G$ é definida como o menor enteiro positivo n tal que $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = 1$ e denotada por $o(a) = n$. Se não existe tal n, dizemos que a tem ordem infinita e denotamos $o(a) = \infty$.

Exemplo 2.1.5. Se pode verificar que $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.6. Se pode verificar que $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo abeliano.

Exemplo 2.1.7 (GL_n)**.** O conjunto das matrizes invertíveis sobre um corpo K é denotado por $GL_n(K)$ é denominado o **grupo linear geral de grau** n **sobre** K. Se você suponhe que $n \geq 2$, então

$$GL_n(K) = \{A \in M_{n\times n} : \det(A) \neq 0\}$$

é um grupo não abeliano.

Exemplo 2.1.8. Seja X um conjunto não vazio, o conjunto

$$Sim(X) = \{f : X \to X : f \text{ e bijeção}\}$$

é um grupo com a operação de composição de funções.

Observação 2.1.9 (S_n)**.** Se $X = \{1, \cdots, n\}$ denotamos $Sim(X)$ por S_n (grupo de permutações de n símbolos), dito **grupo simétrico de grau** n.

Exemplo 2.1.10 (D_n)**.** O grupo de simetrias de um polígono regular de n lados é o **grupo diedral de grau** n, denotado por D_n, que possui n reflexões y n rotações. D_n é um grupo no abeliano.

Exemplo 2.1.11. Sejan $(G, \star)$ e $(H, \diamond)$ grupos. Defina uma operação em $G \times H$ por

$$(g, h) * (g', h') = (g \star g', h \diamond h').$$

Então $G \times H$ é um grupo. Se G e H são abelianos, então $G \times H$ também o é. Se G e H são finitos, então $G \times H$ também lo é e $|G \times H| = |G||H|$.

2.2 Subgrupos

Definição 2.2.1 (Subgrupo)**.** Um subgrupo de um grupo $(G, \cdot)$ é um subconjunto não vazio H de G tal que $(H, \cdot)$ é um grupo. Neste caso, denotamos $H \leq G$.

Exemplo 2.2.2 (Centro de G)**.** Dado um grupo G, o conjunto $Z(G) = \{g \in G : gx = xg, \text{ para todo } x \in G\}$ é um subgrupo de G dito o **centro de** G.

Observação 2.2.3. Você pode comprobar que $Z(G)$ sempre es abeliano.

Exemplo 2.2.4 (Interseção do subgrupos é subgrupo)**.** Se H y K são dois subgrupos de G, então $H \cap K \leq G$. Em geral, dada uma familia $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ de subgrupos de G, temos que $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha \leq G$.

Exemplo 2.2.5 (Generado)**.** Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subseteq G$, definimos o **subgrupo de** G **generado por** X, denotado por $\langle X \rangle$, como a interseção de todos os

subgrupos de G que contém X. Podemoso observar que

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_s^{\pm 1} : x_i \in X, \text{ para todo } s \geq 0\},$$

(Todas as combinações possíveis entre os elementos de X e seus inversos) onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1.

Observação 2.2.6 (Subgrupo cíclico)**.** Se $X = \{x\}$ (conjunto unitario) então $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ é o **subgrupo cíclico** de G gerado pelo elemento x. O grupo G é dito **cíclico** se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$, neste caso temos $|G| = o(g)$.

Observação 2.2.7 (Finitamente gerado)**.** Se existe um subconjunto finito $X \subseteq G$ tal que $G = \langle X \rangle$, então dizemos que G é **finitamente gerado**.

2.3 Classes laterais

Definição 2.3.1 (Classes laterais e índice)**.** Se $H \leq G$, definimos uma relação em G da seguinte maneira

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv_H b \text{ sé y so sé } ab^{-1} \in H.$$

Temos

- Esta relação é uma relação de equivalência en G.
- A classe de equivalência de um elemento $a \in G$ é dada por

$$\begin{aligned} \{b \in G : B \equiv_H a\} &= \{b \in G : ba^{-1} = h \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{b \in G : b = ha \text{ para algúm } h \in H\} \\ &= \{ha : h \in H\} := Ha \end{aligned}$$

  e denominada uma **classe lateral** (á dereita) de H em G (que contem a).

- Se $a, b \in G$, então $Ha = Hb$ ou $Ha \cap Hb = \emptyset$.
- A cardinalidade do conjunto das classes laterais (á dereita) de H em G é denominada o **índice** de H em G e denotada por $[G : H]$.
- Para todo $a \in G$ temos $|Ha| = |H|$.

Teorema 2.3.2 (Teorema de Lagrange)**.** Se G é um grupo finito e $H \leq G$. Então

$$|G| = [G : H]|H|,$$

em particular $|H|$ e $[G : H]$ dividem $|G|$.

Corolário 2.3.3. Se $|G| = p$, onde p é um primo, então G é um grupo cíclico.

Corolário 2.3.4. Sejam G um grupo finito e $a \in G$. Então $o(a)$ divide $|G|$.

Corolário 2.3.5. Se $H, K \leq G$ e $\text{mdc}(|H|, |K|) = 1$ então $H \cap K = \{1\}$.

Poderíamos também definir a seguinte relação de equivalência em G

$$\text{Se } a, b \in G, a \equiv^H b \text{ sé e só sé } a^{-1}b \in H.$$

Neste caso, utilizando as mesmas idéias anteriores, temos um conjunto de classes laterais (**à esquerda**) de H em G, aH onde $a \in G$, com propriedades análogas às da classe lateral à dereita.

Observação 2.3.6. Note que se G é um grupo e $H \leq G$

- Se G é abeliano então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.
- Se $[G : H] = 2$ então $aH = Ha$, para todo $a \in G$.

- No entanto, em geral, podemos ter $aH \neq Ha$, para algúm $a \in G$.

Tome $G = GL_2(\mathbb{R})$, logo tome $H = \langle a \rangle$ en donde a é

$$a := \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Note que $o(a) = 2$, logo $\langle a \rangle = \{1, A\}$.

Agora seja $b \in GL_2(\mathbb{R})$ da seguinte maneira

$$b := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo

$$bH = \{b, ba\}$$
$$Hb = \{b, ab\}.$$

Assim, se você realizar os seguintes calculos, vera que

$$ab = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$ba = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto $bH \neq Hb$ con $b \in Gl_2(\mathbb{R})$ como mencionamos anteriormente.

2.4 Subgrupo normal

Definição 2.4.1 (Subgrupo Normal)**.** Um subgrupo N de um grupo G é **normal em** G se $gN = Ng$, para todo $g \in G$. Neste caso, denotamos $N \lhd G$.

Proposition 2.4.2. Um subgrupo N de G é normal em G se, e somente se, $gag^{-1} \in N$, para todo $g \in G$ e todo $a \in N$.

Exemplo 2.4.3. $\{e\}$ e G são normais em G.

Exemplo 2.4.4. Se G é um grupo abeliano, então todos os seus subgrupos são normais. No entanto a recíproca não e verdadeira, isto é, se todos os subgrupos de um grupo G são normais, então G não é necessarimente abeliano, pode tomar como exemplo S_3 onde $(12)(123) \neq (123)(12)$.

Observação 2.4.5 (Subgrupos do S_3)**.** Sabemos que $S_3 : \{1, (12), (23), (13), (123), (132)\}$, onde $o(12), o(23), o(13) = 2$ e $o(123), o(132) = 3$.

Podemos então listar os subgrupos de S_3 da seguinte forma

- $H_1 = \{1, (12)\}$.
- $H_2 = \{1, (13)\}$.
- $H_3 = \{1, (23)\}$.
- $H_4 = \{1, (123), (132)\}$.

Por 2.3.6 sabemos que H_4 é normal, ja que $|S_3| = 6$, então por el teorema de Lagrange $[G : H_4] = 2$ i,e, $H_4 \lhd G$.

O diagrama a seguir representa os subgrupos de S_3, onde a linha dupla indica que o subgrupo é normal.

$$\begin{tikzcd}
 & S_3 \arrow[dl, dash] \arrow[d, dash] \arrow[dr, dash] \arrow[drr, equal] & & \\
H_1 \arrow[drr, dash] & H_2 \arrow[d, dash] & H_3 \arrow[d, dash] & H_4 \arrow[dl, dash] \\
 & \{1\} & &
\end{tikzcd}$$

Exemplo 2.4.6. $Z(G) \lhd G$. Mais geralmente, se $H \leq Z(G)$ então $H \lhd G$.

Note que se definimos X como el conjunto das classes laterais de H subgrupo de G, a partir disso, estaríamos interessados em definir uma multiplicação de classes por $aH, bH \in X$ como $aHbH = abH$, mas neste caso, esta multiplicação não estã bem definída, pode tomar como exemplo el caso anterior con S_3.
Suponha $H = \{1, (23)\}$, logo

$$X = \{H = (2,3)H, (12)H = (123)H, (13)H = (132)H\}$$

Note que de um lado temos

$$(12)H(13)H = (132)H.$$

Por outro lado temos

$$(123)H(132)H = H.$$

Portanto la multiplicação do classes laterais não está bem definida, mas a seguinte proposição esclarecerá essa questão.

Proposition 2.4.7. Se N é subgrupo normal de G então o conjunto $G/N = \{aN : a \in G\}$ é um grupo com a operação $Na \cdot Nb = Nab$, $a, b \in G$. O grupo G/N é dito o grupo quociente de G por N.

Na verdade, G/N é um grupo se, somente se, $N \lhd G$.

Agora podemos falar sobre alguns observações.

Dados $H, K \leq G$, temos:

- $H \leq G$ se, e somente se, $ab^{-1} \in H$ para todo $a, b \in H$.
- $H \cap K$ é subgrupo de G.
- $H \cup K$ nem sempre é subgrupo (de novo el exemplo é S_3).

- $H \cup K \leq G$ se, somente se, $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$.
- Definimos

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\} = \bigcup_{h \in H} hK.$$

  nem sempre é subgrupo (mesmo exemplo).

- $HK \leq G$ se, somente se, $HK = KH$.
- Se $H \lhd G$ ou $K \lhd G$ então $HK \lhd G$.

2.5 Homomorfismos de grupos

Definição 2.5.1 (Homomorfismo de Grupos)**.** Dados G_1 e G_2 grupos, uma função $\varphi : G_1 \to G_2$ é um **homomorfismo de grupo** se $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G_1$.

Alem do mais temos los conjuntos $\operatorname{Ker}\varphi$ (núcleo de φ) e $\operatorname{Im}\varphi$ (Imágen de φ) definidos como

$$\operatorname{Ker}\varphi := \{a \in G_1 : \varphi(a) = 1\}$$
$$\operatorname{Im}\varphi := \{\varphi(a) : a \in G_1\}.$$

Observação 2.5.2. $\operatorname{Ker}\varphi \lhd G_1, \operatorname{Im}\varphi \leq G_2$.

Definição 2.5.3 (Tipos de Homomorfismos)**.** Seja $\varphi : G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupo, então

- Si φ é injetor, então se chama **Monomorfismo**.
- Si φ é sobrejetor, então se chama **Epimorfismo**.
- Si φ é bijetor, então se chama **Isomorfismo**.

Proposition 2.5.4. φ é um homomorfismo injetor se, somente se, $\operatorname{Ker}\varphi = \{1\}$

Proposition 2.5.5. A partir de um homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ com $K = \operatorname{Ker}\varphi$, podemos construir um homomorfismo injetor

$$\begin{aligned} \overline{\varphi} : G_1/K &\to G_2 \\ aK &\to \varphi(a). \end{aligned}$$

Demonstração

Seja $aK, bK \in G_1/K$ tal que $\overline{\varphi}(aK) = \overline{\varphi}(bK)$, logo $\varphi(a) = \varphi(b)$, assim

$$\begin{aligned} 1 &= \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(b^{-1}) \\ &= \varphi(ab^{-1}). \end{aligned}$$

e $ab^{-1} \in K$ se, somente se $aK = bK$. ■

Observação 2.5.6. Além do mais, como $\operatorname{Im}\overline{\varphi} = \operatorname{Im}\varphi$, temos que $\overline{\varphi} : G_1/K \to \operatorname{Im}\varphi$ é um isomorfismo.

Teorema 2.5.7 (Isomorfismo de Grupos)**.** Se $\varphi : G_1 \to G_2$ é um homomorfismo, então $G_1/\operatorname{Ker}\varphi$ é isomorfo a $\operatorname{Im}\varphi$.

Notação 2.5.8 (Isomorfo)**.** Se G_1 e G_2 são grupos isomorfos, escrevemos $G_1 \cong G_2$.

Observação 2.5.9 (Isomorficamente imerso)**.** Nesta situação anterior, G_1 é isomorfo a $\operatorname{Im}\varphi$ que é um subgrupo de G_2. Neste caso dezemos que G_1 está **isomorficamente imerso** em G_2 e denotamos por $G_1 \hookrightarrow G_2$.

2.6 Classificação de alguns grupos

2.6.1 Cíclicos

Seja G um grupo cíclico gerado por g, neste caso temos 2 opções

- G é infinito.

  Então definimos $\varphi : G \to (\mathbb{Z}, +)$ por $\varphi(g^k) = k$, logo $G_1 \cong \mathbb{Z}$.

- G é finito.

  Suponha $|G| = n$, então para $n \geq 2$ vamos considerar o grupo

$$\mathbb{Z}_n := \{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}, \quad \text{das classe de vetor módulo } n.$$

  Logo $\varphi : G \to \mathbb{Z}_n$ definido por $\varphi(g^k) = \overline{k}$ é um isomorfismo, por tanto $G \cong \mathbb{Z}_n$

2.6.2 Finítos com $n = 1, \cdots, 8$

Note que pelo teorema de Lagrange sabemos que para $n = 1, 2, 3, 5, 7, \cdots, p$ com p prima, temos que $G \cong \mathbb{Z}_p$.

Para $n = 4$ note que pelo teorema de Lagrange se fixamos $x \in G$, temos dois casos $o(x) = 4$, en ese caso $G \cong \mathbb{Z}_4$. Por outro lado, se $o(x) = 2$, então tenemos el seguinte grupo

Definição 2.6.1 (Grupo de Klein)**.** Seja K_4 um grupo chamado el **grupo de Klein** caracterizado pela seguinte tabela de Cayley

$\cdot$	1	a	b	ab
1	1	a	b	ab
a	a	1	ab	b
b	b	ab	1	a
ab	ab	b	a	1

Proposition 2.6.2 (Produto direito)**.** Um grupo G é o produto direito de dois subgrupos H e G se valen

1. $H \lhd G$, $K \lhd G$.

2. $H \cap K = \{1\}$.

3. $HK = G$.

Notação 2.6.3 (Produto direito)**.** Denotamos al grupo G produto direito de H e K por $G = H \times K$.

Observação 2.6.4. Note que $K_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, alem do mais

$$\begin{tikzcd}
 & K_4 \arrow[dl, equal] \arrow[d, equal] \arrow[dr, equal] & \\
\langle a \rangle \arrow[dr, dash] & \langle ab \rangle \arrow[d, dash] & \langle b \rangle \arrow[dl, dash] \\
 & \{1\} &
\end{tikzcd}$$

Logo, para $n = 6$ temos que si fixamos $x \in G$ com $x \neq 1$ que, se $o(x) = 6$, então $G \cong \mathbb{Z}^6$.

Note que $o(x) = 2$ no é possivel para todo $x \in G$, dado que se for assim, então dados $a, b, c \in G$ existe $ab \in G$, logo tambem existe ac e cb, pelo $|G| = 6$, o que é uma contradição. Assim, existe $b \in G$ tal que $o(b) = 3$. Note que pelo teorema de Lagrange se $N = \langle b \rangle$, então $[G : N] = 2$, por isso $N \lhd G$, logo dado $a \in G$ tem-se que $aba^{-1} \in N$, logo

- aba^{-1} pode ser 1?, não, dado que $o(b) = 3$.

- aba^{-1} pode ser b?, não, dado que $ab = ba$ e $o(ab) = 6$.

- aba^{-1} pode ser b^{-1}?, sim.

Com isso $G\{1, a, b, b^2, ab, ab^{-1}\} \cong S_3$.

Então temos

$$|G| = 1 \quad \text{então } G \cong \{1\}.$$

$$|G| = 2 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_2.$$

$$|G| = 3 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_3.$$

$$|G| = 4 \quad , \text{ então } G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_4, & \text{se } o(x) = 4, \\ K_4, & \text{se } o(x) = 2. \end{cases} \quad \text{con } x \in G, x \neq 1.$$

$$|G| = 5 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_5.$$

$$|G| = 6 \quad \text{então } G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_6, & \text{se } o(x) = 6, \\ S_3, & \text{se } o(x) \neq 6. \end{cases} , \text{ con } x \in G, x \neq 1.$$

$$|G| = 7 \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_7.$$

$$|G| = p \quad \text{então } G \cong \mathbb{Z}_p.$$

2.7 Grupos finitamente gerados

Definição 2.7.1 (Grupo finitamente gerado)**.** Diremos que um grupo G é **finitamente gerado** se existe $X \subseteq G$ tal que $\langle X \rangle = G$.

Um grupo finitamente gerado no é necessariamente finito, tome de exemplo $G = (Z, +)$.

Notação 2.7.2 (n-gerado)**.** Diremos que um grupo G é **n-gerado** si é finitamente gerado y neste caso $|X| = n$.

Exemplo 2.7.3. S_3 é um grupo finitamente gerado. Alem do mais, ele é 2-gerado e $X = \{(12), (123)\}$.

Observação 2.7.4. $G = (\mathbb{Q}, +)$ é finitamente gerado?

Observação 2.7.5. Todo subgrupo de um grupo cíclico es cíclico.

Em particular, los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son dados por $m\mathbb{Z}$, onde $m \leq 0$ com $m \in \mathbb{Z}$. Note que $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$.

Alem do mais, note que todos os subgrupos de $\mathbb{Z}$ são cíclicos infinitos y todos los quocientes são finitos se $m \neq 0$.

Exemplo 2.7.6 ($\mathbb{Z}_{p^\infty}$)**.** Considere a seguinte relacão de equivalência en $\mathbb{Q}$. Seja $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$, $q_1 \sim q_2$ se, e somente se, $q_1 - q_2 \in \mathbb{Z}$.

A classe de equivalência de $q \in \mathbb{Q}$ é formada por elementos $q + m$, com $m \in \mathbb{Z}$, la classe é denotada por $\overline{q}$.

Considere p primo e considere o conjunto das classes de elemento em $\mathbb{Q}$ cujo denominador é uma equivalência de p

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} := \left\{ \left(\overline{\frac{a}{p^k}} \right) : a \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Com adição de classes temos que $(\mathbb{Z}_{p^\infty}, +)$ é um grupo.

Logo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ é um grupo infinito onde todo subgrupo é cíclico finito e tal que todo quociente é infinito.

2.8 Subgrupos quocientes

Sabemos que dado um homomorfismo de grupos $\varphi : G \to H$, temos que $\ker \varphi \lhd H$.

Isso nos leva à próxima pergunta. Dado $N \lhd G$, é verdade que existe um homomorfismo de grupos φ tal que N é igual a $\ker \varphi$?

Definição 2.8.1 (Projeção canônica de G sobre G/N)**.** Definamos

$$\pi : G \to G/N$$
$$g \to Ng.$$

Temos que πé um homomorfismo de grupos, π é sobrejetor e $\ker \pi = N$, denotamos π como

projeçao canônica de G sobre G/N.

Teorema 2.8.2 (Teorema da correspondência)**.** Seja $N \lhd G$ e considere $\overline{G} = G/N$, Dado $\overline{H} \leq \overline{G}$, existe $H \leq G$ tal que $N \lhd H$ e $\overline{H} = H/N$.

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[r, dash] \arrow[d, equal] & G/N = \overline{G} \arrow[d, dash] \\
H \arrow[r, dash] \arrow[d, equal] & \overline{H} \arrow[d, dash] \\
N \arrow[r, dash] \arrow[d, dash] & \{\overline{1}\} \\
\{1\} &
\end{tikzcd}$$

Demonstração

Dado $\overline{H} \leq \overline{G}$, considere

$$H = \{g \in G : \pi(g) \in \overline{H}\}.$$

Note que $N \lhd G$, então $N \lhd H$ e $\overline{H/N}$ por construção. ■

A correspondência preserva subgrupos normais, i,e. $\overline{H} \lhd \overline{G}$ se, somente se, $H \lhd G$.

Consequências do teorema do isomorfismo.

1. Se $N \lhd G$ e $H \leq G$, então

   - $NH \leq G$.
   - $N \lhd NH$.
   - $N \cap H \lhd H$.

$$\begin{tikzcd}
 & G \arrow[dl, equal] \arrow[d, dash] & \\
 & NH \arrow[dl, equal] \arrow[dr, dash] & \\
N \arrow[dr, dash] & & H \arrow[dl, equal] \\
 & N \cap H &
\end{tikzcd}$$

Temos $NH/N \cong H/N \cap H$, ja que se consideramos $\varphi : H \to NH/N$, definida por $\varphi(h) = Nnh = Nh$, logo φ é sobrejetiva e $\ker \varphi = H \cap N$ (i,e. φ é homomorfismo).

2. $N \lhd G$, $H \leq G$, com $N \leq H$. Se $H \lhd G$, então $N/H \lhd G/N$.

$$\frac{G/N}{H/N} \cong G/H.$$

Basta considerar $\varphi : G/N \to G/H$ definido por $\varphi(Ng) = Hg$ e mostrar que φ é homomorfismo sobrejetor tal que $\ker \varphi = H/N$.

Temos uma questão.

1. Se todo subbgrupo próprio de G é cíclico, é verdade que G é cíclico? (Não, pode tomar como exemplo S_3).

2. Se todo quociente próprio de G é cíclico, então G é cíclico? (Não, adivinhe o contraexemplo).

2.9 Grupos de automorfismos

Definição 2.9.1 (Grupo de automorfismos)**.** Seja G um grupo, considere

$$Aut(G) := \{\varphi : G \to G : \varphi \text{ é isomorfismo}\}.$$

Se $\varphi \in Aut(G)$ dizemos que φ é um **automorfismo de** G.
Alem do mais, temos que $Aut(G)$ é um grupo com a operação do composição, dito **grupo de automorfismos de** G.

Exemplo 2.9.2 (S_3)**.** Sabemos que $S_3 = \{1, \underbrace{(12)}_{a}, (13), (23), \underbrace{(123)}_{b}, (132)\}$, logo podemos definir S_3 da seguinte maneira (chamada a presentação de S_3)

$$\left\langle \underbrace{a, b}_{\text{geradores}} : \underbrace{a^2 = 1, b^3 = 1, ab = b^1 a}_{\text{relacões entre os geradores.}} \right\rangle$$

Em seguida, utilizaremos a apresentação de S_3 para definir seus automorfismos usando com-

binações dos geradores com elementos da mesma ordem.

$$\begin{aligned} \varphi_1 : G &\to G & \varphi_2 : G &\to G \\ a &\to a. & a &\to a. \\ b &\to b. & b &\to b^{-1}. \\ \varphi_3 : G &\to G & \varphi_4 : G &\to G \\ a &\to ab. & a &\to ab. \\ b &\to b. & b &\to b^{-1}. \\ \varphi_4 : G &\to G & \varphi_5 : G &\to G \\ a &\to ab^{-1}. & a &\to ab^{-1}. \\ b &\to b. & b &\to b^{-1}. \end{aligned}$$

Então, $Aut(S_3) = \{\varphi_i : 1 \leq i \leq 6\}$, logo $|Aut(S_3)| = 6$ y podemos concluir que $Aut(S_3) \cong S_3$.

2.9.1 Automorfismos internos de um grupo

Definição 2.9.3 (Automorfismo interno)**.** Dado G grupo e x fixo, definimos

$$\begin{aligned} \phi_x : G &\to G \\ g &\to g^x = xgx^{-1}. \end{aligned}$$

Então

1. ϕ_x é um homomorfismo de G em G.

2. ϕ_xé injetor e sobrejetor.

Assim, denotamos ϕ_x o **automorfismo interno induzido por conjugação por** x.

Definimos o **grupo das automorfismos internoo de** G por

$$Inn(G) = \{\phi_x : x \in G\} \subseteq Aut(G).$$

Temos que $Inn(G) \lhd Aut(G)$.

Agora, definimos

$$\phi : G \to Aut(G)$$
$$x \to \phi_x.$$

Temos que ϕ é um homomorfismo de grupos, além disso $\operatorname{Im}\phi = Inn(G)$ e

$$\ker\phi = \{x \in G : \phi_x = Id\} = \{x \in G : xg = gx \text{para todo } g \in G\} = Z(G).$$

Conclução, $G/Z(G) \cong Inn(G)$.

Corolário 2.9.4. Note que se $Z(G) = \{1\}$, então $G \cong Inn(G)$.

Demonstração

Por causa do que foi feito na definiçao anterior, temos que $G/Z(G) \cong Inn(G)$, logo como $Z(G) = \{1\}$, temos que $G/Z(G) = G/\{1\} \cong G$, pelo que podemos conclui que $G \cong Inn(G)$.

■

Definição 2.9.5 (Grupo completo)**.** Um grupo G é dito **completo** se $Z(G) = \{1\}$ e além disso, todo automorfismo de G é interno, e,i. $G \cong Inn(G) = Aut(G)$.

Observação 2.9.6. Reciproco do 2.9.5 no é verdade, voce pode tomar como exemplo D_4, ja que $D_4 \cong Aut(D_4)$, mas $Z(D_4) \neq \{1\}$, por tanto $D_4/Z(D_4) \cong K_4$.

Definição 2.9.7 (Equação de classes de conjugaçao)**.** Dados $g, h \in G$, definimos uma relaçao de equivalência dada por $g \sim h$ se, somente se, existe $x \in G$ tal que $h = g^x$.

A classe de equivalencia de um elemento $g \in G$ é $Cl(g) := \{g^x : x \in G\}$ chamada classe de conjugações de g em G.

Note que $Cl(1) = \{1\}$, por outro lado $Cl(g) = \{g\}$ se, somente se, $g \in Z(G)$.

Temos $G = \dot{\bigcup}_{g\in G} Cl(g)$.
Se $|G| < \infty$, temos $|G| = \dot{\sum}_{g\in G} |Cl(g)|$, logo

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{g\in Z(G)} |Cl(g)| + \dot{\sum_{h\notin Z(G)}} |Cl(h)| \\ &= |Z(G)| + \dot{\sum_{h\notin Z(G)}} |Cl(h)| \end{aligned}$$

Isso é a equação das classes de conjugação.

Exemplo 2.9.8 (Classes de conjugações en S_3)**.**

$$\begin{aligned} Cl(1) &= \{1\}. \\ Cl((12)) &= \{(12), (13), (23)\} = Cl((13)) = Cl((23)). \\ Cl((123)) &= \{(123), (132)\} = Cl((132)). \end{aligned}$$

Proposition 2.9.9. Dado $h \in G$, $|Cl(g)|$ é um divisor de $|G|$.

Definição 2.9.10 (Centralizador de h em G)**.** Considere

$$C_G(h) := \{x \in G : xh = hx\}.$$

Temos que $C_G(h)$ é um subgrupo de G, dito **centralizador de h em G**.

Mostrar

1. $|Cl(h)| = [G : C_G(h)]$ para todo $h \in G$.

2. Se $|G| = p^m$ para algúm p primo y algúm $m \geq 1$ com $m \in \mathbb{Z}$. Então $Z(G) \neq \{1\}$.

3. Todo grupo de orden p^2 é abeliano.

4. Se $|G| = p^3$, então G é abeliano ou $|Z(G)| = p$.

2.10 Subgrupos característicos

Definição 2.10.1 (Subgrupo característico)**.** Seja G um grupo e $\varphi : G \to G$ com $\varphi \in Aut(G)$. Se $H \leq G$ implica que $\varphi(H) \leq H$ para todo $\varphi \in Aut(G)$ dizemos que H é um subgrupo **característico** de G e denotamos por $H \underset{\text{car}}{<} G$.

Observação 2.10.2. Se $H \underset{\text{car}}{<} G$, então em particular $\phi_g(H) \leq H$, logo $gH = Hg$ para todo $g \in G$, i.e, $H \lhd G$.

Mas na reciproca não é necesariamente verdadeira.

Exemplo 2.10.3. Seja $G = K_4 = \{1, a, b, ab\} = \langle a, b : a^2 = 1, b^2 = 1, ab = ba \rangle$, lembre que

$$\begin{tikzcd}
 & K_4 \arrow[dl, equal] \arrow[d, equal] \arrow[dr, equal] & \\
\langle a \rangle \arrow[dr, dash] & \langle ab \rangle \arrow[d, dash] & \langle b \rangle \arrow[dl, dash] \\
 & \{1\} &
\end{tikzcd}$$

logo $\langle a \rangle \lhd K_4$, mas $b \langle a \rangle \not\leq H$, logo $\langle a \rangle \underset{\text{car}}{\not<} K_4$.

Note que a normalidade não é transitiva, suponha $H, K \leq G$, com $H \lhd K$ e $K \lhd G$, logo não necesariamente $H \lhd G$.

Exemplo 2.10.4. Seja $G = D_4 = \langle r, \theta : r^2 = \theta^4 = 1, r\theta = \theta^{-1}r \rangle$, logo $\langle r \rangle \lhd \langle r, \theta^2 \rangle$ e $\langle r, \theta^2 \rangle \lhd D_4$, mas $\langle r \rangle \ntriangleleft D_4$.

Fazer diagrama.

Proposition 2.10.5 (Propriedades do subgrupos característicos)**.** Seja $H, K \leq G$, então

1. $H \underset{\text{car}}{<} K$, $K \underset{\text{car}}{<} G$, então $H \underset{\text{car}}{<} G$.
2. $H \underset{\text{car}}{<} K$, $K \lhd G$, então $H \lhd G$.

3. $H \lhd K$, $K \underset{\text{car}}{<} G$, então $H \lhd G$.

Exemplo 2.10.6. Note que para todo $\varphi \in Aut(G)$ temos que $\varphi(Z(G)) \leq Z(G)$.

Definição 2.10.7 (Grupo maximal)**.** Um subgrupo $M \leq G$ é dito **maximal** se $M \neq G$ e se $H \leq G$ é tal que $M \leq H \leq G$, então $H = M$ ou $H = G$.

Definição 2.10.8 (Grupo de Frattini)**.** Seja G um grupo, denotamos por $\phi(G)$ al **grupo de Frattini** de G definido por

$$\phi(G) = \bigcap_{M \leq G}, \quad \text{onde } M \text{ é maximal.}$$

Exemplo 2.10.9. Seja G grupo, então $\phi(G) \underset{\text{car}}{<} G$.

Definição 2.10.10 (Conmutado)**.** Dado $x, y \in G$, denotamos $[x, y]$ al **conmutador de x e y** definido por

$$[x, y] = x^{-1}y{-}1xy.$$

Note que $[x, y] = 1$ se, somente se, x e y conmutan.

Definição 2.10.11 (Grupo derivado)**.** Se G é um grupo, denotamos G' al **grupo derivado de** G definido por

$$G' = \langle [x, y] : x, y \in G \rangle .$$

Exemplo 2.10.12. Note que $[x,y]^{-1} = [y,x]$ e $G' \underset{\text{car}}{<} G$.

Basta mostrar que dada $\varphi \in Aut(G)$, então $\varphi([x,y]) \in G$ para todo $x, y \in G$ e $\varphi([x,y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$.

Então, temos que $G' \lhd G$ e também temos que G/G' é um grupo abeliano.

Alem disso, se $N \lhd G$ é tal que G/N é abeliano, então $G' \leq N$.

Exemplo 2.10.13. Seja $G = S_3$, logo $Z(S_3) = \{1\}$, vamos calcular S_3', lembremos o diagrama do note 2.4.5

$$\begin{tikzcd}
 & & S_3 \arrow[dll, dash] \arrow[dl, dash] \arrow[dr, dash] \arrow[drr, equal] & & \\
H_1 \arrow[drr, dash] & H_2 \arrow[dr, dash] & & H_3 \arrow[dl, dash] & H_4 \arrow[dll, dash] \\
 & & \{1\} & &
\end{tikzcd}$$

Note que $S_3' \lhd S_3$, logo $S' = H_4$ ou $S_3' = S_3$, mas $|S_3/H_4| = 2$, então S_3/H_4 é abeliano, portanto $S_3' \leq H_4$, i.e, $S_3' = H_4$.

2.11 Grupos simétricos

Considere $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, então lembremos

$$S_n = \{\sigma : \{1, \cdots, n\} \to \{1, \cdots, n\} : \sigma \text{ é bijetiva.}\}$$

Sabemos que $|S_n| = n!$ e temos o seguinte resultado que garante que $Z(S_n) = \{1\}$.

Proposition 2.11.1. Para $n \geq 3$, temos que $Z(S_n) = \{1\}$.

Demonstração

Considere $\alpha \in S_n$ com $\alpha \neq 1$. Vamos mostrar que sempre existe $\tau \in S_n$ tal que $\alpha\tau \neq \tau\alpha$ e desta forma, temos que $\alpha \neq Z(S_n)$. Observe que sendo $\alpha \neq 1$ existe $i \in \{1, \cdots, n\}$ tal que

$\alpha(i) = j \neq i$. Como $n \geq 3$, existe $k \in \{1, \cdots, n\}$, onde $k \neq i$ e $k \neq j$. Assim, tome $\tau = (i\,k)$, depois temos que

$$\alpha\tau(i) = \alpha(k) \neq j \,\text{e}\, \tau\alpha(i) = \tau(j) = j.$$

Portanto, $\alpha\tau \neq \tau\alpha$, pelo que podemos conclui que $Z(S_n) = \{1\}$ com $n \neq 3$. ■

Então, dado $\sigma \in S_n$ com $\sigma \neq 1$, podemos considerar a estructura cíclica de σ.

Definição 2.11.2. Chamamos a σ um cíclo de comprimendo m se σ é uma permutação do tipo

$$\begin{aligned} \sigma : G &\to G \\ i_1 &\to i_2, \\ i_2 &\to i_3, \\ &\vdots \\ i_m &\to i_1. \end{aligned}$$

Escrevemos $\sigma = (i_1, i_2, \cdots, i_m)$ ou m-cíclo.

Note que toda permutação $\sigma \neq 1$ em S_n pode ser escrita como um produto de cíclos disjuntos (cíclos que não mvem elementos em común).

Dois cíclos disjuntos comutam entre sí, então ela é a estructura cíclica de σ, i.e, é a manera única a mas de ordem do σ onde σ se escreve como produto de cíclos disjuntos. Exemplos:

$$(9357) = (3579) = (5793) = (7935)$$

$$(3\,5\,7\,9)(2\,4)(8\,10\,11) = (3\,5\,7\,9)(9\,10\,11)(2\,4)$$

Você pode fazer e seguinte exercicio.

$$(359)(89)(34) = (34598).$$

Observação 2.11.3. Todo m-cíclo pode ser escrito como um produto de [transposições] (cíclos de comprimendo 2) não necesariamente disjuntos, por exemplo

$$(2359) = (29)(25)(23).$$

Geralmente

$$(i_1\, i_2\, \cdots\, i_m) = (i_1 i_m)(i_1 i_{m-1}) \cdots (i_1 i_2).$$

Observação 2.11.4 (Propriedades de S_n)**.** Um conjunto gerador de S_n

$$\langle (ij) : 1 \leq i \neq j \leq n \rangle = S_n.$$

Temos as seguintes propriedades

- $S_n = \langle (12), (23), \cdots, ((n-1)n) \rangle$.
- $S_n = \langle (12), (12 \cdots n) \rangle$.
- Dada $\varsigma = (ij)$ transpoção com $i \leq j-1$, temos $(ij) = ((j-1)j)(i(j-1))((j-1)j)$.

Definição 2.11.5 (Permutações pares e impares)**.** $\sigma \in S_n$ é **par** se pode ser escrita como um produto de uma cantidade par de transposições. Caso contrário, σ é **impar**.

Definição 2.11.6 (A_n)**.** Definimos A_n como

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \sigma \text{ é par.}\}$$

Ele é um subgrupo de S_n dito subgrupo **alternado de grau** n de S_n.

Observação 2.11.7 ($A_n \lhd S_n$)**.** Note que $A_n \lhd S_n$ para todo $n \geq 5$.

Seja $\varsigma = (ij)$ uma transposição de S_n defina

$$\begin{aligned} f : S_n &\to A_n \\ \sigma &\to f(\sigma) LHS = \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \text{ e par,} \\ \varsigma\sigma, & \text{se } \sigma \text{ e impar.} \end{cases} \end{aligned}$$

Logo f é um homomorfismoo sobrejetivo, $\ker f =: \{1, \varsigma\} = \langle \varsigma \rangle$. Assim, $|S_n / \ker f| = 2 \cong \operatorname{Im} f$, logo $[S_n : A_n] = 2$ e portanto $A_n \lhd S_n$.

Consequentemente S_n não é um grupo simple, mas, vamos mostrar que A_n é um grupo sumple com $n \geq 3$ e $n \neq 4$.

Em S_4 nos temos que $|A_4| = 12$, logo $\widetilde{K_4} = \{1, (12)(34), (13)(23), (14)(23)\}$ e $\widetilde{K_4} \lhd A_4$ (mais do fue isto $\widetilde{K_4} \lhd S_4$).

Proposition 2.11.8. Duas permutações $\alpha, \beta \in S_n$ das conjugada se, e somente se, α e β tem a mesma estructura cíclica.

Demonstração

Suponha que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\alpha = \beta^\sigma$, vamos admitir que α é um m-cíclo, digamos $\alpha = (i_1 i_2 \cdots i_m)$, temos

$$\begin{aligned} \beta\gamma(i_1) &= \gamma\alpha(i_1) \\ &= \gamma(i_2). \\ \beta\gamma(i_2) &= \gamma\alpha(i_2) \\ &= \gamma(i_3). \\ &\vdots \end{aligned}$$

Concluimos que β é o cíclo $(\gamma(i_1), \gamma(i_2) \cdots \gamma(i_m))$.

Reciprocamente, sejan

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1^{(1)} i_2^{(1)} \cdots i_{k_1}^{(1)}) \cdots (i_1^{(s)} i_2^{(s)} \cdots i_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \\ \beta &= (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \cdots j_{k_1}^{(1)}) \cdots (j_1^{(s)} j_2^{(s)} \cdots j_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \end{aligned}$$

Defina $\gamma : i_t^l \to j_t^l$. ■

Observação 2.11.9. Cada estructura cĩclica posivel em S_n está associada a uma partição de n, isto es, por exemplo

$$(489)(125)(67)(3).$$

$(3, 3, 2, 1) \to 9$.

Observação 2.11.10. Seja σ um cíclo de comprimento m, logo m é par ou impar. Se m é par, então σ é impar, caso contrario σ é impar. Com isso, os 3-cíclos em S_n são elementos de A_n com $n \geq 3$.

Proposition 2.11.11.

1. Os 3-cíclos suam o subgrupo de A_n, para $n \geq 3$.
2. Todos os 3-cíclos são conjugados em A_n, para $n \geq 5$.

$$A_3 = \{1, (123), (132)\} \text{ sendo 3-cíclos.}$$

Demonstração

Considere $n \geq 4$ e tome $\sigma \in A_4$ e escreva como um produto de transposições

$$\sigma = (i_1 j_1)(i_2 j_2) \cdots (i_m j_m) \ m \text{ par.}$$

Onde as transposições são disjuntas ou não.

No primer caso, reescreve

$$(i_1 j_1)(i_2 j_2) = (i_1 i_2 j_2)(i_1 j_1 j_2).$$

No segundo caso, sem perdida de generalidade, considere $i_1 = i_2$, temos

$$\begin{aligned}(i_1j_1)(i_2j_2) &= (i_1j_1)(i_1j_2)\\ &= (i_1j_2j_1).\end{aligned}$$

Para provar **2.** considere α e β 3-cíclos em A_n. Sabemos que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\beta = \alpha^\gamma$.

Se $\gamma \in A_n$, acabou.

Se $\gamma \notin A_n$, como $\alpha = (i_1i_2i_3)$, nesse caso considere $\varsigma = (j_1j_2)$ onde $j_1, j_2 \notin \{i_1, i_2, i_3\}$, assim temos que definimos $\theta = \gamma\varsigma \in A_n$ e $\alpha^\theta = \alpha^{\gamma\varsigma} = \alpha^\gamma = \beta$. ■

2.12 Grupos solúveis

Definição 2.12.1 (Grupo solúvel)**.** Dezemos que G é um **grupo solúvel** se existe uma sequencia finita $\{G_i\}_{i=1}^n$ de sugbrupos de G taes que cumprem o papel de serem série abeliana, isso es

$$\{1\} = G_0 \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_n = G$$

e G_{i+1}/G_i é abelinao.

Exemplo 2.12.2.

1. Todo grupo abeliano é solúvel, ja que $\{1\} \lhd G$.
2. Se G é simple, é solúvel, então G é abeliano.
3. S_3 é solúvel, poiss $\{1\} \lhd \langle(123)\rangle \lhd S_3$.
4. D_4 é solúvel (fazer diagrama).
5. S_4 é solúvel $\{1\} \lhd K_4 \lhd A_4 \lhd S_4$.
6. S_n com $n \geq 5$ não é solúvel (vamos demonstrar isso mais tarde).
7. $|G| = p^3$ é solúvel. Por um lado, se G é abeliano, então e solúvel. Por outro lado, se G não é abeliano, então $|Z(G)| = p$, logo $\{1\} \lhd Z(G) \lhd G$.

8. $|G| = p^r$, então G é solúvel.

   Existe $H \leq G$ tal que $|H| = q$, logo $[G : H] = p$, logo $H \lhd G$ (porque é abeliano). Assim, $\{1\} \lhd H \lhd G$.

Teorema 2.12.3 (Teorema de Burniside)**.** Se G é um grupo tal que $|G| = p^a q^b$, então G é solúvel.

Proposition 2.12.4 (Propriedades do um grupo solúvel)**.**

1. Se $H \leq G$, então H é solúvel.
2. Se $N \lhd G$, então G/N é solúvel.
3. Se $N \lhd G$, N solúvel e G/N é solúvel, então G é solúvel.

Demonstração

1. Vamos seguir o diagrama abaixo.

$$
\begin{tikzcd}
G_n = G \arrow[d, equal] \arrow[rrrr

- Temos que

$$\begin{aligned} H_{i+1}/H_i &= \frac{H \cap G_{i+1}}{H \cap G_i} \\ &= \frac{H \cap G_{i+1}}{(H \cap G_{i+1}) \cap G_i} \\ &\cong \frac{(H \cap G_{i+1})G_i}{G_i} \leq G_{i+1}/G_i, \text{ é abeliano.} \end{aligned}$$

Logo H é solúvel.

2. Vamos segui o diagrama abaixo.

$$\begin{tikzcd}
G_n = G \arrow[d, equal] & & & \\
G_{n-1} \arrow[d, equal] \arrow[rrrr

E como N é solúvel

$$\{1\} \lhd \overline{G}_1 \lhd \cdots \lhd N \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_{n-1} \lhd G_n.$$

■

Definição 2.12.5 (Série derivada)**.** Seja G um grupo. Se definimos $G^{(0)} = G, G^{(1)} = G', G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$, então chamamos $\{G^{(i)}\}_{i\geq 0}$ série derivada de G.

Proposition 2.12.6. G é soluvél se, somente se, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $G^{(m)} = \{1\}$.

2.13 Teorema de Cauchy

Teorema 2.13.1 (Teorema de Cauchy)**.** Se G é um grupo finito e p é primo tal que $p \mid |G|$, então existe $g \in G$ tal que $o(g) = p$.

Demonstração

Vamos a raciocinar por indução sobre $|G|$.

1. O teorema vale si $|G| = 1$ por vacuidade.
2. Suponha que o teorema vale para qualquer $|G| \leq n$, portanto, vale para qualquer $H \leq G$, com $H \neq G$.
3. Vamos a raciocinar por casos.
   (a) Suponha que G é cíclico, digamos, $G = \langle g \rangle$ e $p \mid |G|$, então temos que $o(g^{n/p}) = p$.
   (b) Suponha que G é abeliano não cíclico.
   Seja p primo com $p \mid |G|$. Tome $x \in G$ com $x \neq 1$. Temos que $\{1\} \neq \langle x \rangle \leq G$ e $\langle x \rangle \neq G$, note que $N = \langle x \rangle \lhd G$, logo $p \mid [G : N]|N|$, então, se $p \mid N$, pela hipotese de indução, acabou.

Por outro lado, se $p \nmid |N|$, então $p \mid |G/N|$, como $|G/N| \leq |G|$, usamosa hipotese de indução e temos que existe $Ng \in G/N$, com $g \in G$ e $o(Ng) = p$, logo $g^p \in N$ e $g \notin N$.

Considere $o(g^p) = k$, temos que $(g^p)^k = 1$, logo se $g^k = 1$ temos uma contradição, caso contrário, $o(g^k) = p$.

(c) G não e abeliano.

Neste caso, $Z(G) \neq G$, se $p \mid |Z(G)|$, então pela hipotese de induçao temos que existe $g \in Z(G)$ tal que $g^p = 1$.

Por outro lado, se $p \nmid |Z(G)|$, usando a equações das classes de conjugação temos que

$$|G| = |Z(G)| + \dot{\sum_{x \notin Z(G)}} |Cl(x)|.$$

Logo como $p \nmid |Z(G)|$, então existe $x \in G$ tal que $p \nmid |Cl(x)|$ com $x \notin Z(G)$.

Temos que $p \nmid |Cl(x)| = [G : C_G(x)]$, então $p \mid |C_G(x)|$, com $C_G(x) \neq G$, pois $x \notin Z(G)$. Logo pela hipotese de indução temos que existe g tal que $g^p = 1$.

■

Agora, vamos provas que A_n é um grupo simple, para $n \geq 5$, isso porque A_n é gerado pelos 3-cíclos e todos os 3-cíclos son conjugados em A_n.

Teorema 2.13.2 (A_n é simple)**.** Seja $G = A_n$. Se $n \geq 5$ temos que A_n é simple.

Demonstração

Seja $\{1\} \neq N \lhd A_n$, para mostrar que $N = A_n$ basta mostrar que N contem um 3-cíclo, ja que os 3-cíclos são conjugação de outro 3-cíclo.

Considere p primo tal que $p \mid |N|$.

Pelo teorema de Cauchy, existe $\sigma \in N$ tal que $o(\sigma) = p$.

Escrevemos σ como produto de ciclos disjuntos ς_i, $1 \leq i \leq m$, logo $\sigma = \varsigma_1 \cdots \varsigma_m$.

Deta forma, cada φ_i é um p-cíclo.

Analisamos os valorespossivels para p.

1. $p = 2$.

   uma transposiçõe e assim, $m \geq 2$ par, escreva

$$\sigma = (ab)(cd)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m \in N.$$

   Considere $\gamma = (abc)$, temo que como N é normal se pode calcular

$$\begin{aligned}\sigma^\gamma \sigma^{-1} &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma \varsigma_3^\gamma \cdots \varsigma_m^\gamma \cdot \sigma^{-1} \\ &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma (ab)(cd) \\ &= (ac)(bd) \in N.\end{aligned}$$

   Agora, como $n \geq 5$, podemos tomar $k \notin \{a, b, c, d\}$, consideremos $\theta = (ack)$ e $\alpha = (ac)(bd)$ e temos que $(akc) = \alpha^\theta \alpha \in N$.

2. $p = 3$.

   Neste caso, cada ς_i é um 3-cíclo, se $m = 1$, acabou. Caso contrário, se $m \geq 2$, escreva $\sigma = (abc)(def)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m$. Considere o 3-cíclo $\gamma = (bcd)$ e, como N é normal se cumpre que $\sigma^\gamma \sigma^{-1} \in N$ e é um 5-cíclo, este caso será resolvido a partir de na próxima situação.

3. $p > 3$.

   Consider $\varsigma_1 = (a_1 a_2 \cdots a_p)$: p-cíclo em N e $\gamma = (a_2 a_3 a_4)$ (observe que γ comuta com todos ς_i com $i \geq 2$). Temos que

$$\sigma^\gamma \sigma^{-1} = (a_2 a_3 a_5) \in N.$$

   Isto mostra o resultado.

Em conclução $N = A_n$. ■

Consequências:

Subgrupos normais de S_n, $n \geq 3$.

- $n = 3$, $N \lhd S_3$, então $N = \{1\}$ ou $N = A_3 = S_3$.
- $n = 4$, $N \lhd S_4$, logo temos que $N \in \{\{1\}, K_4, , A_4, S_4\}$ (queda como exercicio mstrar que são os únicos normais de S_4).

- $n \geq 5$. Se $N \lhd G$, então $N \in \{\{1\}, A_n, S_n\}$, usando que $N \lhd S_n$ temos que $A_n \cap N \lhd A_n$, logo como A_n é simple, temos que $A_n \leq N \leq S_n$, assim, $N = A_n$ ou S_n. Por outro lado, se $N \cap A_n = \{1\}$, então vamos provar que $N = \{1\}$. Raciocinando por contradiçao temos que existe um $\theta \in N$ tal que $\theta \neq 1$, temos que $\theta \notin A_n$, mas $\theta^2 \in N$ é par e $\theta^2 \in A_n$. Logo $\theta^2 \in N \cap A_n = \{1\}$, então $\theta^2 = 1$.

  Afirmação: $N = \{1, \theta\}$.

  De fato, se $1 \neq \gamma \in N$ temos que $\gamma\theta \in A_n$, logo $\gamma\theta = 1$ e assim $\gamma = \theta^{-1} = \theta$.

  Agora, escreva θ como um produto de transposições disjuntas $\theta = \varsigma_1 \cdots \varsigma_k$ com k impar, se $k = 1$, digamos $\theta = (i_1 j_1)$ (temos que $n \geq 5$) então tome $j_2 \in \{i_1 j_1\}$ e $\alpha = (i_1 j_2)$, temos $\theta^\gamma = (j_2 j_1) \neq \theta$, contradição.

  Se $k \geq 2$, considere $\theta = (i_1 j_1)(i_2 j_2)\varsigma_3 \cdots \varsigma_k$ e $\beta = (i_1 i_2)$. Assim $\theta^\beta = (i_2 j_1)(i_1 j_2)\varsigma_3 \cdots \varsigma_k \neq \theta$, contradição.

  Logo, neste caso $N = \{1\}$.

Definição 2.13.3 (p-grupo)**.** Dizemos que G é um p-grupo se todo elemento de G tem ordem de potência de p.

Observação 2.13.4. Se G é um p grupo finito, temos que pelo teorema de Cauchy, $|G| = p^m$ para algúm $m \geq 1$.

Mas um p-grupo não precisa ser necessariamente finitom tome como exemplo $\mathbb{Z}_{p^\infty}$.

Como exercicio pode tentar mostrar qu os p-grupos finítos são solúveis.

2.14 Teorema de Caley

Seja G um grupo, sabemos que

$$Sim(G) = \{f : G \to G : f \text{ é bijetiva}\},$$

é um grupo com a operação de composição.

Dado $x \in G$ definimos

$$\begin{aligned} \varphi_x : G &\to G \\ g &\to xg. \end{aligned}$$

Temos que $\varphi_x \in Sim(G)$.

Assim, considere

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ x &\to \varphi_x. \end{aligned}$$

Logo $\operatorname{Ker}\varphi = \{1\}$, consequentemente

$$G/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi \leq Sim(G).$$

Particularmente se $|G| = n < \infty$, $|Sim(G)| = n!$.

Isto motiva o seguinte.

Teorema 2.14.1 (Teorema de Caley)**.** Sea G um grupo, então G é isomorfo a um subgrupo de permutações. Em particular, se $|G| = n < \infty$, então existe $H \leq S_n$ tal que $G \cong H$.

Exemplo 2.14.2 (D_4)**.** Sabemos que

$$D_4 = \left\langle r, \theta : r^2 = \theta^4 = 1, r\theta = \theta r^{-1} \right\rangle.$$

Sabemos que $|D_4| = 8$, logo $D_4 \hookrightarrow S_8$, mas sabemos que $D_4 \leq S_4$, logo também $D_4 \hookrightarrow S_4$. Então sabemos que S_n pode estar muito longe.

Generalizando, considere $X \neq \emptyset$ um conjunto qualquer, assim pode definir

$$Sim(X) := \{f : X \to X : f \text{ é bijetiva}\}.$$

Definição 2.14.3 (Representação permutacional)**.** Uma **representação permutacional** de G sobre X é um homomorfismo $\varphi : G \to Sim(X)$.

Exemplo 2.14.4. Para $X = G$, temos

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ g &\to \varphi_g : X \to G \\ &\qquad x \to gx, \end{aligned}$$

é chamada **representação regular** de G.

Importante: Uma representação permutacional de G sobre X define uma ação de G sobre X (e vice-versa).

Definição 2.14.5 (Ação de um grupo G sobre um conjunto)**.** Seja G um grupo e $X \neq \emptyset$ um conjunto, então

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, x) g &\cdot x. \end{aligned}$$

Tal que

- $1 \cdot x = x$ para todo $x \in X$.
- $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ para todo $g, h \in G$ e todo $x \in X$.

é uma **ação de grupo** de G sobre X.

Observação 2.14.6. Dada uma representação de G sobre X

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X) \\ g &\to \varphi_g : X \to X \\ &\qquad x \to \varphi_g(x), \end{aligned}$$

definimos uma ação de G sobre X dada por

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, x) &\to \varphi_g(x). \end{aligned}$$

Reciprocamente, se temos uma ação de G sobre X

$$\begin{aligned} G \times X &\to X \\ (g, x) &\to g \cdot x, \end{aligned}$$

definimos uma representação de G sobre X

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X) \\ g &\to \varphi_g : X \to X \\ &\qquad x \to \varphi_g(x) := g \cdot x, \end{aligned}$$

a qual é um homomorfismo.

Exemplo 2.14.7. No caso de uma representação regular de G

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ g &\to \varphi_g : G \to G \\ &\qquad x \to g \cdot x, \end{aligned}$$

temos a ação de G sobre si misma por multiplicação à esquerda.

$$G \times G \to G$$
$$(g, x) \to gx.$$

Observamos que dada uma ação de G sobre um conjunto $X \neq \emptyset$, temos definida uma relação de equivalencia em X dada por lo seguinte. Se $x, y \in X$, temos que xRy se, somente se, existe g tal que $y := g \cdot x$.

Definição 2.14.8 (Orbita e Estabilizador)**.** Dada uma ação de G sobre um conjunto X definimos o **orbita** de $x \in X$ em G como a classe de equivalencia de x definida pela relação

$$Orb_G(x) := \{g \cdot x : g \in G\} \subseteq X.$$

Logo $X = \dot{\bigcup}_{x \in X} Orb_G(x)$.
Definimos também o **estabilizador** do x em G como

$$Stab_G(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\} \subseteq G.$$

Lemma 2.14.9. Dado $x \in X$, temos que $Stab_G(x)$ é um subgrupo de G.

Teorema 2.14.10 (Teorema da órbita estabilizador)**.** Dado $x \in X$, temos

$$[G : Stab_G(x)] = |Orb_G(x)|.$$

Demonstração

Considere $S_x = Stab_G(x)$ e o cojunto das classes laterais de S_x em G

$$C = \{gS_x : g \in G\}.$$

Defina $f : C \to Orb_G(x)$ dada por $f(gS_x) = g \cdot x$, logo temos que f é uma bijeção. ■

Consequências: Para $|G| < \infty$ e $|X| < \infty$, temos $|Orb_G(x)|$ é divisor de$|G|$.

$$|X| = \dot{\sum}_{x \in X} |Orb_G(x)|.$$

Algumos exemplos de ações de grupos são.

Exemplo 2.14.11. Ação de G sobre si mesmo por conjugações

$$\begin{aligned} G \times G &\to G \\ (g, x) &\to x^g. \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(G) \\ g &\to \varphi_g : G \to G \\ &\qquad x \to x^g. \end{aligned}$$

Assim, dado $x \in G$, temos

$$\begin{aligned} Orb_G(x) &= \{x^g : g \in G\} = Cl(x) \\ Stab_G(x) &= \{g \in G : x^g = x\} = C_G(x). \end{aligned}$$

Concluimos que $[G : C_G(x)] = |Cl(x)|$ para todo $x \in G$.

Além disso, observe que $\operatorname{Ker} \varphi = \{g \in G : x^g = x\}$ para todo $x \in G$, logo $\operatorname{Ker} \varphi = Z(G)$.

Exemplo 2.14.12 (Conjunto das classes laterais)**.** Dado um subgrupo $H \leq G$, definimos a ação de G sobre o conjunto das classes laterais de H em G.

$$X = \{xH : x \in G\}.$$

$$G \times X \to X$$

$$(g, xH) \to gxH.$$

Logo

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X) \\ g &\to \varphi_g : X \to X \\ &\qquad xH \to gxH. \end{aligned}$$

Se $H \in X$, então (se $|G| < \infty$)

$$\begin{aligned} Orb_G(H) &= X \\ Stab_G(H) &= H \\ [G : H] &= |H| \\ \operatorname{Ker} \varphi &= \{g \in G : \varphi_g = Id_X\} \\ &= \{g \in G : \varphi_g(xH) = xH \text{ para todo } xH \in X\} \\ &= \{g \in G : gxH = xH \text{ para todo } xH \in X\} \\ &= \{g \in G : g \in H^x \text{ para todo } x \in G\} \\ &= \bigcap_{x \in G} H^x \lhd G. \end{aligned}$$

Conclução: Dado $H \leq G$, existe um subgrupo K normal de G tal que $K \leq H$, $K \lhd G$, onde $K = Core(H)$ com $Core(H) = \bigcap_{g \in G} H^g$.

Proposition 2.14.13. Se $|G| < \infty$ e $H \leq G$ com $[G : H] = n$, então existe um $N \leq H$ com $N \lhd G$ tal que $[G : N]$ divide $n!$

Demonstração

Observe que se $X = \{xH : x \in G\}$, então $|Sim(x)| = n!$

Assim, a representação permutacional de G sobre X $\varphi : G \to Sim(X)$ tem núcleo $N = \bigcap_{x \in G} H^x$ e temos $G/N \cong \operatorname{Im} \varphi \leq Sim(X)$.

Logo $|G/N|$ divide $|Sim(X)|$, i.é, $[G : N]$ divide $n!$. ■

Corolário 2.14.14. Se $|G| < \infty$ e $H \leq G$ é tal que $[G : H] = p$, onde p é o menor primo divisor de $|G|$, então $H \lhd G$.

Demonstração

Pela proposição anterior existe $N \lhd G$, $N \leq H$ com $[G : H]$ que divide a p!

Afirmação:$N \neq H$(e assim $H \lhd G$)

De fato, se $N \neq H$, considere q primo tal que q divide $[H : N]$, loo $q \mid (p-1)!$, mas o menor primo que divide $|G|$ é p, contradição, logo $N = H$. ■

Exemplo 2.14.15. Ação de G sobre o conjunto das conjugados de um subgrupo.

Seja $H \leq G$, $X = \{H^x : x \in G\}$ com $|G| < \infty$.

$$G \times X \to X$$
$$(g, H^x) \to H^{gx}.$$

Temos $H \in X$.

$$Orb_G(H) = \{H^g : g \in G\} = X$$
$$Stab_G(H)\{g \in G : H^g = H\} = N_G(H).$$

Logo, pelo teorema da órbita estabilizador temos que

$$[G : Stab_G(H)] = |Orb_G(H)|$$
$$[G : N_G(H)] = |X|.$$

Onde $|X|$ é o número de conjugados de H em G.

2.15 Teoremas de Sylow

Teorema 2.15.1 (Teoremas de Silow)**.** Seja G grupo finito e p primo com $p \mid |G|$, i.é, $|G| = p^{\alpha}m$ com $\alpha \geq 1$ e $\text{mdc}(p, m) = 1$, então

1. Para qualquer $1 \leq \beta \leq \alpha$, existe um subgrupo de G de ordem p^{β}.

   Los p-subgrupos de ordem p^{α} são chamados os **p-subgrupos de Sylow** e denotamos $Syl_p(G) = \{H : H \text{ é } p\text{-subgrupo de Sylow}\}$.

2. Dado qualquer p-subgrupo P, existe $S \in Syl_p(G)$ tal que $P \leq S$. Consequentemente, todos os p-subgrupos de Sylow são conjugados.

3. Se n_p é a quantidade de p-subgrupos de Sylow de G (ou seja, $n_p = |Syl_p(G)|$), então $n_p \mid m$ e $n_p \equiv 1 (mod\, p)$

Exemplo 2.15.2. Seja G com $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$, então existe $P \in Syl_2(G)$, com $|P| = 2^2$ e existe $Q \in Syl_3(G)$, com $|G| = 3$.

Nos temos que

- $n_2 = |Syl_2(G)| \in \{1, 3\}$, ja que $n_2 \mid 3$.

  Além mais, $n_2 \equiv 1 (mod\, 2)$, logo

$$\begin{cases} n_2 = 1 \equiv 1 (mod\, 2), & \text{Então } P \lhd G, \text{ ja que } xPx^{-1} = P, \\ n_2 = 3 \equiv 1 (mod\, 2), & . \end{cases}$$

- $n_3 = |Syl_3(G)| \in \{1, 2, 4\}$, ja que $n_3 \mid 2^2$.

  Além mais, $n_3 \equiv 1 (mod\, 3)$, logo

$$\begin{cases} n_3 = 1 \equiv 1 (mod\, 3), & \text{Então } Q \lhd G, \\ n_3 = 2 \not\equiv 1 (mod\, 3), & \\ n_3 = 4 \equiv 1 (mod\, 3), & \text{Observe o seguinte} \end{cases}$$

Suponha que $n_p = 4$, logo temos que se $Q_i \in Syl_3(G)$ com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, logo $\bigcap_{i=1}^{4} Q_i = \{1\}$, pelo que temos $4 \times 2 = 8$ elementos distintos de ordem 3 em G. Logo como $|G| = 12$, restam 4 elementos que forma um único subgrupo de ordém 4 (isso pode ser visto usando um argumento de contagem), logo $P \lhd G$.

Demonstração

1.

Vamos a raciocinar por indução sobre $|G| = p^\alpha m$, com $\text{mdc}(p, m) = 1$.

- Suponha $|\alpha| = 1$, então $|G| = pm$, logo, pelo teorema de Cauchy temos existe $H \leq G$ com $|H| = p$.
- Suponha que o teorema vale para todo grupo k, con $|k| < |G|$ e $p \mid |K|$.

  Suponha que $p \mid Z(G)$.

  Então existe $x \in Z(G)$, com $o(x) = p$, e tal que $H = \langle x \rangle$ tem ordem p e $H \lhd G$, porque $H \leq Z(G)$.

  Temos G/H é um grupo com ordem $p^{\alpha-1}m < |G|$, logo, pela hipótese de indução temos que para cada $1 \leq \gamma \leq \alpha - 1$, existe $\overline{S}_\gamma \leq \overline{G}$, com $|\overline{S}_\gamma| = p^\gamma$. Assim, pelo teorema de correspondencia existe S_γ tal que $S_\gamma \leq G$ com $H \leq S_\gamma$ e $|S_\gamma| = |\overline{S}_\gamma||H| = p^{\gamma+1}$ com $2 \leq \gamma + 1 \leq \alpha$.

  Agora, suponha que $p \nmid Z(G)$.

  Neste caso, usando a equação das classes de conjugação temos que existe $x \notin Z(G)$ tal que $p \nmid |Cl(x)| = [G : C_G(x)]$. Então $|C_G(x)| < G$ e $p \mid |C_G(x)|$, logo $|C_G(x)| = p^\alpha k$ com $k \leq m$, logo usamos a hipótese de indução e temos que o teorema vale.

■

Lembre que se $H \leq G$ e $X = \{H^x : x \in G\}$, logo $|X| = [G : N_G(H)]$. Onde $N_G(H) = \{x \in G : xH = Hx\} = \{x \in G : H^x = H\}$.

Observação 2.15.3. $N_G(H) = G$ se, somente se $H \lhd G$.

Lemma 2.15.4. Seja S p-subgrupo de Silow de G e suponha que $x \in N_G(S)$ tem ordem potência de p, então $x \in S$.

Demonstração

Raciocine pela contradição.

Suponha que $x \notin S$. Considere $|H| = |\langle x \rangle| = p^k$, logo note que $H \leq N_G(S)$ e $S \lhd C_G(S)$, então $HS \leq N_G(S)$, logo temos que para algúm $\beta \neq 0$ se cumpre que $p^\beta = [SH : S] = [H : H \cap S] \neq 1$, lo que é um absurdo, logo $x \in S$.

Fazer diagrama. ■

Corolário 2.15.5. Seja P um p-subgrupo de G e $S \in Syl_p(G)$, temos que $N_G(S) \cap P = S \cap P$ e $N_P(S) = S \cap P$.

Demonstração

2.

Seja P um p-subgrupo de G e $S \in Syl_p(G)$. Vamos mostrar que P ésta contido em algúm conjugado de S.

Considere $X = \{S^x : x \in G\} = \{S_1, S_2, \cdots, S_k\}$, logo vamos considerar a ação φ de P sobre X dada por $\phi_g(S^x) = S^{xg}$ com $g \in P$.

Temos que $X = \dot{\bigcup}_{1\leq i\leq k} Orb_p(S_i)$, logo

$$\begin{aligned}
|X| &= \dot{\sum_{i=1}^{k}} |Orb_P(S_i)| \\
&= \dot{\sum_{i=1}^{k}} [P : Stab_{P(S_i)}] \\
&= \dot{\sum_{i=1}^{k}} [P : N_P(S_i)] \\
&= \dot{\sum_{i=1}^{k}} [P : P \cap N_G(S_i)] \\
&= \dot{\sum_{i=1}^{k}} [P : P \cap S_i].
\end{aligned}$$

Logo

$$[G : N_G(S)] = \sum_{i=1}^{k} [P : P \cap S_i], \tag{2.1}$$

que é potencia de p.

Logo se $p \nmid [G : N_G(S)]$, então existe um i tal que $[P : P \cap S_i] = 1$.

Logo $P = P \cap S_i$, assim $P \leq S_i$.

Isto mostra que qulquer p-subgrupo P de G está contido em algúm p-subgrupo de Sylow de G. Consequentemente, todos os subgrupos de Sylow são conjugados. ■

Demonstração

3.

Temos que $n_p = [G : N_G(S)]$, onde $S \in Syl_p(G)$. Logo $n_p \mid m$ y voltando a (2.1) temos que $n_p = sp + 1$, depois $n_p \equiv 1 (mod\, p)$. ■

2.16 Grupos livres

Considere $X = \{x_i\}_{i\in I}$ conjunto de asociamos e $X^{-1} = \{x_i^{-1}\}$, asociamos a X seu conjugado.

Definição 2.16.1 (Alfabeto e palabras)**.** Consider $X \cup X^{-1}$ chamado **alfabeto**. Assim, construimos **palabras** com sequencias finitas de elementos de $X \cup X^{-1}$ como $x_{i_1}^{\pm} x_{i_2}^{\pm} \cdots x_{i_n}^{\pm}$. Chamamos $x_i x_i^{-1}$ **palabra vazia**.
Mas vamos considerar o conjunto $F(X)$ como o conjunto de so as palabras reduzidas, isto é, que elas não tem palabras vazias.

Sendo así, consideramos uma justaposição de palabras como operação e exigendo como resultado uma palabra reduzida.

Exemplo 2.16.2. Seja $v = x_5 x_4 x_1^{-1} x_2 x_3^{-1}$ e $w = x_3 x_2^{-1} x_3 x_1$, logo $vw = x_5 x_4 x_1^{-1} x_3 x_1$.

Definição 2.16.3 (Grupo livre)**.** $F(X)$ é um grupo, dito **grupo livre** gerado por X.

Note que $|X|$ é posto de grupo livre $F(X)$.

Observação 2.16.4. Existe um grupo livre de qualquer posto dado (finito ou não).

Note que

- $\mathbb{Z}$ é um grupo livre com posto 1.
- Um grupo livre $F(X)$ é infinito.

Questão: dado um grupo infinito, temos

1. Se $o(x)$ é finito, para todo $x \in G$, então G não comtém grupos livres.
2. Se existe $x \in G$ tal que $o(x)$ é infinito, então G comtém um grupo livre de posto 1.

Pregunta: G comtém grupos livres de posto ≥ 2?

Teorema 2.16.5. Se F é um corpo infinito, então o grupo $GL_n(F)$ comtém subgrupos livres de posto ≥ 2, para $n \geq 2$.

Lemma 2.16.6 (Macbeath)**.** Se G é um grupo gerado por subgrupos G_1 e G_2 com $G_1 \cap G_2 = \{1\}$ tais que $|G_i| > 2$, para algúm i e G ace em um conjunto com ações.
$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ unión disjunta.

- para todo $g \in G_1 \setminus \{1\}$ temos que $g_1(\Omega_1) \subseteq \Omega_2$.
- para todo $g \in G_2 \setminus \{1\}$ temos que $g_2(\Omega_2) \subseteq \Omega_1$.

Então, temos que G é o produto livre de G_1 e G_2.

Demonstração

Vamos a provar que não existe uma relação não trivial do tipo

$$x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots = 1,$$

com $x_i \in G_r \setminus \{1\}, y_i \in G_s \setminus \{1\}$, $r, s \in \{1, 2\}$ e $r \neq s$.
Raciocinemos pelo contradição.
Suponha que $|G_1| \geq 3$ e definamos w a palavra dada por

$$w = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots = 1.$$

Sem perdida de generalidade nos podemos asumir que w começa e termina com um elemento do G_1. Pelo contrario, se w començã com un elemento de G_1 e termina com um elementto de G_2 podemos fazer o seguinte, suponha que $g \in G_1$ com $g \notin \{1, x_1\}$, logo temos que

$$g_1^{-1} w g_1 = g_1^{-1} 1 g_1 = 1.$$

Isto é

$$w = (g_1^{-1} x_1) y_1 x_2 y_2 \cdots x_n y_n g_1 = 1.$$

Portanto, podemos afirmar que w começa y termina com um elemento de G_1, assim temos

que

$$w = x_1y_1x_2y_2\cdots x_ny_nx_{n+1} = 1.$$

Então, como $w = 1$, temos que $w(\Omega_1) = \Omega_1$. Por outro, pela hipótese temos que

$$\begin{aligned}
x_1y_1x_2y_2\cdots x_ny_nx_{n+1}(\Omega 1) &\subseteq x_1y_1x_2y_2\cdots x_ny_n(\Omega_2)\\
&\subseteq x_1y_1x_2y_2\cdots x_n(\Omega_1)\\
&\subseteq x_1y_1x_2y_2\cdots(\Omega_2)\\
&\subseteq x_1y_1x_2y_2(\Omega_2)\\
&\subseteq x_1y_1x_2(\Omega_1)\\
&\subseteq x_1y_1(\Omega_2)\\
&\subseteq x_1(\Omega_1)\\
&\subseteq (\Omega_2).
\end{aligned}$$

Isto é

$$w(\Omega_1) \subseteq \Omega_2.$$

Mas $w(\Omega_1) = \Omega_1$, pelo que temos que $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$. Absurdo, ya que $\Omega_1 \cup \Omega_2$ são uma união disjunta. Assim, temos que não existe uma relação não trivial do tipo

$$w = x_1y_1x_2y_2\cdots = 1.$$

Logo como toda palavra reducida e sem elemento neutro é distinta de 1, temos que G é o produto livre de $G_1 * G_2$. ■

Exemplo 2.16.7 (grupo livre de permutações do plano complexo)**.** Seja $\alpha \in \mathbb{C}$ com $|\alpha| \geq 2$.

Considere f e g dadas por lo siguiente

$$f(z) = z + \alpha.$$

$$g(z) = \begin{cases} \frac{z}{\alpha z+1}, & \text{se } z \neq -\frac{1}{\alpha}, \\ \frac{1}{\alpha}, & \text{se } z = -\frac{1}{\alpha}. \end{cases}$$

Veamos que $\langle f, g \rangle$ é um grupo livre.

Primeiro, note que para qualquer $z \in \mathbb{C}$, em particular com $|z| < 1$ temos que

$$|z + \alpha| \geq |\alpha| - |z| > 2 - 1 = 1.$$

Mais geralmente temos que se $k \geq 1$ temos que

$$|f^k(z)| = |z + k\alpha| \geq k|\alpha| - |z| > 2k - 1 \geq 1.$$

Logo, podemos dizer que f envia o interior do círculo unitário para o exterior do círculo unitário.

Agora, veamos que g envia o exterior do círculo unitário para o interior do círculo unitário, ja que se pegamos $z \in \mathbb{C}$ com $|z| < 1$ temos que

$$g\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\frac{1}{z}}{\alpha\frac{1}{z} + 1} = \frac{1}{\alpha + z}.$$

Mais geralmente, temos que se $k \geq 1$ temos que

$$g^k\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{k\alpha + z}.$$

logo como temos que

$$|k\alpha + z| \geq |k\alpha| - |z| > 2k - 1 \geq 1.$$

Assim,

$$\left|g^k\left(\frac{1}{z}\right)\right| = \left|\frac{1}{k\alpha + z}\right| < 1.$$

Assim, nos definimos

$$\Omega_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$
$$\Omega_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\} = \left\{\frac{1}{w} \in \mathbb{C} : |w| < 1\right\}.$$

Assim, temos que $\langle g\rangle \cap \langle f\rangle = \{1\}$ com ambos de ordem mais grande que 2 e com ações mencionadas anteriormente para Ω_1 e Ω_2 que cumplen $f^k(\Omega_1) \subseteq \Omega_2$ e $g^k(\Omega_2) \subseteq \Omega_1$ para todo k, logo temos que pelo lema de Macbeath $\langle f, g\rangle$ é um grupo livre.

Teorema 2.16.8 (Sanov)**.** Considere $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| \geq 2$. Então

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}.$$

geram um subgrupo livre de $GL_2(\mathbb{C})$.

Demonstração

Considerando $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ com $ad - bd \neq 0$, definimos:

$$\lambda_{a,b,c,d} : \mathbb{C} \to \mathbb{C},$$
$$\xi \to \begin{cases} \frac{a\xi+b}{c\xi+d}, & \text{para } \xi \neq -\frac{d}{c}, \\ \frac{d}{c}, & \text{para } \xi = -\frac{d}{c}. \end{cases}$$

Com isso, dada

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C})$$

podemos definir

$$\varphi : GL_2(\mathbb{C}) \to \mathcal{G},$$
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \to \lambda_{a,b,c,d},$$

onde $\mathcal{G} = \{\lambda_{a,b,c,d} : \mathbb{C} \to \mathbb{C} : ab - bd \neq 0\}$.

Note que φ é um homomorfismo sobrejetor de grupos, assim

$$\varphi(A) = \lambda_{1,\alpha,0,1}, \quad f = \lambda_{1,\alpha,0,1}(\xi) = \xi + a.$$
$$\varphi(B) = \lambda_{1,0,\alpha,1}, \quad g = \lambda_{1,0,\alpha,1}(\xi) = \begin{cases} \frac{\xi}{\alpha\xi+1}, & \text{para } \xi \neq -\frac{-1}{\alpha}, \\ \frac{1}{\alpha}, & \text{com } \xi = -\frac{1}{\alpha}. \end{cases}$$

Assim, temos que pelo exemplo anterior $\langle f, g\rangle$ é um grupo livre e isto garante que $\langle A, B\rangle$ é um grupo livre. ■

Exemplo 2.16.9. Seja $G_1 = S_3 = \{1, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ e $G_2 = D_4 = \{1, r, \theta, \theta^2, \theta^3, r\theta, r\theta^2, r\theta^3\}$.

Logo $G_1, G_2 \leq G_1 * G_2$ com $g_{i_1} g_{i_2} \cdots g_{i_k}$, onde $g_{i_j} \in G_1 \cup G_2$

$$(12)\theta(13)(12)r\theta^2\theta^2 = (12)\theta(123)r.$$

O grupo livre de G_1 e G_2 é formado por palavras reduzidas que são sequencias de elementos em G_1 e G_2, respetando as relações entre elementos individualizados de G_1 e G_2 respetando sem relação entre os elementos de G_1 e G_2.

Consider $G_1 = \langle X, R\rangle$ e $G_2 = \langle Y, S\rangle$ onde X e Y são conjuntos geradores e R e S são relações, então $G_1 * G_2 = \langle X, Y, R, S\rangle$.

Se G_1 e G_2 são grupos livres então, temos que $G_1 = \langle X, \emptyset\rangle = \langle X|\ \rangle$ e $G_2 = \langle Y, \emptyset\rangle = \langle Y|\ \rangle$, logo $G_1 * G_2 = \langle X, Y|\ \rangle$.

Exemplo 2.16.10. De novo, $G_1 = S_3$ e $G_2 = D_4$.

Capítulo 3

Sn é completo

Esta parte é baseada e inspirada no trabalho realizado por Érika Helena Assis [2018], agradeço desde ja.

Lembremos que pela definição 2.9.5 temos que um grupo G é dito completo se $Z(G) = 1$ e $Aut(G) = Inn(G)$. Assim, temos que se G é completo, então temos que todo automorfismo de G é interno e pelo corolario 2.9.4 temos que $G \cong Aut(G) = Inn(G)$. Portanto, nosso interesse será verificar se S_n com $n \geq 3$ e $n \neq 6$ é um grupo completo.

Para isso, vamos relembrar alguns dos resultados e propriedades importantes que precisaremos para provar isso.

3.1 Propriedades do S_n

Considere $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, então lembremos

$$S_n = \{\sigma : \{1, \cdots, n\} \to \{1, \cdots, n\} : \sigma \text{ é bijetiva.}\}$$

Sabemos que $|S_n| = n!$.

Então, dado $\sigma \in S_n$ com $\sigma \neq 1$, podemos considerar a estructura cíclica de σ.

Definição 3.1.1. Chamamos a σ um cíclo de comprimendo m se σ é uma permutação do tipo

$$\begin{aligned} \sigma : G &\to G \\ i_1 &\to i_2, \\ i_2 &\to i_3, \\ &\vdots \\ i_m &\to i_1. \end{aligned}$$

Escrevemos $\sigma = (i_1, i_2, \cdots, i_m)$ ou m-cíclo.

Note que toda permutação $\sigma \neq 1$ em S_n pode ser escrita como um produto de cíclos disjuntos (cíclos que não mvem elementos em común).

Dois cíclos disjuntos comutam entre sí, então ela é a estructura cíclica de σ, i.e, é a manera única a mas de ordem do σ onde σ se escreve como produto de cíclos disjuntos. Exemplos:

$$(9357) = (3579) = (5793) = (7935)$$

$$(3\,5\,7\,9)(2\,4)(8\,10\,11) = (3\,5\,7\,9)(9\,10\,11)(2\,4)$$

Você pode fazer e seguinte exercicio.

$$(359)(89)(34) = (34598).$$

Observação 3.1.2. Todo m-cíclo pode ser escrito como um produto de [transposições] (cíclos de comprimendo 2) não necesariamente disjuntos, por exemplo

$$(2359) = (29)(25)(23).$$

Geralmente

$$(i_1\, i_2\, \cdots\, i_m) = (i_1 i_m)(i_1 i_{m-1}) \cdots (i_1 i_2).$$

Observação 3.1.3 (Propriedades de S_n)**.** Um conjunto gerador de S_n

$$\langle (ij) : 1 \leq i \neq j \leq n \rangle = S_n.$$

Temos as seguintes propriedades

- $S_n = \langle (12), (23), \cdots, ((n-1)n) \rangle$.
- $S_n = \langle (12), (12 \cdots n) \rangle$.
- Dada $\varsigma = (ij)$ transpoção com $i \leq j-1$, temos $(ij) = ((j-1)j)(i(j-1))((j-1)j)$.

Definição 3.1.4 (Permutações pares e impares)**.** $\sigma \in S_n$ é **par** se pode ser escrita como um produto de uma cantidade par de transposições. Caso contrário, σ é **impar**.

Definição 3.1.5 (A_n)**.** Definimos A_n como

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \sigma \text{ é par.}\}$$

Ele é um subgrupo de S_n dito subgrupo **alternado de grau** n de S_n.
Note que $|A_n| = \frac{n!}{2}$.

Observação 3.1.6 ($A_n \lhd S_n$)**.** Note que $A_n \lhd S_n$ para todo $n \geq 5$.

Seja $\varsigma = (ij)$ uma transposição de S_n defina

$$\begin{aligned} f : S_n &\to A_n \\ \sigma &\to f(\sigma) = \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \text{ e par,} \\ \varsigma\sigma, & \text{se } \sigma \text{ e impar.} \end{cases} \end{aligned}$$

Logo f é um homomorfismoo sobrejetivo, $\ker f =: \{1, \varsigma\} = \langle \varsigma \rangle$. Assim, $|S_n / \ker f| = 2 \cong \operatorname{Im} f$, logo $[S_n : A_n] = 2$ e portanto $A_n \lhd S_n$.

Consequentemente S_n não é um grupo simple, mas, vamos mostrar que A_n é um grupo sumple com $n \geq 3$ e $n \neq 4$.

Em S_4 nos temos que $|A_4| = 12$, logo $\widetilde{K_4} = \{1, (12)(34), (13)(23), (14)(23)\}$ e $\widetilde{K_4} \lhd A_4$ (mais do fue isto $\widetilde{K_4} \lhd S_4$).

Proposition 3.1.7. Duas permutações $\alpha, \beta \in S_n$ das conjugada se, e somente se, α e β tem a mesma estructura cíclica.

Demonstração

Suponha que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\alpha = \beta^\sigma$, vamos admitir que α é um m-cíclo, digamos $\alpha = (i_1 i_2 \cdots i_m)$, temos

$$\begin{aligned} \beta\gamma(i_1) &= \gamma\alpha(i_1) \\ &= \gamma(i_2). \\ \beta\gamma(i_2) &= \gamma\alpha(i_2) \\ &= \gamma(i_3). \\ &\vdots \end{aligned}$$

Concluimos que β é o cíclo $(\gamma(i_1), \gamma(i_2) \cdots \gamma(i_m))$.

Reciprocamente, sejan

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1^{(1)} i_2^{(1)} \cdots i_{k_1}^{(1)}) \cdots (i_1^{(s)} i_2^{(s)} \cdots i_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \\ \beta &= (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \cdots j_{k_1}^{(1)}) \cdots (j_1^{(s)} j_2^{(s)} \cdots j_{k_s}^{(s)}), \text{ disjunto} \end{aligned}$$

Defina $\gamma : i_t^l \to j_t^l$. ■

Teorema 3.1.8 (A_n é simple)**.** Seja $G = A_n$. Se $n \geq 5$ temos que A_n é simple.

Demonstração

Seja $\{1\} \neq N \lhd A_n$, para mostrar que $N = A_n$ basta mostrar que N contem um 3-cíclo, ja que os 3-cíclos são conjugação de outro 3-cíclo.

Considere p primo tal que $p \mid |N|$.

Pelo teorema de Cauchy, existe $\sigma \in N$ tal que $o(\sigma) = p$.

Escrevemos σ como produto de ciclos disjuntos ς_i, $1 \leq i \leq m$, logo $\sigma = \varsigma_1 \cdots \varsigma_m$.

Deta forma, cada φ_i é um p-cíclo.

Analisamos os valorespossivels para p.

1. $p = 2$.

   uma transposiçõe e assim, $m \geq 2$ par, escreva

   $$\sigma = (ab)(cd)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m \in N.$$

   Considere $\gamma = (abc)$, temo que como N é normal se pode calcular

   $$\begin{aligned} \sigma^\gamma \sigma^{-1} &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma \varsigma_3^\gamma \cdots \varsigma_m^\gamma \cdot \sigma^{-1} \\ &= (ab)^\gamma (cd)^\gamma (ab)(cd) \\ &= (ac)(bd) \in N. \end{aligned}$$

   Agora, como $n \geq 5$, podemos tomar $k \notin \{a, b, c, d\}$, consideremos $\theta = (ack)$ e $\alpha = (ac)(bd)$ e temos que $(akc) = \alpha^\theta \alpha \in N$.

2. $p = 3$.

   Neste caso, cada ς_i é um 3-cíclo, se $m = 1$, acabou. Caso contrário, se $m \geq 2$, escreva $\sigma = (abc)(def)\varsigma_3 \cdots \varsigma_m$. Considere o 3-cíclo $\gamma = (bcd)$ e, como N é normal se cumpre que $\sigma^\gamma \sigma^{-1} \in N$ e é um 5-cíclo, este caso será resolvido a partir de na próxima situação.

3. $p > 3$.

   Consider $\varsigma_1 = (a_1 a_2 \cdots a_p)$: p-cíclo em N e $\gamma = (a_2 a_3 a_4)$ (observe que γ comuta com todos ς_i com $i \geq 2$). Temos que

$$\sigma^\gamma \sigma^{-1} = (a_2 a_3 a_5) \in N.$$

   Isto mostra o resultado.

Em conclução $N = A_n$. ■

3.2 S_n é completo com $n \geq 3$ e $n \neq 6$

A seguir, temos um lema técnico que será útil para verificarmos que, quando $n \geq 3$ e $n \neq 6$, todos os automorfismos de S_n são internos.

Lemma 3.2.1. Sejam $n \neq 6$ e $\tau \in S_n$ um elemento de ordem 2 que é produto de k transposições disjuntas. Então

1. O tamanho da classe de conjugação de τ é $\dfrac{n!}{2^k(n-2k)k!}$.
2. Se $k > 1$ então $|Cl(\tau)| \neq |Cl(\sigma)|$, para qualquer transposição σ de S_n.

Demonstração

Note que como $|S_n| = n!$ e $2 \mid n!$, pelo teorema de Cauchy, temos que existe $\tau \in S_n$ que cumpre que $o(\tau) = 2$. Assim, o grupo S_n possui um elemento de ordem 2 que é produto de k transposições disjuntas com $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$, isto porque nos podemos ver que como $o(\tau) = 2$, temos que se $\tau(i_l) = j_l$, então $\tau(j_l) = i_l$, pelo que você pode considerar a transposição $(i_l\, j_l)$. Por outro lado, note que se $i_l = j_l$ para algúm l, isto é que τ fixa i_l, pelo que nos vamos ignorar esse caso. Assim, note que como cada transposição $(i_l\, j_l)$ tem 2 elementos i_l e j_l que cumpren que $i_l \neq j_l$, como S_n são permutacões de n elementos, temos que $2k \leq n$, assim temos que $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$. Em geral, temos que τ se pode escrever como

$$\tau = (i_1\, j_1)(i_2 j_2) \cdots (i_k, j_k). \tag{3.1}$$

Agora, note que se τ não fixa $2k$ elementos, temos que τ fixa $n-2k$ elementos.

Assim, contaremos o tamanho da classe de conjugação de τ em termos de k e n. Analisando, novamente, que τ se escreve como produto de k transposições disjuntas (3.1), então que as posibilidades de escrever a primeira transposição são $\frac{n(n-1)}{2}$, isto ja que pra primeira transposição $(i_1\, j_1)$ temos que i_1 tem n posibilidades, como $j_1 \neq i_1$, temos que j_1 tem $n-1$ posibilidades e como a transposição $(i_1\, j_1) = (j_1, i_1)$ temos que as posibilidades de escrever a primeira transposição $(i_1\, j_1)$ são $\frac{n(n-1)}{2}$. Portanto, a próxima posibilidade de escolha para a segunda transposição, como restam $n-2$ elementos, então será $\frac{(n-2)(n-3)}{2}$.

Prosseguindo a contagem dessa forma, segue que a possibilidade total de escolhas será dada pelo produto das posibilidades, mas, dentre as possibilidades mencionadas acima, porém, como a ordem das transposições não importa, dividiremos o resultado desse produto por $k!$, já que esse é o número de vezes que as mesmas k transposições serão misturadas. Então teremos

$$\begin{aligned}
|Cl(\tau)| &= \frac{1}{k!} \cdot \prod_{i=1}^{k} \frac{(n-2(i-1))(n-(2i-1))}{2} \\
&= \frac{1}{k!} \cdot \prod_{i=0}^{k-1} \frac{(n-2i)(n-(2i+1))}{2} \\
&= \frac{1}{k!} \cdot \frac{(n)(n-1)\cdots(n-2k-2)(n-2k-1)}{2^k} \\
&= \frac{n!}{2^k k!(n-2k)!},
\end{aligned}$$

maneiras de escrever o produto de k transposições disjuntas. Assim concluimos o item **1.** afirmando que

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2^k k!(n-2k)!}. \tag{3.2}$$

Agora, para provarmos o item **2.**, note que se $k=1$, então temos que τ é uma tranposição $(i_1\, j_1)$ e de (3.2) temos que

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2(n-2)!}.$$

Assim, queremos garantir que para $k>1$, o tamanho da cclasse de τ é diferente da classe de

uma transposição, istó é

$$|Cl(\tau)| = \frac{n!}{2^k k!(n-2k)!} \neq \frac{n!}{2(n-2)!}.$$

Que é o mesmo que provar

$$2^k k!(n-2k)! \neq 2(n-2)!, \qquad \text{para todo } 1 < k \leq \frac{n}{2}. \tag{3.3}$$

- Se $k = 2$, é fácil ver que $(4)(2)(n-4) \neq 2(n-2)!$ se $n \geq 2$.
- Agora, suponha que $k \geq 3$, pelo que temos que τ pode sé produto de 3 transposições disjuntas, mas istó implica que $n \geq 6$.

  Primeiro, note que se $n = 6$ e $k = 3$ temos que

  $$2^3(3!)(6-2(3))! = (8)(9)(1) = 2(6-2)!$$

  o que mostra a necessidade de nossa hipótese $n \neq 6$.

  Agora, como $n > 6$ para provar (3.3) mostrarem que

  $$2^k k!(n-2k)! < 2(n-2)!$$

  que é o mesmo que provar

  $$2^{k-1} k!(n-2k)! < (n-2)!.$$

  Note que pela definição de número binomial temos que

  $$1 \leq \binom{n-k}{k} = \frac{(n-k)!}{k!(n-2k)!}.$$

  Daqui segue que $k!(n-2k)! \leq (n-k)!$ o que implica que

  $$2^{k-1} k!(n-2k)! \leq 2^{k-1}(n-k)!. \tag{3.4}$$

Agora, vamos ver que

$$2^{k-1} < (n-2)(n-3)\cdots(n-(k-1)) = \frac{(n-2)!}{(n-k)!}. \tag{3.5}$$

Para mostrar isto, observe que no lado direito dessa inequação temos $(n-2)-(n-k) = k-2$ fatores com o de menor valor sendo $(n-(k-1))$. Assim, lembre que como $1 < k \leq \frac{n}{2}$, temos que $k-1 \leq \frac{n-2}{2}$, logo temos que como $n > 6$ se cumpre que

$$n-(k-1) \geq n - \frac{n-2}{2} = \frac{n+2}{2} > 4.$$

Assim, temos que

$$2^{k-1} = \underbrace{2\cdots 2}_{k-1 \text{ vezes}} < \underbrace{4\cdots 4}_{k-2 \text{ vezes}} \leq (n-2)\cdots(n-(k-1)) = \frac{(n-2)!}{(n-k)!}.$$

Assim, usando na inequação (3.5) em na inequação (3.4) temos que

$$2^{k-1}k!(n-2k)! \leq 2^{k-1}(n-k)! \leq (n-2)!$$

o que prova na desigualdade (3.3) e conclui o item **2**.

■

Agora, estamos prontos para provar que S_n, para $n \neq 6$ e $n \geq 3$, é um grupo completo.

Proposition 3.2.2. Para $n \geq 3$, temos que $Z(S_n) = \{1\}$.

Demonstração

Considere $\alpha \in S_n$ com $\alpha \neq 1$. Vamos mostrar que sempre existe $\tau \in S_n$ tal que $\alpha\tau \neq \tau\alpha$ e desta forma, temos que $\alpha \neq Z(S_n)$. Observe que sendo $\alpha \neq 1$ existe $i \in \{1, \cdots, n\}$ tal que $\alpha(i) = j \neq i$. Como $n \geq 3$, existe $k \in \{1, \cdots, n\}$, onde $k \neq i$ e $k \neq j$. Assim, tome $\tau = (i\,k)$, depois temos que

$$\alpha\tau(i) = \alpha(k) \neq j \text{ e } \tau\alpha(i) = \tau(j) = j.$$

Portanto, $\alpha\tau \neq \tau\alpha$, pelo que podemos conclui que $Z(S_n) = \{1\}$ com $n \neq 3$. ■

Teorema 3.2.3. Se $n \neq 6$, então todo automorfismo de S_n é interno.

Demonstração

Seja $\sigma \in Aut(S_n)$ e ψ uma transposição em S_n. Note que um automorfismo leva conjuntos com m elementos em conjuntos com m elementos, ou seja, σ leva $\frac{n!}{2(n-2)!}$ elementos da classe de ψ em $\frac{n!}{2(n-2)!}$ elementos. Assim, pelo lema 3.2.1, temos que como na classe de $\sigma(\psi)$ tem $\frac{n!}{2(n-2)!}$ elementos, então a classe de $\sigma(\psi)$ só possui transposições, portanto podemos afirmar que σ leva transposições em transposições.

Tome $c_i = (i\, i+1)$ para $1 \leq i \leq n-1$ e seja $\psi_i = \sigma(c_i)$. Para $i = 1$ escreva $\psi_1 = (a_1\, a_2)$. Note que $c_1 = (1\, 2)$ e $c_2 = (2\, 3)$ não comutam, temos que ψ_1 e ψ_2 também não comutam, pois σ é um isomorfismo, istó e

$$\psi_1\psi_2 = \sigma(c_1)\sigma(c_2) = \sigma(c_1c_2) \neq \sigma(c_2c_1) = \sigma(c_2)\sigma(c_1) = \psi_2\psi_1.$$

Podemos escrever então $\psi_2 = (a_2\, a_3)$ com $a_3 \neq a_1$. Análogamente, ψ_3 não comuta com ψ_2, pois c_3 não comuta com c_2. Assim ψ_3 deve possuir a_2 ou a_3. No entanto, uma vez que c_1 comuta com c_3, ψ_1 comuta com ψ_3. Sendo assim, $\psi_3 = (a_3\, a_4)$ onde $a_4 \notin \{a_1, a_2, a_3\}$. Da mesma forma, ψ_4 possui interseção com ψ_3 e é disjunto de ψ_1 e ψ_2. Assim sendo $\psi_4 = (a_4\, a_5)$, com $a_5 \notin \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$. Continuando deste mdo podemoos escrever $\psi_i = (a_i\, a_{i+1})$ com $a_1, \cdots, a_n$ distintos e $a_i \in \{1, \cdots, n\}$.

Seja $\gamma \in S_n$ uma permutação tal que $\gamma(i) = a_i$. Então $(c_i)^\gamma = \gamma^{-1}c_i\gamma = \gamma^{-1}(i\, i+1)\gamma = (a_i\, a_{i+1}) = \psi_i$. Agora, se tomamos α o automorfismo interno induzido por γ, ou seja

$$\alpha : S_n \to S_n,$$
$$\eta \to \eta^\gamma,$$

nos podemos mostrar que $\alpha^{-1}\sigma$ fixa cada c_i. Isto é importante porque $\{c_i\}$ gera S_n (3.1.3). Se $\alpha^{-1}\sigma$ fixar todo c_i, teremos que $\alpha^{-1}\sigma$ fixará todo elemento de S_n, ou seja, $\alpha^{-1}\sigma = Id$.

Então, sabemos que $\psi_i = \sigma(c_i)$, logo temos que $\alpha^{-1}\sigma(c_1) = \alpha^{-1}(\psi_i)$, depois como

$$\begin{aligned} \alpha^{-1} : S_n &\to S_n, \\ \eta &\to \eta^{\gamma^{-1}}, \end{aligned}$$

e $\psi_i = c_i^{\gamma}$ temos que

$$\alpha^{-1}(\sigma(c_i)) = \alpha^{-1}(\psi_i) = \alpha^{-1}(c_i^{\gamma}) = (c_i^{\gamma})^{\gamma^{-1}} = c_i.$$

Assim $\alpha = \sigma$ é podemos conclui que todo automorfismo $\sigma \in Aut(S_n)$ é um automorfismo interno, i.é, $\sigma \in Inn(G)$, como queríamos provar. ■

Teorema 3.2.4. S_n é um grupo completo, para todo $n \geq 3$ e $n \neq 6$.

Demonstração

Usando a proposição 3.2.2 e o teorema 3.2.3 temos que $Z(S_n) = \{1\}$ e além mais $Aut(S_n) = Inn(S_n)$, logo se pode conclui que S_n é um grupo completo. ■

3.3 S_6 não é completo

Na seguinte parte, nos vamos provar que para $n = 6$, não temos $S_6 \cong Aut(S_6)$. Ou seja, S_6 tem um automorfismoque não é interno. Para demostrar isso, é necessário discutir certascaracterísticas do grupo S_6 e do seu grupo de automorfismos, $Aut(S_6)$.

Nos vamos provar que S_6 possui um subgrupo, que denotaremos de K que cumpre que $|K| = 120$ e que K não contém transposições. Para começarmos provar a existência do subgrupo K de S_6 a seguinte definição deve ser levada em consideração.

Definição 3.3.1 (Subgrupo transitivo)**.** Dado um conjunto X, dizemos que um subgrupo S de $Sim(X)$ é um **subgrupo transitivo** se dados $x, y \in X$, temos que existe $\sigma \in S$ tal que $\sigma(x) = y$.

Lemma 3.3.2. Seja G um grupo e $H \leq G$. Definamos $X = \{xH : x \in G\}$ (o conjunto das classes laterais a esquerda de H) e φ da seguinte maneira

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Sim(X), \\ g &\to \varphi_g : X \to X, \\ &\quad xH \to gxH. \end{aligned}$$

Então $\operatorname{Im}\varphi$ é um subgrupo transitivo de $Sim(X)$.

Demonstração

Seja $x, y \in X$, isto é que $x = aH$ e $y = bH$ com $a, b \in G$. Agora, nos vamos tirar $g \in G$ com $g = ba^{-1}$, note que se definimos $\sigma = \varphi_g \in \operatorname{Im}\varphi$, assim temos que

$$\sigma(x) = \varphi_g(aH) = gaH = ba^{-1}aH = bH = y.$$

Logo como $x, y \in X$ são arbitrarios e φ é um homomorfismo, temos que $\operatorname{Im}\varphi$ é um subgrupo transitivo de $Sim(X)$. ■

Lemma 3.3.3. Existe um subgrupo transitivo K de S_6 com ordem 120 que não contém transposições.

Demonstração

Considere $G = S_5$, $P \in Syl_5(S_5)$ e $H = N_{S_5}(P) = \{x \in G : xP = Px\}$. Então, como $|S_5| = 5!$, nos temos que pelos teoremas de Silow $n_5 \mid (2 * 3 * 4) = 24$ logo temos que $n_5 \in \{1, 2, 3, 6, 8, 12, 24\}$, mas como $n_5 \equiv 1 (mod\, 5)$, temos que $n_5 \notin \{2, 3, 8, 12, 24\}$, pelo que só temos que $n_5 \in \{1, 6\}$.

Más note que $|\langle(12345)\rangle| = 5$, $|\langle(12)(12345)(12)\rangle| = |\langle(13452)\rangle| = 5$ e $\langle(12345)\rangle \neq \langle(13452)\rangle$, pelo que podemos afirmar que $n_5 = 6$.

Assim, temos que $[G : H] = [S_5 : N_{S_5}(P)] = 6$.

Portanto, definindo $X = \{aH : a \in G\}$ temos que $|X| = 6$ e $|Sim(X)| = 6!$, pelo que sabemos

que $Sim(X) \cong S_6$. Deste modo consideremos

$$\begin{aligned} \varphi : S_5 &\to Sim(X), \\ g &\to \varphi_g : X \to X, \\ &\quad xH \to gxH. \end{aligned}$$

Note que φ é homomorfismo injetor, ja que

$$\ker \varphi = \{g \in S_5 : \varphi_g = Id\} = \{g \in S_5 : aH = gaH, \text{ para todo } a \in S_5\}.$$

Mas note que se $a = 1$, então temos que $H = gH$, pelo que podemos afirmar que $g \in H$, assim $\ker \varphi \leq H$ e portanto temos que $[S_5 : H] \leq [S_5 : \ker \varphi]$.

Logo, como temos que pelo teorema de isomorfismos $\ker \varphi \lhd S_5$, então como A_5 é simple, temos que $\ker \varphi = \{1\}$ ou $\ker \varphi = A_5$. Mas note que como $[S_5 : H] = 6 \leq [S_5 : \ker \varphi]$, então a única possibilidade é que $\ker \varphi = \{1\}$, pelo contrario se $\ker \varphi = A_5$, temos que $[S_5 : A_5] = 2 \ngeq 6$. Portanto, temos que φ é um homomorfismo injetor.

Assim, definamos $K = \operatorname{Im} \varphi$ e como φ é injetivo, temos que $|K| = |\operatorname{Im} \varphi| = |S_5| = 120$ e pelo teorema de isomorfismos temos que $K \leq S_6$ que pelo lema 3.3.2 temos que K é um subgrupo transitivo de S_6.

Agora, nos vamos provar que K não possui transposições.

Raciocinemos pela contradição.

Note que como φ é um isomorfismo de S_5 sobre $\operatorname{Im} \varphi = K$, então temos que existe $\alpha \in K$ tal que $o(\alpha) = 5$. Sem perdida de generalidade suponha $\alpha = (12345)$. Então, se nos assumimos que existe $(ij) \in K$ transposição. Como K é transitivo e $j, 6 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, então existe $\beta \in K$ tal que $\beta(6) = j$ e $\beta^{-1}(j) = 6$. Logo note que $\beta(ij)\beta^{-1} \in K$, ou seja, $(\beta(i)\, 6)$ com $\beta(i) \neq 6$, ja que $i \neq j$. Conjugando $(\beta(i)\, 6)$ por todas las potencias de α teremos que $(16), (26), (36), (46), (56) \in K$, logo temos que como $\langle (16), (26), (36), (46), (56) \rangle = S_6$, então $K = S_6$, absurdo, pois $S_5 \cong K$.

Assim, temos que existe $K \leq S_6$ com ordem 120 e que não possui transposições. ■

Teorema 3.3.4. Existe um automorfismo de S_6 que não é interno.

Demonstração

De acordo com o lema 3.3.3, temos que existe $K \leq S_6$ com ordem 120 e que não possui transposições. Note que como $|K| = 120$ e $|S_6| = 6 * 120$, então temos que $[S_6 : K] = 6$, assim, considere $X = \{\alpha_1 K, \alpha_2 K, \alpha_3 K, \alpha_4 K, \alpha_5 K, \alpha_6 K\}$ as classes a esquerda de K. Então, suponha

$$\begin{aligned} \sigma : S_6 &\to Sim(X), \\ g &\to \sigma_g : X \to X, \\ &\qquad \alpha_i K \to g\alpha_i K. \end{aligned}$$

Utilizando um argumento semelhante ao da demonstração do lema 3.3.3, mostramos que σ é injetiva. Além disso, note que como $|Sim(X)| = |S_6|$, então σ é sobrejetiva. Portanto, $\sigma \in Aut(S_6)$.

Raciocinando pela contradição, suponha que $\sigma \in Inn(S_6)$. Sendo assim, σ é uma conjugação e preserva estructura cíclica dos elementos de S_6. Portanto, temos que $\sigma[(12)] = \sigma_{(12)}$ é uma transposição, entao temos que

$$\begin{aligned} \sigma : S_6 &\to S_6, \\ (12) &\to \sigma_(12) : X \to X, \\ &\qquad \alpha_i K \to (12)\alpha_i K. \end{aligned}$$

para cada $1 \leq i \leq 6$. Depois, como $\sigma_{(12)}$ é uma transposição, então $(12) \in \alpha_j K$ para algúm $1 \leq j \leq 6$, isto é que $(12)\alpha_j K = \alpha_j K$, logo podemos conclui que $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j \in K$, mas note que como $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j$ é uma conjugação de a transposição (12), entao $\alpha_j^{-1}(12)\alpha_j$ é uma tranposição em K, contradição, pois K não possui transposições. Assim, temos que $\sigma \notin Inn(S_6)$, i.é, que S_6 possui um automorfismo que não é interno. ■

Corolário 3.3.5 (S_6 não é completo)**.** S_6 não é um grupo completo.

Demonstração

Note que pelo teorema 3.3.4 temos que S_6 possui um autormorfismo que não e interno, logo $Inn(S_6) \neq Aut(S_6)$ o que nos permite conclui que S_6 não é completo. ■

Capítulo 4

Anéis

4.1 Definição

Definição 4.1.1 (Anel)**.** Seja $(A, +)$ um grupo abeliano com uma operação adicional (multiplicação)

$$A \times A \to A,$$
$$(a, b) \to ab.$$

Tal que a multiplicação é distributiva com relação a soma, isto é que para todo $a, b, c \in A$ temos que se cumpre que

- $c(a + b) = ca + cb$.
- $(a + b)c = ac + bc$.

Então, chamamos $(A, +, \cdot)$ um **anel**.

Se a multiplicação é uma operação associativa, dezimos que o anel $(A, +, \cdot)$ é um **anel associativo**.

Note: Vamos a trabalhar com este caso, então consideramos anel sempre sendo associativo.

Observação 4.1.2 (Aneis não associativo)**.**

- $(\mathbb{R}^3, +, \times)$ com $\times$ o produto vetorial.
- $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ com $A \cdot B = [A, B] = AB - BA$.

Exemplo 4.1.3.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ usuais. Neste caso como a operação multiplicação é comutativa, dezimos que é um **anel multilplicativo**. Da mesma maneira, se existe um elemento neutro multiplicativo, dezimos que é um **anel unitário** ou **anel com unidade**.
- $(m\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é um anel comutativo não unitário.
- $(M_n(A), +, \cdot)$ anel não comutativo. Unitário se A tem unidade com $n \geq 2$.
- $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ é um anel comutativo unitário finito.

Definição 4.1.4 (Anel de divisão)**.** Se A é um anel unitário de modo que a multiplicação admita inverso para elementos não nulos, ou seja, para qualquer $a \in A$ com $a \neq 0$, existe $b \in A$ tal que $ab = ba = 1$, então dizemos que A é um anel de divisão.

Exemplo 4.1.5.

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é anel de divisão mais do que isto, é comutativo.

  Se A é um anel de divisão comutativo, então chamamos A um **corpo**.

- Anel dos quaternios.

  Considere o conjunto de matrizes 2×2 com entradas en $\mathbb{C}$ da forma

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 \\ -\widetilde{\xi_2} & \widetilde{\xi_1} \end{pmatrix} : \xi_1, \xi_2 \in \mathbb{C} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{C}).$$

  Note que

$$\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix} = a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbb{1}} + b \underbrace{\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}}_{\mathbb{I}} + c \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbb{J}} + d \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbb{K}}.$$

  Logo $spam\{\mathbb{1}, \mathbb{I}, \mathbb{J}, \mathbb{K}\} = \mathbb{H}$.

Note que as matrizes $\mathbb{1}, \mathbb{I}, \mathbb{J}$ e $\mathbb{K}$ sáo tais que

- $\mathbb{I}^2 = \mathbb{J}^2 = \mathbb{K}^2 = -\mathbb{1}$.
- $\mathbb{I}\mathbb{J} = -\mathbb{J}\mathbb{I} = \mathbb{K}$.
- $\mathbb{J}\mathbb{K} = -\mathbb{K}\mathbb{J} = -\mathbb{I}$.
- $\mathbb{K}\mathbb{I} = -\mathbb{I}\mathbb{K} = -\mathbb{J}$.

Logo temos que $\langle \mathbb{I}, \mathbb{J} \rangle \cong \mathbb{Q}_8$ quaternions.

Asim, o conjunto $\mathbb{H}$ com operações usuais de matricez é um anel não comutativo e tal que para todo elemento $M \in \mathbb{H}$, $M \neq 0$, existe $M^{-1} \in \mathbb{H}$. $\mathbb{H}$ é anel de divisão.

Referências Bibliográficas

Michael Artin. *Algebra*. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1991. ISBN 0-13-004763-5.

David S. Dummit and Richard M. Foote. *Abstract algebra*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, third edition, 2004. ISBN 0-471-43334-9.

I. N. Herstein. *Topics in algebra*. Xerox College Publishing, Lexington, Mass.-Toronto, Ont., second edition, 1975.

Thomas W. Hungerford. *Algebra*, volume 73 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1980. ISBN 0-387-90518-9. Reprint of the 1974 original.

I. Martin Isaacs. *Algebra: a graduate course*, volume 100 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009. ISBN 978-0-8218-4799-2. doi: 10.1090/gsm/100. URL `https://doi.org/10.1090/gsm/100`. Reprint of the 1994 original.

Serge Lang. *Algebra*, volume 211 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, third edition, 2002. ISBN 0-387-95385-X. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0. URL `https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0`.

Falko Lorenz. *Algebra. Vol. 1*. Universitext. Springer, New York, german edition, 2006. ISBN 978-0387-28930-4; 0-387-28930-5. Fields and Galois theory, With the collaboration of Levy.

Joseph J. Rotman. *Advanced modern algebra*, volume 114 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, second edition, 2010. ISBN 978-0-8218-4741-1. doi: 10.1090/gsm/114. URL `https://doi.org/10.1090/gsm/114`.

Érika Helena Assis. Torre de automorfismos e grupos completos. Dissertação (mestrado em matemática), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.