Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 2

14 de abril de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-3:

Sejam $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciáveis. Defina $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ pondo $F(x, y) = (f(x) \cdot h(y), g(y))$. Suponha que f e g são difeomorfismos de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$. Mostre que F é um difeomorfismo se, somente se $0 \neq h(\mathbb{R})$.

Solução:

Necessario: Note que como F é um difeomorfismo, então sabemos que $JF(x, y)$ é invertivel para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, logo

$$JF(x, y) = \begin{pmatrix} f'(x)h(y) & f(x)h'(y) \\ 0 & g'(y) \end{pmatrix}.$$

Logo $\det(JF(x, y)) = f'(x)g'(y)h(y) \neq 0$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, $h(y) \neq 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$, i.é, $0 \notin h(\mathbb{R})$.
Suficiente: Veamos que F é um difeomorfismo.

- Injetividade.
  Suponha $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ taes que $F(x_1, y_1) = F(x_2, y_2)$, isto implica que $g(y_1) = g(y_2)$ e como g é um difeomorfismo, g é injetiva, portanto podemos concluir que $y_1 = y_2$. Por outra parte, temos que $f(x_1)h(y_1) = f(x_2)h(y_1)$, logo como $h(y_1) \neq 0$ (ja que $0 \notin h(\mathbb{R})$) podemos dividir na igualdade por $h(y_1)$, o que implica que $f(x_1) = f(x_2)$ e como f é difeomorfismo podemos concluir igualmente que $x_1 = x_2$. Portanto, F e injetiva.

- Sobrejetividade.
  Seja $u, v \in \mathbb{R}^2$, nos queremos resolver $F(x, y) = (u, v)$.
  Isto é, por uma parte $g(y) = v$, logo como g é difeomorfismo, g é invertivel, portanto $y = g^{-1}(v)$.
  Por outra parte, note que temos que $f(x)h(g^{-1}(v)) = u$, logo fazendo algums cálculos e usando que f é difeomorfismo, portanto invertivel, temos que $x = f^{-1}\left(\frac{u}{h(g^{-1}(v))}\right)$ a qual está bem definida, ja que $0 \notin h(\mathbb{R})$.

- Inversa diferenciável.
  Note que, pelo anterior temos

  $$F^{-1}(x, y) = \left(\left(f^{-1} \circ \frac{x}{\cdot} \circ h \circ g^{-1}\right)(y), g^{-1}(y)\right).$$

  Logo como F^{-1} é composta de funções diferenciáveis, temos que F^{-1} é diferenciável.

Assim, podemos concluir que F é difeomorfismo.

Exercício Seção 1-4:

Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ contínua. A função $g : U \to \mathbb{R}$ é dada pela expressão

$$g(x) = \int_0^{f(x)} e^{-t^2}\, dt.$$

Provar que se g é de classe C^1, então f também é de classe C^1.

Solução:

Defina $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\phi(s) = \int_0^s e^{-t^2}\, dt$, logo note que pelo teorema fundamental del cálculo temos que $\phi'(s) = e^{-s^2}$, portanto $\phi \in C^1$. Além mais, temos que $\phi'(s) > 0$ para todo $s \in \mathbb{R}$, pelo que sabemos que ϕ é injetiva, logo pelo teorema da função inversa temos que ϕ é um difeomorfismo local para todo $s \in \mathbb{R}$, mas como ϕ é injetiva, então ϕ é um C^1-difeomorfismo sobre sua imágem. Portanto, temos que $g(x) = (\phi \circ f)(x)$, implica que $f(x) = (\phi^{-1} \circ g)(x)$ e como $\phi^{-1}, g \in C^1$ temos que f é C^1.

Exercício Seção 1-5:

Sejam $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ um isomorfismo linear e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma função de classe C^1 satisfazendo a seguinte propiedade: existe $M > 0$ tal que para todo $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|g(x)\| \leq M \|x\|^2 .$$

Considere a função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $f(x) = L(x) + g(x)$. Prove que existem abertos U_1 e U_2 tais que $0 \in U_1 \cap U_2$ e $f : U_1 \to U_2$ é um homeomorfismo.

Solução:

Note que por um lado, temos que $L'(x) \cdot v = Lv$, ja que L é um isomorfismo linear.
Por outro lado temos que

$$\|g(0)\| \leq M \|0\| = 0.$$

Logo temos que $g(0) = 0$. Agora, usando isto e la hipótesis sobre g temos que

$$\|g'(0)\| = \left\| \lim_{t \to 0} \frac{g(0 + tv) - g(0)}{tv} \right\| \leq \lim_{t \to 0} \left\| \frac{g(tv)}{tv} \right\| \leq \lim_{t \to 0} M \|tv\| = 0.$$

Logo $g'(0) = 0$.
Portanto, temos que $f'(0) \cdot v = Lv$ e como L é um isomorfismo linear, sabemos que $f'(0)$ é invertivel. Assim, pelo teorema da função inversa temos que existem abertos $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ taes que $0 \in U_1$ e $f(0) = L(0) + g(0) = 0 \in U_2$, isto é, que $0 \in U_1 \cap U_2$ taes que $f : U_1 \to U_2$ é um C^1-difeomorfismo (ja que f é soma de funções C^1). Em particular, $f : U_1 \to U_2$ é um homeomorfismo.

Exercício Seção 1-7:

Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tal que para $x, v \in \mathbb{R}^m$ quaisquer tem-se $\langle f'(x) \cdot v, v\rangle \geq \alpha \left|v^2\right|$, onde $\alpha > 0$ é uma constante. Prove que $|f(x) - f(y)| \geq \alpha |x - y|$ para $x, y \in \mathbb{R}^m$ arbitrários. Conclua que $f(\mathbb{R}^m)$ é fechado, e dái, que f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre si mesmo. (A hipótese "$f \in C^1$"pode ser substituída por "f diferenciável".)

Solução:

Note que pelo teorema fundamental del cálculo para caminhos temos que

$$f(x) - f(y) = \int_0^1 f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\, dt. \tag{1}$$

Logo note que pela propriedade da hipótese temos que

$$\alpha |x - y|^2 \leq \langle x - y, f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\rangle .$$

Agora, integrando, usando na linearidade do a integreal e o produto interno, a equação (1) e a desigualdade de Cauchy, temos que

$$\begin{aligned}
\alpha |x - y|^2 &= \int_0^1 \alpha |x - y|^2 \, dt \\
&\leq \int_0^1 \langle f'(y + t(xy)) \cdot (x - y), x - y\rangle \, dt \\
&\leq \left\langle \int_0^1 f'(y + t(x - y)) \cdot (x - y)\, dt, x - y \right\rangle \\
&\leq \langle f(x) - f(y), x - y\rangle \\
&\leq |f(x) - f(y)| \, |x - y| .
\end{aligned}$$

Portanto, $\alpha |x - y| \leq |f(x) - f(y)|$, além mais, note que como f é de classe C^1, nos podemos pegar $x, y \in \mathbb{R}^m$ arbitrários.
Note que, isto implica que f é injetiva, ja que si suponemos $f(x) = f(y)$, temos que $\alpha |x - y| \leq 0$, logo $x = y$.
Por outro lado, note que $f'(x) \cdot v = 0$ se, somente se $v = 0$, ja que temos que $\alpha |v|^2 \leq \langle f'(x) \cdot v, v\rangle = 0$ se, somente se $v = 0$.
Logo, pelo teorema da função inversa e que f é injetiva, temos que f é um difeomorfismo na sua imagem $f(\mathbb{R}^m)$, além mais, f é uma função aberta.
Agora, para ver que $f(\mathbb{R}^m)$ é fechado, vamos pegar uma sequencia $\{y_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+} \subseteq f(\mathbb{R}^m)$ de Cauchy, note que como f é injetiva, temos uma sequencia $\{x_k\}_{i\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $f(x_k) = y_k$ para todo $k \in \mathbb{Z}^+$. Logo como $|x_k - x_n| \leq \frac{1}{\alpha} |f(x_k) - f(x_n)|$, nos podemos conclui que $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}^+}$ é de Cauchy. Depois como $\mathbb{R}^m$ é um espaço completo, temos que $x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x$ com $x \in \mathbb{R}^m$.
Assim, como f é contínua, temos que $f(x_k) = y_k \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x)$ com $f(x) \in f(\mathbb{R}^m)$. Pelo que

podemos conclui que $f(\mathbb{R}^m)$ é um conjunto fechado.
Então, note que como f é uma função aberta, temos que $f(\mathbb{R}^m) \subseteq \mathbb{R}^m$ é aberto, pelo por lo anterior temos que $f(\mathbb{R}^m) \subseteq \mathbb{R}^m$ é fechado, logo como $\mathbb{R}^m$ é conexo, então $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$, pelo que se pode conclui que f é sobrejetiva e por ende f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ sobre se mesmo.
Note que só é necessario que f seja diferenciável.