

Diszkrét matematika I. Előadás

4. előadás

Kombinatorika

Kombinatorika fő célja:

- véges halmazok elemeinek elrendezése;
- elrendezések különböző lehetőségeinek megszámlálása.

Példák:

- Nyolc ember közül van legalább kettő, aki a hét ugyanazon napján született.
- Minimálisan hány ember esetén lesz legalább két embernek ugyanazon a napon a születésnapja?
- Mennyi a lehetséges rendszámok / telefonszámok / IP címek száma?
- Legalább hány szelvényt kell kitölteni, hogy biztosan nyerjünk a lottón / totón?

Összefoglaló

Ismétlés nélküli permutáció $n!$, n elem lehetséges sorrendje (sorrend számít, egy elem (pontosan) egyszer).

Ismétléses permutáció $\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$, $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$
elem lehetséges sorrendje, ahol az i típusú elemet k_i -szer választjuk (sorrend számít, egy elem többször).

Ismétlés nélküli variáció $n!/(n-k)!$, n elemből k -t választunk (sorrend számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses variáció n^k , n elemből k -szor választunk (sorrend számít, egy elem többször is).

Ismétlés nélküli kombináció $\binom{n}{k}$, n elemből k -t választunk (sorrend nem számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses kombináció $\binom{n+k-1}{k}$, n elemből k -szor választunk (sorrend nem számít, egy elem többször is).

Permutáció

Definíció (permutáció)

Egy A véges halmaz egy **permutációja** egy olyan, A elemeiből álló sorozat, amely A minden elemét *pontosan egyszer* tartalmazza. (Úgy is mondhatjuk, hogy A elemeinek egy lehetséges sorrendje.)

Ekvivalens definíció: Az A halmaz egy permutációja egy $A \rightarrow A$ bijekció.

Tétel (Permutációk száma)

Egy n elemű halmaz permutációinak száma:

$$P_n = n! = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

($n!$ kiolvasva: **n faktoriális**).

Megjegyzés: definíció szerint: $0! = 1$.

Bizonyítás

Az n elemből az első helyre n -féleképpen választhatunk, a második helyre $n-1$ -féleképpen választhatunk, ... Így az összes lehetőségek száma $n(n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$.



Permutáció

Példa

- ① Egy lóversenyen 70 induló vett részt. Hányféle különböző sorrendben érhetnek célba? (Feltételezzük, hogy nincs döntetlen és mindenki célbaér.)
- ② Reggelire a
2 különböző szendvicset $2! = 2 \cdot 1 = 2$ -féle sorrendben lehet megenni.
3 különböző szendvicset $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ -féle sorrendben lehet megenni.
4 különböző szendvicset $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ -féle sorrendben lehet megenni.
- ③ A 200 fős évfolyam $200! = 200 \cdot 199 \cdot 198 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \approx 7,89 \cdot 10^{374}$ -féle sorrendben írhatja alá a jelenléti ívet.

Ismétléses permutáció

Példa

Egy vizsgán 5 hallgató vett részt, 2 darab 4-es, 3 darab 5-ös született. Hány sorrendben írhatjuk le az eredményeket, ha az azonos jegyeket nem különböztetjük meg egymástól?

Megoldás

Ha figyelembe vesszük a hallgatókat is: $(2 + 3)! = 5!$ lehetséges sorrend van. Ha a hallgatókat nem tüntetjük fel, egy lehetséges sorrendet többször is figyelembe vettünk:

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	...
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Az 5-ösöket $3! = 6$ -féleképpen cserélhetjük, ennyiszor vettünk figyelembe minden sorrendet.

Hasonlóan a 4-eseket $2! = 2$ -féleképpen cserélhetjük, ennyiszor vettünk figyelembe minden sorrendet.

Összes lehetőség: $\frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{120}{2 \cdot 6} = 10.$

Ismétléses permutáció

Tétel (Ismétléses permutációk száma)

k_1 darab első típusú, k_2 második típusú, \dots , k_m m -edik típusú elem lehetséges sorrendjét az elemek egy **ismétléses permutációjának** nevezzük, és ezek száma $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$ esetén

$${}_n P^{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}.$$

Bizonyítás

Ha minden elem között különbséget teszünk: $n!$ lehetséges sorrend létezik.

Ha azonban az azonos típusú elemek között nem teszünk különbséget, akkor ebben a számításban többször számoltuk az egyes sorrendeket.

Mivel minden $1 \leq i \leq m$ -re, adott k_i db. pozíción $k_i!$ különböző sorrendben helyezhetjük el az i -edik típusú elemeket, ezért minden sorrendet $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ -szor számoltunk. Így a különböző sorrendek száma: $n! / (k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!)$. □

Variáció

Példa

- 1 Egy lóversenyen 70 induló vesz részt. Hányféleképpen alakulhat az első 5 helyezés? (Feltételezzük, hogy nincs döntetlen.)
 $70 \cdot 69 \cdot 68 \cdot 67 \cdot 66$
- 2 Az egyetemen 10 tárgyunk van, ezek közül 3-at szeretnénk hétfőre tenni. Hányféleképpen tehetjük meg ezt?

Megoldás

Hétfőn az első óránk 10-féle lehet. A második 9-féle, a harmadik 8-féle lehet.

Így összesen $10 \cdot 9 \cdot 8$ -féleképpen tehetjük meg.

Definíció (variáció)

Legyen A egy halmaz és $k \in \mathbb{N}^+$. Az A elemiből képezhető k hosszúságú sorozatokat, melyek A bármely elemét *legfeljebb egyszer* tartalmazzák, az A halmaz k -ad osztályú **variációinak** nevezzük.

Variáció

Tétel (Variációk száma)

Legyen $k \in \mathbb{N}^+$. Egy n elemű halmaz k -ad osztályú variációinak száma:

$$V_n^k = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = n!/(n-k)!$$

ha $k \leq n$ és 0 egyébként.

Bizonyítás

Tfh. $k \leq n$. A sorozat első elemét n -féleképpen választhatjuk ki, ezután a második elemét $(n-1)$ -féleképpen választhatjuk (nem lehet ismétlődés), \dots , a k -adik elemet $n-k+1$ -féleképpen választhatjuk ki. Így a k -ad osztályú variációk száma: $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$.
Ha $k > n$, akkor nyilván nem lehet k hosszúságú sorozatot képezni n különböző elem segítségével úgy, hogy ne legyen ismétlődés.



Ismétléses variáció

Példa

Az 1, 2, 3 számjegyekből hány kétjegyű szám képezhető?

Megoldás

Az első helyiértékre 3-féleképpen írhatunk számjegyet:

1
2
3

A második helyiértékre szintén 3-féleképpen írhatunk számjegyet:

11	21	31
12	22	32
13	23	33

Összesen:

$$3 \cdot 3 = 9$$

Ismétléses variáció

Definíció (ismétléses variáció)

Legyen A egy halmaz és $k \in \mathbb{N}^+$. Egy, az A elemiből készíthető k hosszúságú sorozatokat az A halmaz k -ad osztályú **ismétléses variációinak** nevezzük.

Tétel (Ismétléses variációk száma)

Legyen $k \in \mathbb{N}^+$. Egy n elemű k -ad osztályú *ismétléses variációinak száma:*

$${}_n^k V = n^k.$$

Bizonyítás

A sorozat első elemét n -féleképpen választhatjuk, a második elemét n -féleképpen választhatjuk, ...



Ismétléses variáció

Példák

- 1 Egy totószelvényt ($13 + 1$ helyre $1, 2$ vagy X kerülhet)
 $3^{14} = 4\,782\,969$ -féleképpen lehet kitölteni.
- 2 Hány 5 hosszúságú $0 - 1$ sorozat létezik?
- 3 Hány n hosszúságú $0 - 1$ sorozat létezik?
- 4 Hány 12 jegyű szám készíthető csak az $1 - 9$ számjegyek felhasználásával? (Nem kell minden jegyet felhasználni, és egy jegy többször is felhasználható.)

Kombináció

Definíció (kombináció)

Legyen $k \in \mathbb{N}$. Az A halmaz k elemű részhalmazait az A halmaz **k -ad osztályú kombinációinak** nevezzük.

Tétel (Kombinációk száma)

Legyen $k \in \mathbb{N}$. Egy n elemű halmaz k -ad osztályú kombinációinak száma

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

ha $k \leq n$ (és 0 egyébként).

Bizonyítás

Először válasszunk a halmaz elemei közül k darabot a sorrendet figyelembevéve.

Ezt $n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ -féleképpen tehetjük meg.

Ha a sorrendtől eltekintünk, akkor az előző leszámolásnál minden k elemű részhalmaz pontosan $k!$ -szor szerepel. Ezzel leosztva kapjuk a k elemű részhalmazok számát. □

Kombináció

Példák

- ① Egy lottószelvény (90 számból 5) lehetséges kitöltéseinek száma:

$$\binom{90}{5} = \frac{90!}{5! \cdot 85!} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 43\,949\,268.$$

- ② Hány olyan, 20 hosszúságú 0 – 1 sorozat van, amelyik pontosan 7 db 1-est tartalmaz?

A 20 pozíció közül $\binom{20}{7}$ -féleképpen választhatjuk ki az a 7 pozíciót, ahova az 1-esek kerülnek.

Ismétléses kombináció

Definíció (ismétléses kombináció)

Legyen $k \in \mathbb{N}$. Egy A halmazból k -szor választva, ismétléseket is megengedve, de a sorrendet figyelmen kívül hagyva, az A halmaz k -ad osztályú ismétléses kombinációit kapjuk.

Megjegyzés: Az ismétléses kombinációknál tehát csak az számít, hogy az A halmaz egyes elemeit hányszor választottuk (sorrend nem számít).

Tétel (Ismétléses kombinációk száma)

Egy n elemű halmaz k -ad osztályú ismétléses kombinációinak száma:

$${}_nC_n^k = \binom{n+k-1}{k}.$$

Ismétléses kombináció

Tétel (Ismétléses kombinációk száma)

Egy n elemű halmaz k -ad osztályú ismétléses kombinációinak száma:

$${}^i C_n^k = \binom{n+k-1}{k}.$$

Bizonyítás

Legyen $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Ekkor minden egyes lehetőségnek megfeleltetünk egy $0-1$ sorozatot:

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{{a_1}\text{-ek száma}}, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{{a_2}\text{-k száma}}, 0, \dots, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{{a_n}\text{-ek száma}}.$$

Ekkor a sorozatban k darab 1 -es van (választott elemek száma), $n-1$ darab 0 van (szeparátorok száma). Összesen $n-1+k$ pozíció, ezekből k -t választunk. Ilyen sorozat $\binom{n+k-1}{k}$ darab van. □

Ismétléses kombináció

Példák

- ① 5-féle sütemény van a cukrászdában, 8 darabot szeretnénk vásárolni. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?

Itt $n = 5$, $k = 8$:

$$\binom{5 + 8 - 1}{8} = \binom{12}{8} = \frac{12!}{8! \cdot 4!} = 495.$$

- ② Hányféleképpen dobhatunk 5 dobókockával, ha csak a dobott számok számítanak, az nem, hogy melyik kockán dobtuk az egyes számokat?

Az $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ halmazból 5-ször választunk (sorrend nem számít, egy elemet többször is választhatunk). Ismétléses kombináció $n = 6$, $k = 5$ választással:

$$\binom{6 + 5 - 1}{5} = \binom{10}{5} = \frac{10!}{5! \cdot 5!} = 252.$$

Összefoglaló

Ismétlés nélküli permutáció $n!$, n elem lehetséges sorrendje (sorrend számít, egy elem (pontosan) egyszer).

Ismétléses permutáció $\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$, $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$ elem lehetséges sorrendje, ahol az i típusú elemet k_i -szer választjuk (sorrend számít, egy elem többször).

Ismétlés nélküli variáció $n!/(n-k)!$, n elemből k -t választunk (sorrend számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses variáció n^k , n elemből k -szor választunk (sorrend számít, egy elem többször is).

Ismétlés nélküli kombináció $\binom{n}{k}$, n elemből k -t választunk (sorrend nem számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses kombináció $\binom{n+k-1}{k}$, n elemből k -szor választunk (sorrend nem számít, egy elem többször is).

Binomiális tétel

Tétel (Binomiális tétel)

Adott $x, y \in \mathbb{R}$ és $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Bizonyítás

$$(x + y)^n = (x + y) \cdot (x + y) \cdot \dots \cdot (x + y)$$

Ha elvégezzük a beszorzást, akkor $x^k y^{n-k}$ alakú tagokat kapunk, és ezen tagot annyiszor kapjuk meg, ahányszor az n tényezőből k darab x -et választunk. □

Definíció (Binomiális együtthatók)

Az $\binom{n}{k}$ alakú számokat $(n, k \in \mathbb{N}, k \leq n)$ **binomiális együtthatónak** nevezzük.

Binomiális együtthatók

Tétel (A binomiális együtthatók néhány tulajdonsága)

Tetszőleges $n, k \in \mathbb{N}$, $k \leq n$ esetén:

- ①
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$
- ②
$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, \text{ ha } k \geq 1, n \geq k+1.$$

Bizonyítás

$\binom{n}{k}$ azon n hosszú $0-1$ sorozatok száma, melyben k darab 1 -es van.

- ① Az n hosszú $0-1$ sorozatok közül azok száma, melyek k darab 1 -est tartalmaznak megegyezik azok számával, melyek $n-k$ darab 1 -est tartalmaznak.
- ② Azon n hosszú, k darab 1 -est tartalmazó $0-1$ sorozatok száma, melynek első tagja 1 : $\binom{n-1}{k-1}$.
Azon n hosszú, k darab 1 -est tartalmazó $0-1$ sorozatok száma, melynek első tagja 0 : $\binom{n-1}{k}$.

Binomiális együtthatók és a Pascal-háromszög

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}; \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

n	$\binom{n}{k}$	$(x + y)^n$
0	1	1
1	1 1	$x + y$
2	1 2 1	$x^2 + 2xy + y^2$
3	1 3 3 1	$x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
4	1 4 6 4 1	$x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$
5	1 5 10 10 5 1	$x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

Polinomiális tétel

Példa

Mennyi lesz?

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz. \quad (x + y + z)^3 = \dots$$

Tétel (Polinomiális tétel)

Tetszőleges $r, n \in \mathbb{N}$ esetén:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{i_1 + i_2 + \dots + i_r = n} \frac{n!}{i_1! \cdot i_2! \cdot \dots \cdot i_r!} x_1^{i_1} \cdot x_2^{i_2} \cdot \dots \cdot x_r^{i_r}.$$

Bizonyítás

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n =$$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)(x_1 + x_2 + \dots + x_r) \cdots (x_1 + x_2 + \dots + x_r).$$

Az $x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_r^{i_r}$ együtthatója:

$$\begin{aligned} & \binom{n}{i_1} \binom{n-i_1}{i_2} \binom{n-i_1-i_2}{i_3} \cdots \binom{n-i_1-i_2-\dots-i_{r-1}}{i_r} = \\ & \frac{n!}{i_1!(n-i_1)!} \frac{(n-i_1)!}{i_2!(n-i_1-i_2)!} \cdots \frac{(n-i_1-i_2-\dots-i_{r-1})!}{i_r!(n-i_1-\dots-i_{r-1}-i_r)!} = \frac{n!}{i_1! \cdot i_2! \cdots i_r!} \end{aligned}$$



Polinomiális tétel

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{i_1 + i_2 + \dots + i_r = n} \frac{n!}{i_1! i_2! \dots i_r!} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_r^{i_r}$$

$$(x + y + z)^3 = \dots$$

i_1	i_2	i_3	$\frac{3!}{i_1! i_2! i_3!}$	$(x + y + z)^3 =$
3	0	0	$\frac{3!}{3!0!0!} = 1$	x^3
2	1	0	$\frac{3!}{2!1!0!} = 3$	$+3x^2y$
2	0	1	$\frac{3!}{2!0!1!} = 3$	$+3x^2z$
1	2	0	$\frac{3!}{1!2!0!} = 3$	$+3xy^2$
1	1	1	$\frac{3!}{1!1!1!} = 6$	$+6xyz$
1	0	2	$\frac{3!}{1!0!2!} = 3$	$+3xz^2$
0	3	0	$\frac{3!}{0!3!0!} = 1$	$+y^3$
0	2	1	$\frac{3!}{0!2!1!} = 3$	$+3y^2z$
0	1	2	$\frac{3!}{0!1!2!} = 3$	$+3yz^2$
0	0	3	$\frac{3!}{0!0!3!} = 1$	$+z^3$

Skatulya-elv

Skatulya-elv

Ha n darab gyufásdobozunk és $n + 1$ gyufaszálunk van, akkor akárhogyan rakjuk bele az összes gyufát a skatulyákba, valamelyikben legalább kettő gyufa lesz.

Példa

Nyolc ember közül van legalább kettő, aki a hét ugyanazon napján született.

Az $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ halmazból bárhogyan választunk ki ötöt, akkor lesz közülük kettő, melyek összege 9.

Tekintsük az $\{1, 8\}$, $\{2, 7\}$, $\{3, 6\}$, $\{4, 5\}$ halmazokat. Ekkor a kiválasztott öt elem közül lesz kettő, melyek azonos halmazban lesznek, így összegük 9.

Szita módszer

Hány olyan 1000-nél kisebb pozitív egész szám van, amely nem osztható sem 2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel?

Az 1000-nél kisebb számok

összes	999	999
2-vel osztható	$\left\lfloor \frac{999}{2} \right\rfloor = 499$	− 499
3-mal osztható	$\left\lfloor \frac{999}{3} \right\rfloor = 333$	− 333
5-tel osztható	$\left\lfloor \frac{999}{5} \right\rfloor = 199$	− 199
$2 \cdot 3$ -mal osztható	$\left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 3} \right\rfloor = 166$	+ 166
$2 \cdot 5$ -tel osztható	$\left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 5} \right\rfloor = 99$	+ 99
$3 \cdot 5$ -tel osztható	$\left\lfloor \frac{999}{3 \cdot 5} \right\rfloor = 66$	+ 66
$2 \cdot 3 \cdot 5$ -tel osztható	$\left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right\rfloor = 33$	− 33
		<hr/>
		= 266

Szita módszer

Tétel

Legyenek A_1, A_2, \dots, A_n véges halmazok. Ekkor

$$|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| \mp \dots$$

Példa

Hány olyan 1000-nél kisebb szám van, amely nem osztható sem 2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel?

Először: Hány olyan 1000-nél kisebb szám van, amely osztható 2-vel vagy 3-mal vagy 5-tel?

$$A_1 = \{1 \leq n \leq 999 : 2|n\} \rightarrow |A_1| = \left\lfloor \frac{999}{2} \right\rfloor;$$

$$A_2 = \{1 \leq n \leq 999 : 3|n\} \rightarrow |A_2| = \left\lfloor \frac{999}{3} \right\rfloor;$$

$$A_3 = \{1 \leq n \leq 999 : 5|n\} \rightarrow |A_3| = \left\lfloor \frac{999}{5} \right\rfloor.$$

$$\text{Hasonlóan } |A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 3} \right\rfloor, |A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 5} \right\rfloor, |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{999}{3 \cdot 5} \right\rfloor, \\ |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right\rfloor.$$

2-vel vagy 3-mal vagy 5-tel osztható számok száma:

$$\left\lfloor \frac{999}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{999}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{999}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{3 \cdot 5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{999}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right\rfloor.$$

Általános szita formula

Tétel

Legyenek A_1, \dots, A_n az A véges halmaz részhalmazai, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tetszőleges függvény. Legyenek

$$S = \sum_{x \in A} f(x);$$

$$S_r = \sum_{0 < i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \sum_{x \in A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}} f(x);$$

$$S_0 = \sum_{x \in A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i} f(x).$$

Ekkor $S_0 = S - S_1 + S_2 - S_3 \pm \dots + (-1)^n S_n$.

Példa

$$A = \{1, 2, \dots, 999\}, A_1 = \{n : 1 \leq n < 1000, 2 \mid n\},$$

$$A_2 = \{n : 1 \leq n < 1000, 3 \mid n\}, A_3 = \{n : 1 \leq n < 1000, 5 \mid n\},$$

$$f(x) = 1.$$

S_0 : 2-vel, 3-mal, 5-tel nem osztható 1000-nél kisebb számok száma.

Általános szita formula bizonyítása

$$S_0 = S - S_1 + S_2 - S_3 \pm \dots + (-1)^n S_n:$$

$$S_0 = \sum_{x \in A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i} f(x), \quad S = \sum_{x \in A} f(x)$$

$$S_r = \sum_{0 < i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \sum_{x \in A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}} f(x)$$

Bizonyítás

Ha $x \in A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i$, akkor $f(x)$ mindkét oldalon egyszer szerepel.

Ha $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$, legyenek A_{j_1}, \dots, A_{j_t} azon részhalmazok, melyeknek x eleme. Ekkor $f(x)$ a bal oldalon nem szerepel. Jobb oldalon a

$$\sum_{0 < i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \sum_{x \in A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}} f(x)$$

összegben szerepel, ha $\{i_1, \dots, i_r\} \subseteq \{j_1, \dots, j_t\}$. Ilyen r elemű

indexhalmaz $\binom{t}{r}$ darab van. Így $f(x)$ együtthatója

$$\sum_{r=0}^t \binom{t}{r} (-1)^r = 0 \quad (\text{Biz.: gyakorlaton}).$$



Véges halmazok

Definíció

Az X és Y halmazokat **ekvivalensnek** nevezzük, ha létezik $f : X \rightarrow Y$ bijekció. Jelölése: $X \sim Y$.

Állítás

Ha n természetes szám, akkor $\{1, 2, \dots, n\}$ nem ekvivalens egyetlen valódi részhalmazával sem.

Definíció

Egy X halmazt **végesnek** nevezünk, ha valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén ekvivalens az $\{1, 2, \dots, n\}$ halmazzal, egyébként **végtelennek** nevezzük.

Azt az egyértelműen meghatározott természetes számot, amire egy adott X halmaz ekvivalens az $\{1, 2, \dots, n\}$ halmazzal, az X **számosságának** nevezzük, jelölése: $|X|$ (esetleg $\text{card}(X)$, $\aleph(X)$, $\#(X)$).