

第四章 矩阵分解

第 11 讲 QR 分解

黄定江

DaSE @ ECNU

djhuang@dase.ecnu.edu.cn

① 11.1 基于 Gram-Schmidt 正交化的 QR 分解

② 11.2 基于 Householder 变换的 QR 分解

③ 11.3 基于 Givens 变换的 QR 分解

1 11.1 基于 Gram-Schmidt 正交化的 QR 分解

2 11.2 基于 Householder 变换的 QR 分解

3 11.3 基于 Givens 变换的 QR 分解

11.1.1 QR 分解

- 矩阵的 QR 分解也称正交三角分解，是一种特殊的三角分解。
- QR 分解在解决最小二乘问题、矩阵特征值的计算等问题中起到重要作用，也是目前计算一般矩阵的全部特征值和特征向量的最有效方法之一。
- 矩阵 \mathbf{A} 的 QR 分解可以通过 Gram-Schmidt 正交化、Householder 变换和 Givens 变换等方法实现。

QR 分解

定义 1

设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} (m \geq n)$, 如果存在 m 阶正交矩阵 Q 和 n 阶上三角矩阵 R , 使得

$$A = Q \begin{pmatrix} R \\ O \end{pmatrix},$$

则称之为 A 的 QR 分解或正交三角分解。

在上述定义中, 当 $A \in \mathbb{C}^{m \times n} (m \geq n)$ 且 Q 为 m 阶酉矩阵, 则称之为 A 的酉三角分解。

QR 分解

定理 1

对任意一个列满秩的实矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} (m \geq n)$, 都存在正交三角分解

$$A = Q \begin{pmatrix} R \\ O \end{pmatrix},$$

其中 Q 为 m 阶正交矩阵, R 具有正的对角元的上三角矩阵; 而且当 $m = n$ 且 A 非奇异时, 上述分解还是唯一的。

上述定理对于复矩阵也成立, 此时 Q 为酉矩阵。

证明.

设 \mathbf{A} 是一个列满秩的实矩阵, \mathbf{A} 的 n 个列向量为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, 由于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, 将它们用 Schmidt 正交化方法得标准正交向量 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ 即

$$\begin{cases} \mathbf{a}_1 &= r_{11} \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{a}_2 &= r_{12} \mathbf{q}_1 + r_{22} \mathbf{q}_2 \\ &\dots \\ \mathbf{a}_n &= r_{1n} \mathbf{q}_1 + r_{2n} \mathbf{q}_2 + \dots + r_{nn} \mathbf{q}_n \end{cases}$$

其中 $r_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 从而有

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \dots & \mathbf{a}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \dots & \mathbf{q}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & r_{23} & \dots & r_{2n} \\ 0 & 0 & r_{33} & \dots & r_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

如果给 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ 补上 $m - n$ 个标准正交的向量 $\mathbf{q}_{n+1}, \mathbf{q}_{n+2}, \dots, \mathbf{q}_m$ 就有

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \dots & \mathbf{a}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \dots & \mathbf{q}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & r_{23} & \dots & r_{2n} \\ 0 & 0 & r_{33} & \dots & r_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & r_{nn} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \dots & \mathbf{q}_m \end{pmatrix}, \mathbf{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & r_{23} & \dots & r_{2n} \\ 0 & 0 & r_{33} & \dots & r_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$$

再证唯一性。

如果

$$A = QR = Q_1 R_1,$$

由此得 $Q = Q_1 R_1 R^{-1}$, 令 $D = R_1 R^{-1}$, 那么 D 仍为具有正对角元的上三角矩阵。

由于

$$I = Q^T Q = (Q_1 D)^T (Q_1 D) = D^T D$$

即 D 为正交矩阵, 因此 D 为单位矩阵 (正交上三角为对角阵)

故

$$Q = Q_1 D = Q_1, R_1 = DR = R$$

11.1.2 Schmidt 正交化方法

例 1

求下列矩阵的正交三角分解 (QR) 表达式:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Schmidt 正交化方法

记 $\mathbf{a}_1 = (0, 1, 1)^T$ $\mathbf{a}_2 = (1, 1, 0)^T$ $\mathbf{a}_3 = (1, 0, 1)^T$

由 Gram-Schmidt 正交化方法。先正交化得

$$\begin{cases} \mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (0, 1, 1)^T \\ \mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})^T \\ \mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 - \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_2 \rangle}{\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2 \rangle} \mathbf{b}_2 = (\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3})^T \end{cases}$$

然后单位化

$$\begin{cases} \mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)^T \\ \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, -1)^T \\ \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T \end{cases}$$

Schmidt 正交化方法

整理得

$$\begin{cases} a_1 = |b_1|q_1 \\ a_2 = \langle a_2, q_1 \rangle q_1 + |b_2|q_2 \\ a_3 = \langle a_3, q_1 \rangle q_1 + \langle a_3, q_2 \rangle q_2 + |b_3|q_3 \end{cases}$$

于是

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} |b_1| & \langle a_2, q_1 \rangle & \langle a_3, q_1 \rangle \\ 0 & |b_2| & \langle a_3, q_2 \rangle \\ 0 & 0 & |b_3| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

那么 $A = QR$ 即为所求表达式。

注记

- 在实际数值计算中，Gram-Schmidt 正交化是数值不稳定的，计算中累积的舍入误差会使最终结果的正交性变得很差；
- 因此常用一种修正的 Gram-Schmidt 正交化方法，它是对经典 Gram-Schmidt 正交化法的修正，使上三角矩阵 \mathbf{R} 的元素不是按列，而是按行计算，这时舍入误差将变小。

- ① 11.1 基于 Gram-Schmidt 正交化的 QR 分解
- ② 11.2 基于 Householder 变换的 QR 分解
- ③ 11.3 基于 Givens 变换的 QR 分解

11.2.1 Householder 变换：定义和性质回顾

定义 2

设 $w \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|w\|_2 = 1$, 定义 $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为

$$H = I - 2ww^T \quad (1)$$

则称 H 为 *Householder* 变换。

Householder 变换性质回顾

设 H 是由(1)定义的一个 Householder 变换, 那么 H 满足 (1) 对称性: $H^T = H$; (2) 正交性: $H^T H = I$; (3) 对合性: $H^2 = I$; (4) 反射性: 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, Hx 是 x 关于 w 的垂直超平面的镜像反射; (5) $\text{diag}(I, H)$ 也是一个 Householder 矩阵; (6) $\det H = -1$ 。

Householder 变换：性质

定理 2

设 $\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 则可构造单位向量 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, 使由(1)定义的 Householder 变换 \mathbf{H} 满足

$$\mathbf{H}\mathbf{x} = \alpha \mathbf{e}_1, \quad (2)$$

其中 $\alpha = \pm \|\mathbf{x}\|_2$ 。

证明.

由于 $Hx = (I - 2ww^T)x = x - 2(w^Tx)w$,

故欲使 $Hx = \alpha e_1$, 则 w 应为

$$w = \frac{x - \alpha e_1}{\|x - \alpha e_1\|_2}$$

$$Hx = x - 2 \frac{(x - \alpha e_1)(x - \alpha e_1)^T}{\|x - \alpha e_1\|_2^2} x$$

$$= x - \frac{2(x - \alpha e_1)^T x}{\|x - \alpha e_1\|_2^2} (x - \alpha e_1)$$

$$= x - \frac{2\|x\|_2^2 - 2\alpha e_1^T x}{\|x\|_2^2 - 2\alpha e_1^T x + \alpha^2} (x - \alpha e_1)$$

$$= x - \frac{2\alpha^2 - 2\alpha e_1^T x}{\alpha^2 - 2\alpha e_1^T x + \alpha^2} (x - \alpha e_1)$$

$$= x - (x - \alpha e_1) = \alpha e_1$$

又因 H 是正交矩阵, 必须有

$$\|x\|_2 = \|Hx\|_2$$

$$= \|\alpha e_1\|_2$$

$$= |\alpha| \cdot \|e_1\|_2$$

$$= |\alpha|$$

即 $\alpha = \pm \|x\|_2$.

□

- 上述定理说明, 对任意的 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n (\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0})$, 通过适当选取单位向量 \boldsymbol{w} , 可构造出 Householder 变换矩阵 \boldsymbol{H} , 使 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}$ 的后 $n-1$ 分量变为零。这类似于 Gauss 变换, 可以把一个给定向量的若干个指定的分量变为零。
- 另外也说明, 可以利用 Householder 变换将任意向量 \boldsymbol{x} 化为与第一自然基向量 \boldsymbol{e}_1 平行的向量 (共线)。
- 而且其证明亦告诉我们, 可按如下的步骤来构造确定 \boldsymbol{H} 的单位向量 \boldsymbol{w} :
 - (1) 计算 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{x} \pm \|\boldsymbol{x}\|_2 \boldsymbol{e}_1$;
 - (2) 计算 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} / \|\boldsymbol{v}\|_2$ 。
- 此外, 在实际计算中, α 取正还是取负根据具体情况来决定。

例 2

用 Householder 变换将向量 $\mathbf{x} = (0, 3, 4)^T$ 化为与 $\mathbf{e} = (1, 0, 0)^T$ 平行的向量。

解

由于 $\|\mathbf{x}\|_2 = 5$, 不妨取 $\alpha = \|\mathbf{x}\|_2 = 5$ 。令

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\mathbf{x} - \alpha \mathbf{e}}{\|\mathbf{x} - \alpha \mathbf{e}\|_2} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{H} = \mathbf{I} - 2\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\omega}^T = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 0 & 15 & 20 \\ 15 & 16 & -12 \\ 20 & -12 & 91 \end{pmatrix}$$

因此 $\mathbf{H}\mathbf{x} = 5\mathbf{e}$ 。

11.2.2 基于 Householder 变换的矩阵 QR 分解

利用 Householder 变换求矩阵的 QR 分解的步骤:

[1] 将矩阵 A 按列分块 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 取

$$\omega_1 = \frac{\alpha_1 - a_1 e}{\|\alpha_1 - a_1 e\|_2}, a_1 = \|\alpha_1\|_2$$

则

$$H_1 = I - 2\omega_1\omega_1^T$$

那么

$$H_1 A = (H_1 \alpha_1, H_1 \alpha_2, \dots, H_1 \alpha_n) = \begin{pmatrix} a_1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & B_1 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

[2] 将矩阵 B_1 按列分块, $B_1 = (\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n)$

取

$$\omega_2 = \frac{\beta_2 - b_2 e}{\|\beta_2 - b_2 e\|_2}, b_2 = \|\beta_2\|_2$$

则

$$\tilde{H}_2 = I - 2\omega_2\omega_2^T$$

并且令

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \tilde{H}_2 \end{pmatrix}$$

故有

$$H_2(H_1 A) = \begin{pmatrix} a_1 & * & * & \dots & * \\ 0 & a_2 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & C_1 & \\ 0 & 0 & & & \end{pmatrix}$$

依次进行下去, 得到第 $n-1$ 个 n 阶的 Householder 矩阵 H_{n-1} , 使得

$$H_{n-1} \dots H_2 H_1 A = \begin{pmatrix} a_1 & * & \dots & * \\ & a_2 & \dots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ O \end{pmatrix}$$

因 H_i 是自逆矩阵, 令 $Q = H_1 H_2 \dots H_{n-1}$, 则 $A = Q \begin{pmatrix} R \\ O \end{pmatrix}$

例 3

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 利用 *Householder* 变换求 A 的 QR 分解。

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 利用 Householder 变换求 A 的 QR 分解。

解

因为 $\alpha_1 = (0, 0, 2)^T$, 记 $a_1 = \|\alpha_1\|_2 = 2$, 令 $w_1 = \frac{\alpha_1 - a_1 e_1}{\|\alpha_1 - a_1 e_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$, 则

$$H_1 = I - 2w_1 w_1^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从而

$$H_1 A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 利用 Householder 变换求 A 的 QR 分解。

解

记 $\beta_2 = (4, 3)^T$, 则 $b_2 = \|\beta_2\|_2 = 5$, 令 $w_2 = \frac{\beta_2 - b_2 e_2}{\|\beta_2 - b_2 e_2\|_2} = \frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 3)^T$

$$\hat{H}_2 = I - 2w_2 w_2^T = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

记

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ 0 & \hat{H}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 利用 Householder 变换求 A 的 QR 分解。

解

则

$$H_2(H_1 A) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = R$$

取


$$Q = H_1 H_2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $A = QR$ 。

- 1 11.1 基于 Gram-Schmidt 正交化的 QR 分解
- 2 11.2 基于 Householder 变换的 QR 分解
- 3 11.3 基于 Givens 变换的 QR 分解

11.3.1 Givens 变换：Givens 矩阵回顾

在平面解析几何中，已知使向量 \boldsymbol{x} 逆时针旋转角度 θ 后变为向量 \boldsymbol{y} 的旋转变换（见下图）如下：



$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{T} \boldsymbol{x}$$

其中 \boldsymbol{T} 是正交矩阵，称为平面旋转矩阵。将其推广到一般的 n 维空间中，可以得到初等旋转变换，也称为 Givens 变换。Givens 矩阵是正交矩阵，而且其行列式为 1。

Givens 变换: Givens 矩阵回顾

定义 3

设 $c, s \in \mathbb{R}$, $c^2 + s^2 = 1$, e_1, e_2, \dots, e_n 是 n 维向量空间 \mathbb{R}^n 的一个标准正交基, 记 n 阶矩阵:

$$T_{kl} = I + s(e_k e_l^T - e_l e_k^T) + (c - 1)(e_k e_k^T + e_l e_l^T) = \begin{bmatrix} 1 & & \vdots & & \vdots & & \\ & \ddots & \vdots & & \vdots & & \\ \cdots & \cdots & c & \cdots & s & \cdots & \cdots \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ \cdots & \cdots & -s & \cdots & c & \cdots & \cdots \\ & & \vdots & & \vdots & \ddots & \\ & & \vdots & & \vdots & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ l \end{matrix}$$

称 T_{kl} 为 Givens 矩阵。由 T_{kl} 所确定的线性变换称为 Givens 变换或初等旋转变换。

定理 3

对于任意向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 Givens 变换 T_{kl} 使得 $T_{kl}x$ 的第 l 个分量为 0, 第 k 个分量为非负实数, 其余分量不变。

证明.

记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $T_{kl}x = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$

由 Givens 矩阵的定义可得

$$\begin{cases} y_k &= cx_k + sx_l \\ y_l &= -sx_k + cx_l \\ y_j &= x_j, (j \neq k, l) \end{cases}$$

(i) 当 $|x_k|^2 + |x_l|^2 = 0$ 时, 取 $c = 1, s = 0$, 则 $T_{kl} = I$, 此时

$$y_k = y_l = 0, y_j = x_j (j \neq k, l)$$

结论成立

(ii) 当 $|x_k|^2 + |x_l|^2 \neq 0$ 时, 取

$$c = \frac{x_k}{\sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2}}, s = \frac{x_l}{\sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2}},$$

则

$$\begin{cases} y_k &= \frac{x_k^2}{\sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2}} + \frac{x_l^2}{\sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2}} = \sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2} > 0 \\ y_l &= -\frac{x_k x_l}{\sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2}} + \frac{x_l x_k}{\sqrt{|x_k|^2 + |x_l|^2}} = 0 \\ y_j &= x_j, (j \neq k, l) \end{cases}$$

结论成立

推论 1

给定一个向量 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 则存在一组 Givens 矩阵 $\boldsymbol{T}_{12}, \boldsymbol{T}_{13}, \dots, \boldsymbol{T}_{1n}$, 使得

$$\boldsymbol{T}_{1n} \dots \boldsymbol{T}_{13} \boldsymbol{T}_{12} \boldsymbol{x} = \|\boldsymbol{x}\|_2 \boldsymbol{e}_1,$$

称为用 Givens 变换化向量 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 与第一自然基向量 \boldsymbol{e}_1 共线。

证明.

设 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 由定理 3 知存在 Givens 矩阵 \boldsymbol{T}_{12} , 使得

$$\boldsymbol{T}_{12} \boldsymbol{x} = (\sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2}, 0, x_3, \dots, x_n)^T$$

对于 $\boldsymbol{T}_{12} \boldsymbol{x}$ 又存在 Givens 矩阵 \boldsymbol{T}_{13} 使得

$$\boldsymbol{T}_{13}(\boldsymbol{T}_{12} \boldsymbol{x}) = (\sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + |x_3|^2}, 0, 0, x_4, \dots, x_n)^T$$

依此继续下去, 可以得出

$$\boldsymbol{T}_{1n} \dots \boldsymbol{T}_{13} \boldsymbol{T}_{12} \boldsymbol{x} = (\sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2}, 0, 0, \dots, 0)^T = \|\boldsymbol{x}\|_2 \boldsymbol{e}_1$$



例 4

用 Givens 变换化向量 $x = (1, 2, 2)$ 与第一自然基向量共线

解

由于 $x_1 = 1, x_2 = 2, \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2} = \sqrt{5}$ 取

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, s_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

构造 Givens 矩阵

$$T_{12} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故

$$T_{12}x = \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

对于 $T_{12}\mathbf{x}$ 取

$$c_2 = \frac{\sqrt{5}}{3}, s_2 = \frac{2}{3}$$

则

$$T_{13} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix}, T_{13}T_{12}\mathbf{x} = 3\mathbf{e}_1$$

11.3.2 基于 Givens 变换的矩阵 QR 分解

利用 Givens 变换求矩阵 QR 分解的步骤

先将矩阵 A 按列分块,

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

[1] 对于 α_1 存在一组 Givens 矩阵 $T_{12}, T_{13}, \dots, T_{1n}$ 使得

$$T_{1n} \dots T_{13} T_{12} \alpha_1 = \|\alpha_1\|_2 e_1$$

于是

$$T_{1n} \dots T_{13} T_{12} A = \begin{pmatrix} a_1 & * \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}, a_1 = \|\alpha_1\|_2$$

利用 Givens 变换求矩阵 QR 分解的步骤

[2] 将矩阵 $\begin{pmatrix} * \\ B_1 \end{pmatrix}$ 按列分块

$$\begin{pmatrix} * \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & \dots & * \\ \beta_2 & \beta_3 & \dots & \beta_n \end{pmatrix}$$

又存在一组 Givens 矩阵 $T_{23}, T_{24}, \dots, T_{2n}$ 使得

$$T_{2n} \dots T_{24} T_{23} \begin{pmatrix} * \\ \beta_2 \end{pmatrix} = (*, b_2, 0, \dots, 0)^T, b_2 = \|\beta_2\|_2$$

因此

$$\mathbf{T}_{2n} \dots \mathbf{T}_{24} \mathbf{T}_{23} \mathbf{T}_{1n} \dots \mathbf{T}_{13} \mathbf{T}_{12} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & * & * & \dots & * \\ 0 & b_1 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \mathbf{C}_2 & & \end{pmatrix}$$

依次进行下去得到

$$\mathbf{T}_{n-1,n} \dots \mathbf{T}_{2n} \dots \mathbf{T}_{23} \mathbf{T}_{1n} \dots \mathbf{T}_{12} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & * & \dots & * \\ & a_2 & \dots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} \\ \mathbf{O} \end{pmatrix}$$

[3] 令 $Q = T_{12}^T \dots T_{1n}^T T_{23}^T \dots T_{2n}^T \dots T_{n-1,n}^T$, 则 $A = Q \begin{pmatrix} R \\ O \end{pmatrix}$

说明

利用 Givens 变换进行 QR 分解, 需要作 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个初等旋转矩阵的连乘积, 当 n 较大时, 计算量较大, 因此常用镜像变换来进行 QR 分解。

例 5

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 利用 *Givens* 变换求 A 的 QR 分解。

解

因为 $a_{11} = 0, a_{31} = 2$, 取 $c = 0, s = 1$, 构造

$$T_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则有

$$A^{(1)} = T_{13}A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

解

因为 $a_{22}^{(1)} = 4, a_{32}^{(1)} = -3$, 取 $c = \frac{4}{5}, s = -\frac{3}{5}$, 构造

$$T_{23} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

则

$$A^{(2)} = T_{23}A^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = R$$

$$Q = T_{13}^T T_{23}^T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $A = QR$ 。

本讲小结

QR 分解

- Gram-Schmidt 正交化
- Householder 变换
- Givens 变换

对于复矩阵，也有相应的上述三种方法。

将用于最小二乘问题、特征值的计算求解等！