

Équations Différentielles Linéaires d'ordre 2  
Corrigé

DARVOUX Théo  
Novembre 2023

Exercices.

Exercice 12.1 . . . . .	2
Exercice 12.2 . . . . .	2
Exercice 12.3 . . . . .	2
Exercice 12.4 . . . . .	3

**Exercice 12.1** [◆◆◆]

Résoudre le problème de Cauchy ci-dessous :

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 10y = 5 \\ y(0) = 1 \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

Polynôme caractéristique :  $r^2 + 2r + 10$ .  $\Delta = -36$ .  $r_{\pm} = -1 \pm 3i$ .

Solutions de l'équation homogène :  $S_0 = \{x \mapsto e^{-x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x)) \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$

Solution particulière :  $S_p : x \mapsto \frac{1}{2}$ .

Solution générale :  $S = \{x \mapsto \frac{1}{2} + e^{-x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x)) \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$ .

Conditions initiales.

Soit  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \mid \forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \frac{1}{2} + e^{-x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x))$ .

On a  $y(0) = 1 \iff \frac{1}{2} + \alpha = 1 \iff \alpha = \frac{1}{2}$ .

On a  $y'(0) = 0 \iff -\frac{1}{2} + 3\beta = 0 \iff \beta = \frac{1}{6}$ .

L'unique solution de ce problème de Cauchy est :  $x \mapsto \frac{1}{2} + e^{-x}(\frac{1}{2} \cos(3x) + \frac{1}{6} \sin(3x))$

□

**Exercice 12.2** [◆◆◆]

Résoudre :

$$y'' - y' - 2y = 2 \operatorname{ch}(x)$$

On réécrit d'abord cette équation comme :  $y'' - y' - 2y = e^x + e^{-x}$ .

Polynôme caractéristique :  $r^2 - r - 2$ .  $\Delta = 9$ .  $r_1 = -1$  et  $r_2 = 2$ .

Solutions de l'équation homogène :  $S_0 = \{x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{2x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

Équation auxiliaire 1 :  $y'' - y' - 2y = e^x$ . Solution particulière :  $S_{p,1} : x \mapsto B e^x \mid B \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ ,  $B \in \mathbb{R}$  et  $y : x \mapsto B e^x$ .

On a  $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = e^x \iff -2B e^x = e^x \iff B = -\frac{1}{2}$ .

Ainsi,  $S_{p,1} : x \mapsto -\frac{1}{2} e^x$ .

Équation auxiliaire 2 :  $y'' - y' - 2y = e^{-x}$ . Solution particulière :  $S_{p,2} : x \mapsto C x e^{-x} \mid C \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ ,  $C \in \mathbb{R}$  et  $y : x \mapsto C x e^{-x}$ .

On a  $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = e^{-x} \iff -3C e^{-x} = e^{-x} \iff C = -\frac{1}{3}$ .

Ainsi,  $S_{p,2} : x \mapsto -\frac{1}{3} x e^{-x}$ .

Par superposition, l'ensemble des solutions est :

$$\{x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{2x} - \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{3} x e^{-x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$

□

**Exercice 12.3** [◆◆◆]

Résoudre :

$$y'' + 2y' + y = \cos(2t) \quad (E).$$

Polynôme caractéristique :  $r^2 + 2r + 1$ .  $\Delta = 0$ .  $r = -1$ .

Solutions de l'équation homogène :  $S_0 = \{x \mapsto \lambda x e^{-x} + \mu e^{-x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

Équation auxiliaire :  $y'' + 2y' + y = e^{2ix}$ . Solution particulière :  $S_{p,aux} : x \mapsto B e^{2ix}$  avec  $B \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ ,  $B \in \mathbb{R}$  et  $y : x \mapsto B e^{2ix}$ .

On a :  $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = e^{2ix} \iff B e^{2ix}(-3 + 4i) = e^{2ix} \iff B = \frac{1}{-3+4i} = \frac{-3-4i}{25}$ .

Passage à la partie réelle :  $\Re(y(x)) = \Re\left(-\frac{3+4i}{25}(\cos(2x) + i \sin(2x))\right) = -\frac{3}{25} \cos(2x) + \frac{4}{25} \sin(2x)$ .

Solution générale :  $S = \{x \mapsto \lambda x e^{-x} + \mu e^{-x} - \frac{3}{25} \cos(2x) + \frac{4}{25} \sin(2x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

□

## Exercice 12.4 [◆◆◇] Résonance... ou pas

1. Excitation à une pulsation quelconque. Résoudre

$$y'' + 4y = \cos t$$

2. Excitation à la pulsation propre : résonance. Résoudre

$$y'' + 4y = \cos(2t)$$

1. Polynôme caractéristique :  $r^2 + 4$ .  $\Delta = -16$ .  $r_1 = 2i$ ,  $r_2 = -2i$ .

Solutions de l'équation homogène :  $S_0 = \{x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

Équation auxiliaire :  $y'' + 4y = e^{it}$ . Solution particulière :  $S_{p,aux} : x \mapsto Be^{ix}$  avec  $B \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x, B \in \mathbb{R}$ , et  $y : x \mapsto Be^{ix}$ .

On a :  $y''(x) + 4y(x) = e^{ix} \iff 3Be^{ix} = e^{ix} \iff B = \frac{1}{3}$ .

Passage à la partie réelle :  $\Re(y(x)) = \frac{1}{3} \cos(x)$ .

Solution générale :  $S = \{x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) + \frac{1}{3} \cos(x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$

2. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est encore  $S_0$ .

Équation auxiliaire :  $y'' + 4y = e^{2it}$ . Solution particulière :  $S_{p,aux} : x \mapsto Bxe^{2ix}$  avec  $B \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x, B \in \mathbb{R}$  et  $y : x \mapsto Bxe^{2ix}$ .

On a :  $y''(x) + 4y(x) = e^{2ix} \iff Be^{2ix}(4i - 4x) + 4Bxe^{2ix} = e^{2ix} \iff B = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$

Passage à la partie réelle :  $\Re(y(x)) = \Re\left(-\frac{i}{4}x(\cos(2x) + i \sin(2x))\right) = \frac{1}{4}x \sin(2x)$ .

Solution générale :  $S = \{x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) + \frac{1}{4}x \sin(2x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

□