

Équations Différentielles Linéaires d'ordre 2
Corrigé

DARVOUX Théo

Novembre 2023

Exercices.

Exercice 12.1	2
Exercice 12.2	2
Exercice 12.3	2
Exercice 12.4	3
Exercice 12.5	3

Exercice 12.1 [◆◆◆]

Résoudre le problème de Cauchy ci-dessous :

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 10y = 5 \\ y(0) = 1 \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

Polynome caractéristique : $r^2 + 2r + 10$. $\Delta = -36$. $r_{\pm} = -1 \pm 3i$.

Solutions de l'équation homogène : $S_0 = \{x \mapsto e^{-x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x)) \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$

Solution particulière : $S_p : x \mapsto \frac{1}{2}$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto \frac{1}{2} + e^{-x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x)) \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$.

Conditions initiales.

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \mid \forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \frac{1}{2} + e^{-x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x))$.

On a $y(0) = 1 \iff \frac{1}{2} + \alpha = 1 \iff \alpha = \frac{1}{2}$.

On a $y'(0) = 0 \iff -\frac{1}{2} + 3\beta = 0 \iff \beta = \frac{1}{6}$.

L'unique solution de ce problème de Cauchy est : $x \mapsto \frac{1}{2} + e^{-x}(\frac{1}{2} \cos(3x) + \frac{1}{6} \sin(3x))$

□

Exercice 12.2 [◆◆◆]

Résoudre :

$$y'' - y' - 2y = 2 \operatorname{ch}(x)$$

On réécrit d'abord cette équation comme : $y'' - y' - 2y = e^x + e^{-x}$.

Polynome caractéristique : $r^2 - r - 2$. $\Delta = 9$. $r_1 = -1$ et $r_2 = 2$.

Solutions de l'équation homogène : $S_0 = \{x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{2x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

Équation auxiliaire 1 : $y'' - y' - 2y = e^x$. Solution particulière : $S_{p,1} : x \mapsto B e^x \mid B \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{R}$ et $y : x \mapsto B e^x$.

On a $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = e^x \iff -2B e^x = e^x \iff B = -\frac{1}{2}$.

Ainsi, $S_{p,1} : x \mapsto -\frac{1}{2} e^x$.

Équation auxiliaire 2 : $y'' - y' - 2y = e^{-x}$. Solution particulière : $S_{p,2} : x \mapsto C x e^{-x} \mid C \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, $C \in \mathbb{R}$ et $y : x \mapsto C x e^{-x}$.

On a $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = e^{-x} \iff -3C e^{-x} = e^{-x} \iff C = -\frac{1}{3}$.

Ainsi, $S_{p,2} : x \mapsto -\frac{1}{3} x e^{-x}$.

Par superposition, l'ensemble des solutions est :

$$\{x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{2x} - \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{3} x e^{-x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$

□

Exercice 12.3 [◆◆◆]

Résoudre :

$$y'' + 2y' + y = \cos(2t) \quad (E).$$

Polynome caractéristique : $r^2 + 2r + 1$. $\Delta = 0$. $r = -1$.

Solutions de l'équation homogène : $S_0 = \{x \mapsto \lambda x e^{-x} + \mu e^{-x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

Équation auxiliaire : $y'' + 2y' + y = e^{2ix}$. Solution particulière : $S_{p,aux} : x \mapsto B e^{2ix}$ avec $B \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{R}$ et $y : x \mapsto B e^{2ix}$.

On a : $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = e^{2ix} \iff B e^{2ix}(-3 + 4i) = e^{2ix} \iff B = \frac{1}{-3+4i} = \frac{-3-4i}{25}$.

Passage à la partie réelle : $\Re(y(x)) = \Re\left(-\frac{3+4i}{25}(\cos(2x) + i \sin(2x))\right) = -\frac{3}{25} \cos(2x) + \frac{4}{25} \sin(2x)$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto \lambda x e^{-x} + \mu e^{-x} - \frac{3}{25} \cos(2x) + \frac{4}{25} \sin(2x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

□

Exercice 12.4 [◆◆◇] Résonance... ou pas

1. Excitation à une pulsation quelconque. Résoudre

$$y'' + 4y = \cos t$$

2. Excitation à la pulsation propre : résonance. Résoudre

$$y'' + 4y = \cos(2t)$$

1. Polynôme caractéristique : $r^2 + 4$. $\Delta = -16$. $r_1 = 2i$, $r_2 = -2i$.

Solutions de l'équation homogène : $S_0 = \{x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

Équation auxiliaire : $y'' + 4y = e^{it}$. Solution particulière : $S_{p,aux} : x \mapsto Be^{ix}$ avec $B \in \mathbb{R}$.

Soit $x, B \in \mathbb{R}$, et $y : x \mapsto Be^{ix}$.

On a : $y''(x) + 4y(x) = e^{ix} \iff 3Be^{ix} = e^{ix} \iff B = \frac{1}{3}$.

Passage à la partie réelle : $\Re(y(x)) = \frac{1}{3} \cos(x)$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) + \frac{1}{3} \cos(x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$

2. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est encore S_0 .

Équation auxiliaire : $y'' + 4y = e^{2it}$. Solution particulière : $S_{p,aux} : x \mapsto Bxe^{2ix}$ avec $B \in \mathbb{R}$.

Soit $x, B \in \mathbb{R}$ et $y : x \mapsto Bxe^{2ix}$.

On a : $y''(x) + 4y(x) = e^{2ix} \iff Be^{2ix}(4i - 4x) + 4Bxe^{2ix} = e^{2ix} \iff B = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$

Passage à la partie réelle : $\Re(y(x)) = \Re\left(-\frac{i}{4}x(\cos(2x) + i \sin(2x))\right) = \frac{1}{4}x \sin(2x)$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) + \frac{1}{4}x \sin(2x) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

□

Exercice 12.5 [◆◆◇]

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation différentielle

$$2y'' + \alpha y' + \alpha y = 0.$$

On discutera selon les valeurs de α .

On se ramène à l'équation différentielle : $y'' + \frac{\alpha}{2}y' + \frac{\alpha}{2}y = 0$.

Polynôme caractéristique : $r^2 + \frac{\alpha}{2}r + \frac{\alpha}{2}$. $\Delta = \alpha(\frac{\alpha}{4} - 2)$

On a alors trois cas...

⊙ Cas $\alpha \in \{0, 8\}$.

Alors $\Delta = 0$ et $r = -\frac{\alpha}{4}$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto \lambda xe^{-\frac{\alpha}{4}x} + \mu e^{-\frac{\alpha}{4}x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

⊙ Cas $\alpha \in]0, 8[$.

Alors $\Delta < 0$ et $r_{\pm} = -\frac{\alpha}{4} \pm i\sqrt{-\Delta}$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto e^{-\frac{\alpha}{4}x} (\lambda \cos(\sqrt{-\Delta}x) + \mu \sin(\sqrt{-\Delta}x)) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$

⊙ Cas $\alpha \notin [0, 8]$.

Alors $\Delta > 0$ et $r_1 = -\frac{\alpha}{4} + \sqrt{\Delta}$, $r_2 = -\frac{\alpha}{4} - \sqrt{\Delta}$.

Solution générale : $S = \{x \mapsto \lambda e^{r_1x} + \mu e^{r_2x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

Trop la flemme de remplacer les Δ et r_{\pm} , ça sert à rien.

On a vu les cas pour toutes les valeurs possibles de α .

□