# Chapitre 15

Endomorphismes des espaces euclidiens.

## Sommaire.


**1 Généralités.** **1**

**2 Isométries du plan.** **4**

**3 Réduction des isométries.** **6**

**4 Endomorphismes symétries (et antisymétriques).** **8**

4.1 Généralités. . . . . 8

**5 Endomorphismes symétriques positifs.** **13**


Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

## 1 Généralités.

Ici, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désignera toujours un espace euclidien.

**Définition 1**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, $u$ est une **isométrie** (ou endomorphisme orthogonal) ssi $\|u(x)\| = \|x\|$.

**Proposition 2**

Une isométrie est bijective.

**Preuve :**

Soit $u$ une isométrie, et $x \in \mathrm{Ker}(u)$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = 0_{\mathbb{R}}$ donc $x = 0_E$. Donc $u$ est injective.
Or $\dim E \leq \infty$, et $u \in \mathscr{L}(E)$, donc $u$ injective ssi $u$ bijective.
**Remarque.** La seule projection bijective est l'identité.

**Notation**

Notons $O(E)$ l'ensemble des isométries de $E$ et $SO(E)$ l'ensemble des éléments de $O(E)$ de déterminant 1.

**Proposition 3**

1. $(O(E), \circ)$ est un groupe.
2. $(SO(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(O(E), \circ)$.

**Preuve :**

$\boxed{1.}$ On a $\mathrm{Id}_E \in O(E)$ donc $O(E)$ non-vide; stable par produit :
$\forall u, v \in O(E), \forall x \in E,\ \|(u \circ v)(x)\| = \|u(v(x))\| = \|v(x)\| = \|x\|$ donc $u \circ v \in O(E)$.
Stable par inverse : pour $u \in O(E)$, $\forall x \in E,\ \|u^{-1}(x)\| = \|u(u^{-1}(x))\| = \|x\|$ donc $u^{-1} \in O(E)$.
$\boxed{2.}$ Facile.

**Théorème 4: Caractérisation des isométries. (1)**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :
1. $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$.
2. $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.

**Preuve :**

$\boxed{2 \Longrightarrow 1}$ Avec $y = x$ : $\|u(x)\| = \|x\|$.
$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $(x,y) \in E^2$, alors $\|u(x+y)\| = \|x+y\|$ puis $\|u(x+y)\| = \|u(x)+u(y)\|$.
Donc $\|x+y\|^2 = \|u(x)+u(y)\|^2$ donc $\|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2 = \|u(x)\|^2 + 2\langle u(x),u(y)\rangle + \|y\|^2$.
De plus, $\|x\|^2 = \|u(x)\|^2$ et $\|y\|^2 = \|u(y)\|^2$ donc $2\langle x,y\rangle = 2\langle u(x),u(y)\rangle$.
Finalement, $\langle x,y\rangle = \langle u(x),u(y)\rangle$.
**Remarque.** Pour $x,y \in E$ d'écart angulaire $\theta$ : $\cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$ alors $\frac{\langle u(x),u(y)\rangle}{\|u(x)\|\|u(y)\|} = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$.

**Théorème 5: Caractérisation des isométries. (2)**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors $u$ est une isométrie ssi $u^* = u^{-1}$ ssi $u \circ u^* = u^* \circ u = \mathrm{Id}_E$.

**Preuve :**

D'après la proposition précédente, $u \in O(E) \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x),u(y)\rangle = \langle x,y\rangle$.
Or par définition de l'adjoint, $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle$.
Ainsi, $u \in O(E) \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \langle u^*(u(x)), y\rangle = \langle x,y\rangle \iff \forall x \in E,\ u^*(u(x)) = x \iff u^* \circ u = \mathrm{Id}_E$.

**Remarque.** Les isométries font partie des endomorphismes normaux (HP) : $u \in \mathscr{L}(E)$ normal $\iff u \circ u^* = u^* \circ u$.

**Théorème 6: Caractérisation des isométries. (3)**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les proposition suivantes sont équivalentes :
1. $u$ est une isométrie de $E$.
2. L'image par $u$ de n'importe quelle b.o.n. de $E$ est une b.o.n. de $E$.
3. L'image par $u$ d'une b.o.n. de $E$ est une b.o.n. de $E$.

**Preuve :**

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Pour $u \in O(E)$, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de $E$, $\forall i \in [\![1,n]\!],\ \|u(e_i)\| = \|e_i\| = 1$.
Puis $\forall i,j \in [\![1,n]\!],\ i \neq j \Longrightarrow \langle u(e_i), u(e_j)\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = 0$.
Donc $\mathscr{B}' = (u(e_1), ..., u(e_n))$ est une famille orthonormale de $E$ et $|\mathscr{B}'| = \dim E < \infty$ donc $\mathscr{B}'$ est b.o.n de $E$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ Pour $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de $E$ tq $u(\mathscr{B}) = (e'_1, ..., e'_n)$ soit encore b.o.n. de $E$.
Soit $x \in E$ : $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, puis $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car b.o.n. et $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i e'_i$.
Puis $\|u(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car $\mathscr{B}'$ est b.o.n. puis $\forall x \in E,\ \|x\| = \|u(x)\|$ donc $u \in O(E)$.

**Théorème 7: Caractérisation des isométries. (4)**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes :
1. $u \in O(E)$.
2. Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de $E$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.
3. Il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. de $E$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.

**Preuve :**

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ $u \circ u^* = \mathrm{Id}_E \iff \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = I_n$ i.e. $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = I_n \Longrightarrow u \circ u^* = \mathrm{Id}_E$.

**Rappel**

Les propriétés démontrées sur les isométries sont les mêmes que celles sur les matrices orthogonales.

| | |
|---|---|
| $u \in O(E)$ | $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$ |
| $u$ est inversible et $u^{-1} = u^*$ | $A$ est inversible et $A^{-1} = A^\top$ |
| $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$ | $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \|AX\| = \|X\|$ |
| $\forall x, y \in E,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$ | $\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \langle AX, AY\rangle = \langle X, Y\rangle$ |
| $u$ envoie une b.o.n. sur une b.o.n. | Les colonnes de $A$ sont orthonormées par le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$. |
| $\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$ | $\mathrm{Sp}A \subset \{-1, 1\}$ |

**Proposition 8**

Soit $u \in O(E)$, alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

**Preuve :**

Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de $E$ et $u \in O(E)$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$ donc $\det(u) = \det(A) \in \{-1, 1\}$.

**Proposition 9**

Soit $s$ une symétrie de $E$, alors $s$ est une isométrie ssi $s$ est une symétrie orthogonale.

**Preuve :**

$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $x \in E$ : $\exists y \in F,\ \exists z \in F^\perp,\ x = y + z$ puis $s(x) = y - z$.
Ainsi, $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|s(x)\|^2$ avec le théorème de Pythagore.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soient $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $G = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$. Il s'agit de démontrer que $F \perp G$.
Soit $x \in F$ et $y \in G$. Alors $s(x + y) = x - y$ et $\|x - y\| = \|s(x + y)\| = \|x + y\|$.
Donc $\|x - y\|^2 = \|x + y\|^2$ donc $\|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ donc $\langle x, y\rangle = 0$.

**Exemple 10**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, y\rangle = 0 \Longrightarrow \langle u(x), u(y)\rangle = 0$.
Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\| = \lambda\|x\|$.

**Solution :**

**Analyse.** Supposons que $\lambda$ existe, alors pour $x_0 \in S(0, 1)$ : $\|u(x_0)\| = \lambda\|x_0\| = \lambda$.
Soient $x, y \in S(0, 1)$. $\langle x + y, x - y\rangle = \|x\|^2 + \langle y, x\rangle - \langle x, y\rangle - \|y\|^2 = 0$.
Donc $\langle u(x + y), u(x - y)\rangle = 0$ donc $\langle u(x) + u(y), u(x) - u(y)\rangle = 0$ donc $\|u(x)\|^2 = \|u(y)\|^2$.
Soit $x \in E$, si $x = 0$, alors $u(x) = \lambda x$ est vérifié.
Sinon, $\lambda = \|u(\frac{x}{\|x\|})\| = \frac{1}{\|x\|}\|u(x)\|$, on a bien $\|u(x)\| = \lambda\|x\|$.

## 2 Isométries du plan.

**Proposition 11**

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in \mathbb{R} \right\}; \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Alors $\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R},\ R(\theta+\theta') = R(\theta) \times R(\theta')$.

**Preuve :**

$\boxed{\subset}$ Soit $A \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \end{cases}$$

On a $\det(A) = 1 \iff ad - bc = 1$ et $a^2 + c^2 = 1 \Longrightarrow |a| \leq 1 \Longrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R},\ a = \cos\theta$ puis $c = \sin\theta$.
De même, $d^2 + b^2 = 1$ donc $\exists \theta' \in \mathbb{R},\ d = \cos\theta'$ et $b = -\sin\theta'$. On peut supposer $\theta, \theta' \in [0, 2\pi[$.
Il reste $ab + cd = 0$ et $ad - bc = 1$ doncc $\sin(\theta - \theta') = 0$ et $\cos(\theta - \theta') = 1$ donc $\theta = \theta'$.
$\boxed{\supset}$ $R(\theta) \in O_2(\mathbb{R})$ et $\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ donc $R(\theta) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.
Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

$$R(\theta)R(\theta') = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' & -\cos\theta\sin\theta' - \sin\theta\cos\theta' \\ \sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta' & \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\theta') & -\sin(\theta+\theta') \\ \sin(\theta+\theta') & \cos(\theta+\theta') \end{pmatrix} = R(\theta+\theta').$$

**Exercice 1**

Soit $R(\theta) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$.

1. Montrer que $R(\theta)$ est diagonalisable ssi $\theta \in \{0, \pi\}$.
2. Montrer que $R(\theta) \in \mathscr{M}_2(\mathbb{C})$ est toujours diagonalisable.

**Solution :**

$\boxed{1.}$ $\chi_{R(\theta)} = X^2 - \mathrm{Tr}(R(\theta)) + \det(R(\theta)) = X^2 - 2\cos\theta X + 1$, $\Delta = 4(\cos^2\theta - 1) \leq 0$.
Si $\theta \in ]0, 2\pi[$ et $\theta \neq \pi$, alors $\Delta < 0$ et $\chi_{R(\theta)}$ n'est pas scindé donc pas diagonalisable.
Si $\theta = 0$, alors $R(\theta) = I_n$ diagonalisable. Si $\theta = \pi$, alors $R(\theta) = -I_2$ diagonalisable.
$\boxed{2.}$ On a toujours $\chi_{R(\theta)} = X^2 - 2\cos\theta X + 1 = (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta})$.
Si $\theta \in \{0, \pi\}$, alors $R(\theta)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ donc dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$.
Sinon, $e^{i\theta} \neq e^{-i\theta}$ puis $\chi_{R(\theta)}$ est SRS dans $\mathbb{C}[X]$, donc $R(\theta)$ est diagonalisable.

**Proposition 12: Rotation dans un espace orienté.**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien de dimension 2 et orienté.
Soit $u \in \mathrm{SO}(E)$ et $\mathscr{B}$ une base directe de $E$. Alors $\exists! \theta \in [0, 2\pi[,\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.

**Preuve :**

Puisque $\mathscr{B}$ est une b.o.n. de $E$, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_2(\mathbb{R})$, et $\det(u) = 1$ donc $\det(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)) = 1$.
Donc $\exists! \theta \in [0, 2\pi],\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
Soient $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ deux bases directes de $E$. Notons $P \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$.
Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = P\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)P^{-1}$, donc $\exists! \theta'' \in [0, 2\pi[,\ P = R(\theta'')$.
Donc $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = P\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)P^{-1} \iff R(\theta) = R(\theta'')R(\theta')(R(\theta)'')^{-1} = R(\theta')$.

**Proposition 13**

$$O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in [0, 2\pi[ \right\}.$$

**Preuve :**

$\boxed{\subset}$ Pareil qu'en proposition 11.

$\boxed{\supset}$ Soit $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$.

On a $\det(S(\theta)) = -(\cos^2\theta + \sin^2(\theta)) = -1$ donc $S(\theta) \in O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, et $S(\theta)^2 = I_2$.

**Proposition 14**

$S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \in O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $S(\theta) = R(\frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R(\frac{\theta}{2})^{-1}$.

**Preuve :**

$\chi_{S(\theta)} = X^2 - \mathrm{Tr}(S(\theta))X + \det(S(\theta)) = (X-1)(X+1)$, donc $\chi_{S(\theta)}$ est SRS donc $S(\theta)$ est diagonalisable.
De plus, par Cayley-Hamilton, $S(\theta)^2 = I_n$ donc $S(\theta)$ est une symétrie.

$$\begin{aligned} R\left(\frac{\theta}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R\left(\frac{\theta}{2}\right)^{-1} &= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & -\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2} \\ -\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} & 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \\ 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} & -\cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} = S(\theta). \end{aligned}$$

**Proposition 15**

Soit $E$ euclidien de dimension 2 et $u \in O(E) \setminus \mathrm{SO}(E)$, $u$ est une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

**Preuve :**

Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de $E$, $u$ est isométrie et $\mathscr{B}$ b.o.n. donc $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_2(\mathbb{R})$, et $\det u = -1$.
Donc $\exists \theta \in [0, 2\pi[,\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = S(\theta)$. On a vu $A^2 = I_2$ donc $u^2 = \mathrm{Id}_E$, c'est une symétrie.
Or une symétrie est une isométrie ssi c'est une symétrie orthogonale, donc $u$ est une symétrie orthogonale.
Puis $\det(u) = -1$, donc $u$ n'est pas triviale, donc $u$ est symétrie orthogonale par rapport à $D = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$.

**Exemple 16**

Soit $E$ euclidien de dimension 2, $u \in \mathrm{SO}(E)$ et $a \in E$ unitaire. On note $\theta$ la mesure d'angle orienté de $u$.
$\hookrightarrow \cos\theta = \langle a, u(a) \rangle$ et $\sin\theta = [a, u(a)]$.

**Solution :**

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2)$ une b.o.n. directe quelconque de $E$. Alors $a = a_1 e_1 + a_2 e_2$; $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
Alors $\langle a, u(a) \rangle = a_1(\cos\theta a_1 - \sin\theta a_2) + a_2(\sin\theta a_1 + \cos\theta a_2) = \cos\theta \|a\|^2 = \cos\theta$.
Et $[a, u(a)] = \det_{\mathscr{B}}(a, u(a)) = \sin(\theta)(a_1^2 + a_2^2) = \sin\theta$.

## 3 Réduction des isométries.

**Proposition 17**

Soit $u \in O(E)$ et $F$ un sous-espace de $E$ stable par $u$. Alors $u(F) = F$ et $u(F^\perp) \subset F^\perp$.
De plus, $u_F \in O(F)$ et $u_{F^\perp} \in O(F^\perp)$.

**Preuve :**

Notons $n$ la dimension de $E$ et $p$ la dimension de $F$.
Par hypothèse, $u(F) \subset F$, et $u$ est bijectif donc $\dim u(F) = \dim F$ donc $u(F) = F$.
Soit $y \in u(F^\perp)$ : $\exists x \in F^\perp,\ y = u(x)$ et $z \in F$ : $\exists t \in F,\ z = u(t)$.
Puis $\langle y, z\rangle = \langle u(x), u(t)\rangle = \langle x, t\rangle = 0$ donc $u(F^\perp) \subset F^\perp$.
On a $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\| \Longrightarrow \forall x \in F,\ \|u_F(x)\| = \|x\|$, les endomorphismes induits sont toujours isométries.

**Rappel : Chapitre 9, Exemple 22.**

Soit $E$ un $\mathbb{R}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors il existe au moins une droite ou un plan stable par $u$.

**Théorème 18: Réduction des isométries.** ★

1. Soit $E$ de dimension $n$ et $u \in O(E)$, alors il existe $\mathscr{B}$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$. Avec $2s + p + q = n$.
2. Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. Alors $A$ est orthogonalement semblable à une matrice de la forme précédente.

**Preuve :**

$\boxed{1.}$ Par récurrence forte sur $n$.
Si $n = 1$, alors les seules applications linéaires en dimension 1 sont les homothéties.
Les seules homothéties qui sont des isométries sont $\pm\mathrm{Id}_E$, le résultat est trivial.
Si $n = 2$, alors $u$ est une isométrie du plan :
$\hookrightarrow$ Si $u$ est une rotation, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de $E$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
$\hookrightarrow$ Si $u$ est une symétrie orthogonale selon une droite, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de $E$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(1, -1)$.
Soit $n \geq 3$ tel que $\forall k < n$ ... Soit $u \in O(E)$ et $H$ stable par $u$, alors $u(H^\perp) \subset H^\perp$.
On a $\dim(H) < \dim(E) = n + 1$ et $\dim(H^\perp) \leq \dim(E)$, on applique l'hypothèse de récurrence.
Il existe $\mathscr{B}_1$ base de $H$ et $\mathscr{B}_2$ base de $H^\perp$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_{|H})$ et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2}(u_{|H^\perp})$ de la bonne forme.
On pose $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ qui est b.o.n. de $E$, et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_{|H}), \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2}(u_{|H^\perp}))$.
Quitte à permuter les vecteurs de $\mathscr{B}$, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ a la forme voulue.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$, et $u$ son alca. D'après le 1, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de $E$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = ...$
Notons $P$ la matrice de passage de $\mathscr{B}_C$ à $\mathscr{B}$, alors $P \in O_n(\mathbb{R})$ puis $A = P\mathrm{Diag}(...)P^{-1}$.
**Remarque.** On peut imposer l'unicité avec $p, q \in \{0, 1\}$.

**Corrolaire 19: Réduction des matrices de rotation.**

Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ Si $n$ est pair, $A$ est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s))$ avec $2s = n$.
$\hookrightarrow$ Si $n$ est impair, $A$ est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), 1)$.

**Preuve :**

Par le théorème précédent, $A$ est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$.
Et $\det(A) = (-1)^q$ donc $\det(A) = 1 \iff q$ pair donc $q = 0$ et si $n$ pair, $p = n - 2s = 0$; sinon $p = 1$.

**Proposition 20**

$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

**Preuve :**

Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. Par théorème de réduction, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$, $\quad A = P\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p)P^{-1}$.
On pose $\varphi : t \mapsto P\mathrm{Diag}(R(t\theta_1), ..., R(t\theta_s), I_p)P^{-1} \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, continue sur $[0, 1]$ car tous les coefficients de $\varphi(t)$ sont des combinaisons linéaires de $\cos(t\theta_i)$ et $\sin(t\theta_i)$, et $\varphi(0) = I_n$, $\varphi(1) = A$.

**Exemple 21**

1. Déterminer les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ diagonalisables.
2. Montrer que toutes les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ sont diagonalisables dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

**Solution :**

$\boxed{1.}$ Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$ : $A \sim \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$ avec $2s + p + q = n$.
Puis $A$ diagonalisable ssi $\forall i \in [\![1, s]\!]$, $R(\theta_i)$ diagonalisable ssi $s = 0$ ssi $A \sim \mathrm{Diag}(1, ..., 1, -1, ..., -1)$ ssi $A^2 = I_n$.
Donc $A$ est diagonalisable ssi son endomorphisme canoniquement associé est une symétrie orthogonale.
$\boxed{2.}$ On a vu que $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$.
Donc $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ donc $A$ aussi.

**Proposition 22: Cas de la dimension 3.**

Soit $E$ euclidien de dimension 3, et $u$ une rotation de $E$ non triviale.
Alors $1 \in \mathrm{Sp}(u)$ et $\dim E_1 = 1$, où $\mathscr{D} = E_1$ est appelé **axe de la rotation**.
Alors $\mathscr{H} = \mathscr{D}^\perp$ est un plan stable par $u$, $u_{|\mathscr{H}}$ est une rotation du plan $\mathscr{H}$.
Il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. directe de $E$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), 1)$.

**Preuve :**

D'après le théorème de réduction des isométries, il existe $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ b.o.n. de $E$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), 1)$.
Alors $u(e_3) = e_3$ donc $1 \in \mathrm{Sp}(u)$, puis $\dim E_1 = 1$ donc $\mathscr{D} = \mathrm{Vect}(e_3)$ est axe de la rotation.
Puis $\mathscr{H} = \mathscr{D}^\perp$ est stable par $u$ et $u_{|\mathscr{H}} \in O(\mathscr{H})$ isométrie du plan non triviale.
Si $e_3$ est choisi comme vecteur directeur de $\mathscr{D}$, $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est directe. Sinon $\mathscr{B} = (e_2, e_1, e_3)$ l'est.

**Exercice 2**

Soit $E$ euclidien de dimension 3 et $u \in O(E) \setminus \mathrm{SO}(E)$ isométrie négative.

1. Montrer qu'il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. de $E$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), -1)$.
2. Montrer que $u$ est la composée d'une rotation et d'une symétrie orthogonale. On pourra calculer :

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Vérifier que $\mathrm{Tr}(u) = 2\cos\theta - 1$.
4. Étudier les cas particuliers : $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

# 4 Endomorphismes symétries (et antisymétriques).

## 4.1 Généralités.

**Définition 23**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que $u$ est **symétrique** (ou **autoadjoint**) ssi $u = u^*$.
On notera $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques.

**Définition 24**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que $u$ est **antisymétrique** ssi $u = -u^*$.
On notera $\mathcal{A}(E)$ l'ensemble des endomorphismes antisymétriques.

**Proposition 25**

$\mathcal{S}(E)$ et $\mathcal{A}(E)$ sont des $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

**Preuve :**

$\boxed{\mathcal{S}(E)}$ C'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{L}(E)$ :
$\hookrightarrow$ $0 \in \mathcal{S}(E)$ et $\forall u, v \in \mathcal{S}(E),\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ (u + \lambda v)^* = u^* + \lambda v^* = u + \lambda v$.
$\boxed{\mathcal{A}(E)}$ Pareil.

**Proposition 26**

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.

$$u \in \mathcal{A}(E) \iff \forall x \in E,\ \langle u(x), x \rangle = 0.$$

**Preuve :**

$\boxed{\implies}$ $\forall x, y \in E,\ \langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$. Puis $y = x$.
$\boxed{\impliedby}$ Soient $x, y \in E$ : $\langle u(x + y), x + y \rangle = 0$ puis $\langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$.

**Proposition 27**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. Il y a équivalence :

1. $u \in S(E)$.
2. La matrice de $u$ dans toute b.o.n. de $E$ est symétrique.
3. Il existe une b.o.n. de $E$ telle que la matrice de $u$ dans cette base soit symétrique.

**Preuve :**

$\boxed{1 \implies 2}$ Soit $\mathscr{B}$ b.o.n. de $E$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^*)$ donc $u = u^* \implies \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top$.
$\boxed{2 \implies 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \implies 1}$ Déjà fait.

**Lemme 28**

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u).$$

**Preuve :**

Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de $E$. Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = (\langle u(e_j), e_i\rangle)_{i,j}$.

$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle e_i, u^*(e_i)\rangle = \mathrm{Tr}(u^*).$$

Donc $\mathrm{Tr}(u^*v) = \mathrm{Tr}((u^*v)^*) = \mathrm{Tr}(v^*u)$.

**Exercice 3**

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u).$$

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien, on pose $\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(u^*v)$ pour $u, v \in \mathscr{L}(E)$.
Montrer que l'on a défini un produit scalaire sur $\mathscr{L}(E)$. Montrer que $\mathscr{L}(E) = \mathscr{S}(E) \oplus \mathscr{A}(E)$.

**Solution :**

Posons $\varphi : (u, v) \mapsto \mathrm{Tr}(u^*v)$.
$\hookrightarrow$ Symétrique : lemme.
$\hookrightarrow$ Bilinéaire : soient $u, u', v \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\varphi(u + \lambda u', v) = \mathrm{Tr}((u + \lambda u')^*v) = \mathrm{Tr}((u^* + \lambda u'^*)v) = \mathrm{Tr}(u^*v + \lambda u'^*v) = \varphi(u, v) + \lambda\varphi(u', v).$$

$\hookrightarrow$ Positive : $\varphi(u, u) = \mathrm{Tr}(u^*u) = \sum_{i=1}^{n} \langle (u^*u)(e_i), e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), u(e_i)\rangle = \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2 \geq 0$.
$\hookrightarrow$ Définie : $\varphi(u, u) = 0 \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2 = 0 \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = 0_E$, $u$ est nul sur une base donc nul.
On a déjà $\forall u \in \mathscr{L}(E),\ u = \frac{u+u^*}{2} + \frac{u-u^*}{2}$ donc $\mathscr{L}(E) = \mathscr{S}(E) + \mathscr{A}(E)$.
Ensuite, pour $u \in \mathscr{S}(E)$ et $v \in \mathscr{A}(E)$, $\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(u^*v) = \mathrm{Tr}(uv)$ et $\langle v, u\rangle = \mathrm{Tr}(v^*u) = -\mathrm{Tr}(vu) = -\mathrm{Tr}(uv)$.

**Proposition 29**

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien.

1. Soit $p$ un projecteur de $E$, $p$ est orthogonal ssi $p$ est autoadjoint.
2. Soit $s$ une symétrie de $E$, $s$ est orthogonale ssi $s$ est autoadjointe.

**Preuve :**

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit $p$ un projecteur orthogonal sur $F$. Soit $(x, y) \in E^2$.
Alors $\langle p(x), y\rangle = \langle p(x), p(y) + (y - p(y))\rangle = \langle p(x), p(y)\rangle + 0 = \langle x, p(y)\rangle$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Soit $p$ un projecteur sur $F$ dans la direction $G$. Vérifions $F \perp G$.
Soient $x \in F, y \in G$. Alors $\langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$ donc $\langle x, y\rangle = \langle x, 0_E\rangle = 0$, donc $F \perp G$.
Donc $F \subset G^\perp$, puis $\dim F = \dim G^\perp$ donc $F = G^\perp$.
$\boxed{2.}$ Notons $p$ le projecteur associé à $s$ : $s + \mathrm{Id}_E = 2p$.
Alors $s$ est symétrie orthogonale ssi $G = F^\perp$ ssi $p$ est projection orthogonale ssi $p = p^*$.
Puis $s = 2p - Id_E$ donc $s^* = 2p^* - \mathrm{Id}_E = 2p - \mathrm{Id}_E = s$ donc $s$ est autoadjointe.

**Rappel**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Dans une base quelconque, avec $x, y \in E$ et $X, Y$ les vecteurs associés :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle = X^\top \mathrm{Mat}(\langle e_i, e_j \rangle) Y$$

Dans une base orthonormée, $\langle x, y \rangle = X^\top Y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$. Et pour $u \in \mathscr{L}(E)$ :

$$\langle u(x), y \rangle = X^\top \mathrm{Mat}(u)^\top Y.$$

**Proposition 30**

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

1. $\left[\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A Y = 0\right] \iff A = 0.$
2. $\left[\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X = 0\right] \iff A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}).$

**Preuve :**

$\boxed{1.}$ On spécifie en $E_i$, $E_j$ : $E_i^\top A E_j = a_{i,j} = 0$ pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\langle x, u(x) \rangle = X^\top A X$ donc $u$ est antisymétrique donc $A$ l'est.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ idem.

**Exercice 4**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Montrer que $\mathrm{Ker} u = (\mathrm{Im} u)^\perp$.

**Solution :**

Soit $x \in \mathrm{Ker} u$, $y \in \mathrm{Im} u$ : $\exists z \in E,\ y = u(z)$. Alors $\langle x, y \rangle = \langle x, u(z) \rangle = \langle u(x), z \rangle = 0$. Donc $\mathrm{Ker} u \subset (\mathrm{Im} u)^\perp$.
Par théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker} u = \dim (\mathrm{Im} u)^\perp$, donc $\mathrm{Ker} u = (\mathrm{Im} u)^\perp$.

**Proposition 31: Caractérisation des matrices de projection et symétries orthogonales.**

1. Soit $P \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est une matrice de projection ssi $P^2 = P$.
   C'est une matrice de projection orthogonale ssi $P^2 = P$ et $P^\top = P$.
2. Soit $S \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est une matrice de symétrie ssi $S^2 = I_n$.
   C'est une symétrie orthogonale ssi $S^2 = I_n$ et $SS^\top = I_n$ ssi $S^2 = I_n$ et $S^\top = S$.

**Preuve :**

$\boxed{1.}$ On note $p$ l'endomorphisme canoniquement associé à $P$. On a vu $p$ orthogonal ssi $p^2 = p$ et $p^* = p$.
Donc $p$ orthogonal ssi $P^2 = P$ et $P^\top = P$.
$\boxed{2.}$ On note $s$ l'endomorphisme canoniquement associé à $S$. On a vu $s$ orthogonal ssi $s^2 = I_n$ et $s^* = s$.

**Proposition 32**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$ et $F$ un sous-espace stable par $u$. Alors $F^\perp$ est stable par $u$.
De plus, les endomorphismes induits $u_{|F}$ et $u_{|F^\perp}$ sont encore symétriques.

**Preuve :**

On rappelle que $F$ est stable par $u$ implique que $F^\perp$ est stable par $u^*$, ici $u = u^*$.

**Exemple 33**

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$ et $\lambda, \mu \in \mathrm{Sp}(u)$. Si $\lambda \neq \mu$, alors $E_\lambda \perp E_\mu$.

**Solution :**

Soient $x \in E_\lambda$ et $y \in E_\mu$. On a $u(x) = \lambda x$ et $u(y) = \mu y$, et $\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle$.
Donc $\lambda\langle x, y\rangle = \mu\langle x, y\rangle$ donc $(\lambda - \mu)\langle x, y\rangle = 0_{\mathbb{R}}$ donc $\langle x, y\rangle = 0$ donc $E_\lambda \perp E_\mu$.

**Théorème 34: Théorème spectral.**

1. Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $A$ est orthogonalement diagonalisable : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
2. Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}$, $u$ est dz dans une b.o.n. et $E \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$.

Il est clair que $1 \iff 2$.

**Preuve :**

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de $E$ et $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) : A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Soit $x \in E$ de vecteur $X$.
Alors $u(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$. Montrons que $\lambda \in \mathbb{R}$ :

$$\overline{X}^\top AX = \overline{X}^\top \lambda X = \lambda \overline{X}^\top X = \lambda \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

Or $\overline{X}^\top AX = (A\overline{X})^\top X = \overline{\lambda X}^\top X = \overline{\lambda} \sum_{i=1}^n |x_i|^2$ donc $\lambda = \overline{\lambda}$ donc $\lambda \in \mathbb{R}$.
Notons $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$, c'est un ssev de $E$ stable par $u$, on suppose par l'absurde que $F \subsetneq E$.
Alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F^\perp$ est stable par $u$ car symétrique, et $u_{|F^\perp}$ est symétrique : ses valeurs propres sont réelles.
Soit $\mu$ une vp de $u_{|F^\perp}$, et $x$ $\overrightarrow{vp}$ associé, alors $x \in F^\perp \cap F$ donc $x = 0_E$, absurde. Donc $F = E$.
Donc $u$ est diagonalisable par concaténation des b.o.n. de $E_\lambda$.

**Exemple 35**

Orthodiagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R})$$

**Solution :**

D'après le théorème spectral, $A$ est orthogonalement diagonalisable.
On a $\chi_A = (\lambda - 2)\left[(\lambda - 2)^2 - 2\right] = (X - 2)(X - 2 - \sqrt{2})(X - 2 + \sqrt{2})$.
$E_2 = \mathrm{Vect}(1, 0, 1)$, $E_{2-\sqrt{2}} = \mathrm{Vect}(1, -\sqrt{2}, 1)$ et $E_{2+\sqrt{2}} = \mathrm{Vect}(1, \sqrt{2}, 1)$.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in O_3(\mathbb{R})$$

Puis $A = PDP^\top$ avec $D = \mathrm{Diag}(2, 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2})$.

**Exemple 36**

Orthodiagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R})$$

**Solution :**

Par théorème spectral, elle est orthogonalement diagonalisable.
On a $\mathrm{rg}(A) = 1$, donc $\dim \mathrm{Ker} A = 2$, donc $0 \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\dim E_0 = 2$ et $\mathrm{Tr}(A) = 3$ donc $3 \in \mathrm{Sp}(A)$.
On a $E_3 = \mathrm{Vect}((\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}))$ et $E_0 = E_3^{\perp} = \mathrm{Vect}((-1, 1, 0), (1, 1, -2))$...

**Exemple 37**

$$\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(C)$$

**Solution :**

Le thérorème spetral ne s'applique pas ici car $A \notin \mathscr{S}_2(\mathbb{R})$.
On a $\chi_A = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X + \det(A) = X^2$, donc $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, donc $A$ est nilpotente, pas diagonalisable car $A \neq 0$.

**Proposition 38**

1. Soit $A, B \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ tels que $AB = BA$. Alors $A$ et $B$ sont orthogonalement diagonalisables.
2. Pour $u, v \in \mathscr{S}(E)$, si $uv = vu$, alors il existe une b.o.n. commune de $\overrightarrow{vp}$ de $u$ et $v$.

**Preuve :**

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $E = \bigoplus E_\lambda$, et $uv = vu$ implique $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $v(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
Notons $v_\lambda = v_{|E_\lambda} \in \mathscr{L}(E_\lambda)$, c'est encore un endomorphisme symétrique : $v_\lambda \in \mathscr{S}(E_\lambda)$.
D'après le théorème spectral, on peut choisir une b.o.n. $\mathscr{B}_\lambda$ de $E_\lambda$ constituée de $\overrightarrow{vp}$ de $v_\lambda$.
On pose $\mathscr{B}$ la concaténation des $\mathscr{B}_\lambda$, c'est une b.o.n. de $E$ et les vecteurs de $\mathscr{B}$ sont des $\overrightarrow{vp}$ de $v$, mais aussi de $u$.

**Proposition 39: Réciproque du théorème spectral.**

1. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = PDP^{-1}$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D \in O_n(\mathbb{R})$, alors $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, si il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de $E$ constituée de $\overrightarrow{vp}$ de $u$, alors $u \in \mathscr{S}(E)$.

**Preuve :**

$\boxed{1.}$ $A = PDP^\top$ donc $A^\top = PD^\top P^\top = A$.
$\boxed{2.}$ Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de $E$ telle que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = \lambda e_i$.
Soient $x, y \in E$. $\langle u(x), y \rangle = \sum_{i=1}^n y_i u(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i(\lambda_i x_i)$ et $\langle x, u(y) \rangle = \sum_{i=1}^n x_i(\lambda_i y_i)$.

**Exercice 5: Rayon spectral.**

1. Soit $E$ un evdf, $u \in \mathscr{L}(E)$, $p(u) = \max\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$ (rayon spectral). Montrer que $p(u) \leq |||u|||$.
2. Pour $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$, $\alpha = \min\{\lambda, \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$ et $p = \max\{\lambda, \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$. Montrer que $\forall x \in E,\ \alpha\|x\|^2 \leq \langle u(x), x\rangle \leq \beta\|x\|^2$.
3. Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Montrer que $p(x) = |||u|||$.

**Solution :**

$\boxed{1.}$ Supposons que $u$ admet au moins une valeur propre réelle.
Soit $\lambda$ une valeur propre de $u$ : $\exists x \in E,\ u(x) = \lambda x$ puis $\|u(x)\| = |\lambda|\|x\|$ puis $|\lambda| = \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leq |||u|||$.
Par passage au max : $p(u) \leq |||u|||$.
$\boxed{2.}$ Soit $u \in S(E)$, d'après le théorème spectral, il existe $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de $E$ de $\overrightarrow{vp}$ de $u$ : $u(e_i) = \lambda_i e_i$.
Alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \exists \lambda_i \in \mathbb{R},\ u(e_i) = \lambda_i e_i$. Soit $x \in E$ : $u(x) = \sum_{i=1}^n (\lambda_i x_i) e_i$.
Puis $\langle u(x), x\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car $\mathscr{B}$ est une b.o.n.
Par choix de $\alpha$ et $\beta$ : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \alpha \leq \lambda_i \leq \beta$ puis $\alpha x_i^2 \leq \lambda_i x_i^2 \leq \beta x_i^2$.
Donc $\alpha\|x\|^2 \leq \langle u(x), x\rangle \leq \beta\|x\|^2$ en sommant.
$\boxed{3.}$ On a déjà $p(u) \leq |||u|||$. Soit $x \in E$ et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de $\overrightarrow{vp}$ de $u$.
Alors $\|u(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n (\lambda_i x_i)^2$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ donc $\|u(x)\|^2 \leq p(u)^2\|x\|^2$ donc $\forall x \neq 0,\ \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leq p(u)$.
Par passage au sup, $|||u||| \leq p(u)$. Donc $p(u) = |||u|||$.

## 5 Endomorphismes symétriques positifs.

**Définition 40: Endomorphisme symétrique positif.**

Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
1. $A$ est positive ssi $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top AX \geq 0$.
2. $A$ est définie positive ssi $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul, $X^\top AX > 0$.

**Définition 41**

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$.
1. $u$ est positive ssi $\forall x \in E,\ \langle u(x), x\rangle \geq 0$.
2. $u$ est strictement positive ssi $\forall x \in E,\ x \neq 0 \Longrightarrow \langle u(x), x\rangle > 0$.

**Proposition 42**

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Il y a équivalence :
1. $u$ est positif.
2. La matrice de $u$ dans n'importe quelle base de $E$ est positive.
3. Il existe une b.o.n. de $E$ telle que la matrice de $u$ dans $E$ soit positive.

**Preuve :**

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de $E$ et $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$.
Déjà, $u \in \mathscr{S}(E)$ donc $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et pour $X = (x_i)_i \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ avec $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.
On sait que $\langle x, u(x)\rangle = X^\top AX$ donc $X^\top AX \geq 0$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ trivial; $\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ facile.

**Notation**

On notera $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles positives.
On notera $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles définies positives.
On notera $\mathscr{S}^+(E)$ l'ensemble des matrices symétriques de $E$ positives.
On notera $\mathscr{S}^{++}(E)$ l'ensemble des matrices symétriques de $E$ définies positives.

**Proposition 43: Propriétés topologiques.**

1. $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
2. $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

**Preuve :**

$\boxed{1.}$ Soit $(A_k)_k \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente de limite $A$. Par hypothèse, $\forall k \in \mathbb{N},\ A_k^\top = A_k$.
De plus, la transposition est linéaire en dimension finie, donc continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
Par passage à la limite, $A^\top = A$, donc $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{2.}$ Soit $(A_k)_k \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente de limite $A$. Déjà, $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ par la question précédente.
Ensuite, pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a $\forall k \in \mathbb{N},\ X^\top A_k X \geq 0$.
Puis $M \mapsto X^\top M X$ est continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ car lin. en dimension finie, donc par passage à la limite, $X^\top A X \geq 0$.
C'est vrai pour tout $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, donc $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

**Exercice 6**

Montrer que si $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ [A]_{i,i} \geq 0$.

**Solution :**

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j} \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
Par hypothèse, $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X \geq 0$. On spécifie en $E_{i_0}$ :

$$\forall i_0 \in [\![1, n]\!],\ E_{i_0}^\top A E_{i_0} = a_{i_0,i_0} \geq 0.$$

**Remarque.** Si $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ [A]_{i,i} > 0$.

**Proposition 44: Caractérisation des matrices symétriques positives.**

1. $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}A \subset \mathbb{R}_+$
2. $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}A \subset \mathbb{R}_+^*$ (facile avec 1.)
3. $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

**Preuve :**

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ : $\exists X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ AX = \lambda X$. Puis $X^\top A X = \lambda X^\top X = \lambda \geq 0$ car $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ $A$ est alors symétrique réelle puis par théorème spectral : $A$ est orthogonalement diagonalisable.
Ainsi, $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
Alors pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X = X^\top P D P^\top X$, on pose $Y = P^\top X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
Alors $X^\top A X = Y^\top D Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq 0$, donc $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
$\boxed{3.}$ On rappelle que $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \iff 0 \notin \mathrm{Sp}(A)$, puis $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$ ssi $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$

**Exercice 7**

1. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Vérifier que $AA^\top \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $A^\top A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
2. Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Vérifier que $AA^\top \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A^\top A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

---

**Solution :**

$\boxed{1.}$ Déjà, $(AA^\top)^\top = (A^\top)^\top A^\top = AA^\top$ donc $AA^\top \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$; de même, $A^\top A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
Pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $X^\top(AA^\top)X = (X^\top A)A^\top X = (A^\top X)^\top A^\top X = \|A^\top X\|^2 \geq 0$.
$\boxed{2.}$ Pour $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, $\det(AA^\top) = \det A \det A^\top = \det(A)^2 \neq 0$ : $AA^\top \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, idem pour $A^\top A$.
Puis $AA^\top \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec 1, donc $AA^\top \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) = \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

**Exercice 8: Matrice de Hilbert.**

Montrer que les valeurs propres de $H = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{i,j} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ sont toutes positives.

---

**Solution :**

**Ne pas chercher à calculer $\chi_H$.**

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Déjà, $H$ est symétrique réelle, donc par théorème spectral, les vp de $H$ sont toutes réelles et $H$ est orthodz.
On sait que $H \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}(H) \subset \mathbb{R}_+$. Soit $X = (x_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On remarque $\int_0^1 t^k \mathrm{d}t = \frac{1}{k+1}$.

$$X^\top HX = \sum_{i,j} x_i x_j \frac{1}{i+j-1} = \sum_{i,j} x_i x_j \int_0^1 t^{i+j-2}\mathrm{d}t = \int_0^1 \sum_{i,j} x_i x_j t^{i-1} t^{j-1}\mathrm{d}t = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1}\right)^2 \mathrm{d}t \geq 0.$$

Donc $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X^\top HX \geq 0$ donc $H \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Comme $H \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$, $H \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \iff H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
Supposons $X^\top HX = 0$. Montrons que $X = 0$. On a $\int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1}\right) \mathrm{d}t = 0$.
C'est une intégrale nulle d'une fonction **continue** positive, donc $\forall t \in [0,1]$, $\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1} = 0$.
C'est un polynôme nul sur $[0,1]$, il est nul partout par rigidité. Donc $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $x_i = 0$ donc $X = 0$.
Ainsi, $H \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ donc $H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

**Exercice 9**

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel et $(a_1, ..., a_n) \in E^n$.

1. Montrer que $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff (a_1, ..., a_n)$ libre.
3. Retrouver que $H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

---

**Solution :**

$\boxed{1.}$ Déjà, $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ par symétrie du produit scalaire. Soit $X = (x_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
On a $X^\top \mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n)X = \sum_{i=1}^n x_i x_j \langle a_i, a_j\rangle = \langle \sum_{i=1}^n x_i a_i, \sum_{j=1}^n x_j a_j\rangle = \| \sum_{i=1}^n x_i a_i\|^2 \geq 0$.
$\boxed{2.}$ $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ ssi $(a_1, ..., a_n)$ est libre et $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \cap \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ donc...
$\boxed{3.}$ On pose $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\langle P, A\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\mathrm{d}t$. On pose $(P_1, ..., P_n)$ où $P_i = X^{i-1}$ : $\langle P_i, P_j\rangle = \frac{1}{i+j-1}$.
Alors $H = \mathrm{Gram}(P_1, ..., P_n)$ puis $H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ car $(1, X, ..., X^{n-1})$ est libre.

**Exercice 10**

Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Est-elle une matrice de Gram ?

**Solution :**

On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel.
Par théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$ où $D = \mathrm{Diag}(\lambda_i)$.
Soit $\Delta = \mathrm{Diag}(\sqrt{\lambda_i})$, alors $A = P\Delta^2 P^\top = P\mathscr{D}(P\Delta)^\top$ et pour $M = (P\Delta)^\top,\ A = M^\top M$.
Notons $v_1, ..., v_n$ les colonnes de $M$. Alors $[M^\top M]_{i,j} = \langle v_i, v_j\rangle$ donc $A = (\langle v_i, v_j\rangle)$.
Donc $A = \mathrm{Gram}(v_1, ..., v_n)$.

**Exercice 11: Inégalité d'Hadamard.**

Soit $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique et $P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

1. Soit $\mathscr{B}$ b.o.n. de $\mathbb{R}^n$ telle que $P = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_c,\mathscr{B}}$.
   On se donne $\mathscr{C}$ une orthonormalisée de Schmidt de $\mathscr{B}$ et $Q = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}$.
   Montrer que $PQ \in O_n(\mathbb{R})$, en déduire $P = OT$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $T \in \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R})$ avec unicité.
2. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Montre que $\det(A)^2 \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j}^2\right)$.

**Solution :**

$\boxed{1.}$ $PQ$ est la matrice de passage de $\mathscr{B}_C$ à $\mathscr{C}$, donc $PQ \in \Omega_n(\mathbb{R})$ et $P = PQQ^{-1}$. On pose $T = Q^{-1}$.
Notons $\mathscr{C} = (a_1, ..., a_n)$ ses colonnes et $\mathscr{B} = (e_1', ..., e_n')$, alors $Q = (\langle e_j', e_i\rangle)_{i,j}$.
De plus, $\mathscr{C}$ est orthonormalisée de Schmidt : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ e_i' \in \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_n)$ et $\langle e_i', e_i\rangle > 0$.
Donc $Q^{-1}$ est triangulaire supérieure réelle à diagonale strictement positive.
Sq $P = OT = O'T'$, avec $O, O' \in O_n(\mathbb{R})$, $T, T' \in \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R})$ : $(O')^{-1}O = T'T^{-1}$ or $O_n(\mathbb{R}) \cap \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R}) = \{I_n\}$ donc $O' = O$ et $T = T'$.
$\boxed{2.}$ Si $A \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, c'est trivial.
Si $A = OT$, où $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $T \in \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $e_1', ..., e_n'$ les colonnes de $A$. C'est une base car $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
On note $e_1, ..., e_n$ son orthonormalisée de Schmidt, alors

$$\det(A)^2 = \det(O)^2\det(T)^2 = \det(T)^2 = \prod_{i=1}^n \langle e_i', e_i\rangle^2 \leq \prod_{i=1}^n \|e_i'\|^2 \cancel{\|e_i\|^2} = \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{j,i}^2$$

**Exercice 12: Décomposition polaire.**

1. Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A^\top A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
   En déduire que $\exists!(O, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = OS$.
2. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\exists(O, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}),\ A = OS$.

**Solution :**

$\boxed{1.}$ On sait déjà que $A^\top A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Supposons qu'il existe $O, S$ tels que $A = OS$.
Alors $A^\top A = S^\top O^\top OS = S^2$, or toute matrice de $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ possède une unique racine carrée dans $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ donc $S$ est déterminée de manière unique puis $O = AS^{-1}$ aussi.
Soit alors $S$ l'unique racine de $A^\top A$ dans $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O = AS^{-1}$, alors $O = AS^{-1} \Longrightarrow OS = A$, $OO^\top = I_n$.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Par densité de $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $\exists(A_n) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ telle que $A_n \to A$.
On a $\forall k \in \mathbb{N},\ \exists O_k \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists S_k \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}),\ A_k = O_k S_k$.
Or $O_n(\mathbb{R})$ est compact, donc $\exists \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $O_{\varphi(k)} \to O \in O_n(\mathbb{R})$.
On a $A_{\varphi(k)} \to A$ (extraite), donc $S_{\varphi(k)} = O_{\varphi(k)}^\top A_{\varphi(k)} \to O^\top A$ par continuité de la transposée et du produit.
Alors $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S_n^+(\mathbb{R})$ est fermé donc $S = O^\top A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

**Exercice 13: Racine carrée de matrices symétriques positives.**

1. Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que $\exists B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}),\ B^2 = A$.
2. Soit $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que $\exists B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $B^2 = A$.
3. Montrer l'unicité de $B$.

---

**Solution :**

$\boxed{1.}$ $A$ est symétrique réelle donc par théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
De plus, $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ donc $D = \mathrm{Diag}(\lambda_i)$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\lambda_i \geq 0$.
On pose $\Delta = \mathrm{Diag}(\sqrt{\lambda_i})$ et $B = P\Delta P^{-1}$, alors $B^2 = P\Delta^2 P^{-1} = A$, $B^\top = B$ et $\mathrm{Sp}(B) \subset \mathbb{R}_+$.
$\boxed{2.}$ $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ donc $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ donc $\lambda_i \neq 0$ donc $\mathrm{Sp}(B) \subset \mathbb{R}_+^*$.
$\boxed{3.}$ Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ tels que $A = B^2$.
On a $AB = B^2B = BB^2 = BA$ puis $A, B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ : $A = PDP^\top$ et $B = P\Delta P^\top$.
Puis $B^2 = A \iff \Delta^2 = D \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i^2 = \lambda_i \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i = \sqrt{\lambda_i}$.
Avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_i\}$ et $\mathrm{Sp}(B) = \{\mu_i\}$. On a donc montré que $B$ est determiné de manière unique.

**Exercice 14**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}^+(E)$.

1. Montrer qu'il existe $v \in \mathscr{S}^+(E)$ tel que $v^2 = u$.
2. Montrer l'unicité de $v$.

---

**Solution :**

$\boxed{1.}$ Par le théorème spectral, il existe $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de $E$ de $\overrightarrow{vp}$ de $u$.
On pose $v$ tel que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ v(e_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$. Alors $v^2(e_i) = \lambda_i e_i = u(e_i)$ donc $v^2 = u$.
De plus, $v \in \mathscr{S}^+(\mathbb{R})$ par réciproque du théorème spectral.
$\boxed{2.}$ Soit $v \in \mathscr{S}^+(E)$ tel que $v^2 = u$. On reprend $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de $E$.
Notons $E_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$, alors $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$ et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ v(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
Notons $v_i = v_{|E_{\lambda_i}}$ induit et diagonalisable. On a $\forall x \in E_{\lambda_i},\ v_i(x) = \lambda_i x$ alors $X^2 - \lambda_i$ annule $v_i$.
On a donc $\mathrm{Sp}(v_i) \subset \{-\sqrt{\lambda_i}, \sqrt{\lambda_i}\}$. Or $v_i \in \mathscr{S}^+(E)$ donc $\mathrm{Sp}(v_i) = \{\sqrt{\lambda_i}\}$. Or $v_i$ dz donc $v_i = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}_E$.
Donc tout $v_i$ est determiné uniquement donc $v$ aussi.

**Exercice 15**

Soit $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ et $f$ canoniquement associé avec $n \in \mathbb{N}$ impair.

1. Montrer que $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle f(x), y \rangle = -\langle x, f(y) \rangle$.
2. Montrer que $f$ admet 0 comme unique valeur propre réelle.
3. Montrer que $I_n - A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ et $I_n + A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
4. Soit $\mathscr{B} = (I_n - A)^{-1}(I_n + A)$. Montrer que $B \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

---

**Solution :**

$\boxed{1.}$ Pour $X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \langle AX, Y \rangle = (AX)^\top Y = X^\top(-A)Y = -\langle X, AY \rangle$.
$\boxed{2.}$ Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(f) : \exists x \in E^*,\ f(x) = \lambda x$. Alors $\langle f(x), x \rangle = -\langle x, f(x) \rangle$.
Alors $\langle \lambda x, x \rangle = -\langle x, \lambda x \rangle$ puis $\lambda \|x\|^2 = -\lambda \|x\|^2$ donc $\lambda = 0$ donc $\mathrm{Sp}(f) \subset \{0\}$.
On a $\det(A) = \det(A^\top) = (-1)^n \det(A) = -\det(A) = 0$ donc 0 est vp. Donc $\mathrm{Sp}(f) = \{0\}$.
$\boxed{3.}$ $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ et $\lambda I_n - A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \iff \chi_A(\lambda) \neq 0 \iff \lambda \notin \mathrm{Sp}(A)$.
Or $1 \notin \mathrm{Sp}(A)$ donc $I_n - A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ puis $(I_n - A)^\top = I_n + A$ donc $I_n + A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{4.}$ $B^\top B = ... = I_n$ et $\det(B) = \frac{\det(I_n + A)}{\det(I_n - A)} = \frac{\det(*^\top)}{\det(*)} = 1$.