

# 2010年普通高等学校招生全国统一考试 数学（理）

## 第I卷 选择题（共40分）

一、 本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的4个选项中，选出符合题目要求的一项。



1, 集合  $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x < 3\}$ ,  $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 9\}$ , 则  $P \cap M =$

- (A)  $\{1, 2\}$  (B)  $\{0, 1, 2\}$  (C)  $\{x \mid 0 \leq x < 3\}$  (D)  $\{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$

2, 在等比数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 1$ , 公比  $|q| \neq 1$ . 若  $a_m = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$ , 则  $m =$




- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

3, 一个长方体去掉一个小长方体, 所得集合体的正（主）视图与侧（左）视图分别如右图所示, 则该几何体的俯视图为



正（主）视

侧（左）视



4, 8名学生和2位老师站成一排合影, 2位老师不相邻的排法总数为

- (A)  $A_8^8 A_9^2$  (B)  $A_8^8 C_9^2$  (C)  $A_8^8 A_7^2$  (D)  $A_8^8 C_9^2$

5, 极坐标方程  $(\rho - 1)(\theta - \pi) = 0 (\rho \geq 0)$  表示的图形是

- (A) 两个圆 (B) 两条直线  
(C) 一个圆和一条射线 (D) 一条直线和一条射线

6,  $\vec{a}, \vec{b}$  为非零向量, “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 是 “函数  $f(x) = (x\vec{a} + \vec{b}) \cdot (x\vec{b} - \vec{a})$  为一次函数” 的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件  
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

7, 设不等式组  $\begin{cases} x + y - 11 \geq 0 \\ 3x - y + 3 \geq 0 \\ 5x - 3y + 9 \leq 0 \end{cases}$  表示的平面区域为D, 若指数函数  $y = a^x$  的图象上存在

区域D上的点，则  $a$  的取值范围是

- (A)  $(1,3]$  (B)  $[2,3]$  (C)  $(1,2]$  (D)  $[3,+\infty)$

8. 如图，正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱


长为2，动点E, F在棱  $A_1B_1$  上，动点P, Q

分别在棱  $AD, CD$  上，若

$EF=1, A_1E=x, DQ=y, DP=z$  ( $x, y, z$  大

于零)，则四面体  $PEFQ$  的体积

- (A) 与  $x, y, z$  都有关  
(B) 与  $x$  有关，与  $y, z$  无关  
(C) 与  $y$  有关，与  $x, z$  无关  
(D) 与  $z$  有关，与  $x, y$  无关



## 第II卷 (共110分)

二、 填空题：本大题共6小题，每题5分，共30分。

9. 在复平面内，复数  $\frac{2i}{1-i}$  对应的点的坐标为\_\_\_\_\_

10. 在  $\triangle ABC$  中，若  $b=1, c=\sqrt{3}, \angle C=\frac{2\pi}{3}$ ，则

$a =$  \_\_\_\_\_


11. 从某小学随机抽取100名同学，将他们的身高（单位：厘米）数据绘制成频率分布直方图（如图），由图

中数据可知  $a =$  \_\_\_\_\_ .若要从身高在

$[120,130), [130,140), [140,150)$  三组内的学生中，用分层

抽样的方法选取18人参加一项活动，则从身高在


$[140,150]$  内的学生中选取的人数应为\_\_\_\_\_.



12. 如图， $\odot O$  的弦  $ED, CB$  的延长线交于点A，若

$BD \perp AE, AB=4, BC=2, AD=3$ ，则  $DE =$  \_\_\_\_\_;

$CE =$  \_\_\_\_\_



13, 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  的离心率为2, 焦点与椭圆  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  的焦点相同, 那么双曲线的焦点坐标为\_\_\_\_; 渐近线方程为\_\_\_\_\_.

14, 如图放置的边长为1的正方形  $PABC$  沿  $x$  轴滚动,


设顶点  $P(x, y)$  的轨迹方程是  $y = f(x)$ , 则函数  $f(x)$  的

最小正周期为\_\_\_\_;  $y = f(x)$  在其两个相邻零点间的

图象与  $x$  轴所围区域的面积为\_\_\_\_\_.

说明: “正方形  $PABC$  沿  $x$  轴滚动” 包括沿  $x$  轴正方向

和沿  $x$  轴负方向滚动. 沿  $x$  轴正方向滚动指的是先以顶点  $A$  为中心顺时针旋转, 当顶点  $B$  落在  $x$  轴上时, 再以顶点  $B$  为中心顺时针旋转, 如此继续. 类似地, 正方形  $PABC$  沿  $x$  轴负方向滚动.



三、解答题。本大题共6小题, 共80分。解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程。

15, (本小题共13分)

已知函数  $f(x) = 2\cos 2x + \sin^2 x - 4\cos x$ ,

(I) 求  $f(\frac{\pi}{3})$  的值;

(II) 求  $f(x)$  的最大值和最小值.

16, (本小题共14分)


如图, 正方形  $ABCD$  和四边形  $ACEF$  所在的平面互相垂直,  $CE \perp AC$ ,  $EF \parallel AC$ ,

$AB = \sqrt{2}, CE = EF = 1$ .

(1) 求证:  $AF \parallel$  平面  $BDE$ ;

(2) 求证:  $CF \perp$  平面  $BDE$ ;

(3) 求二面角  $A-BE-D$  的大小.



17, (本小题共13分)

某同学参加3门课程的考试.假设该同学第一门课程取得的优秀成绩的概率为 $\frac{4}{5}$ , 第二、第三门课程取得优秀成绩的概率分别为 $p, q(p > q)$ , 且不同课程是否取得优秀成绩相互独立, 记 $\xi$ 为该生取得优秀成绩的课程数, 其分布列为

|       |                 |   |   |                  |
|-------|-----------------|---|---|------------------|
| $\xi$ | 0               | 1 | 2 | 3                |
| P     | $\frac{6}{125}$ | a | b | $\frac{24}{125}$ |

(1) 求该生至少有1门课程取得优秀成绩的概率;

(2) 求 $p, q$ 的值;

(3) 求数学期望 $E\xi$ .

18, (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{k}{2}x^2 (k \geq 0)$ .

(1) 当 $k = 2$ , 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求  $f(x)$  的单调区间.

19, (本小题共14分)

在平面直角坐标系  $xOy$  中, 点  $B$  与点  $A(-1,1)$  关于原点  $O$  对称,  $P$  是动点, 且直线  $AP$  与

$BP$  的斜率之积等于  $-\frac{1}{3}$ .

(1) 求动点  $P$  的轨迹方程;

(2) 设直线  $AP$  和  $BP$  分别与直线  $x=3$  交于点  $M, N$ , 问: 是否存在点  $P$  使得  $\Delta PAB$  与  $\Delta PMN$  的面积相等? 若存在, 求出点  $P$  的坐标; 若不存在, 说明理由.

20, (本小题共13分)

已知集合

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in S_n$$

$S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\} (n \geq 2)$ . 对于, 定义  $A$  与  $B$  的差为:

$$A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|);$$

$$A \text{ 与 } B \text{ 之间的距离为 } d(A, B) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|.$$

(1) 证明:  $\forall A, B, C \in S_n$ , 有  $A - B \in S_n$ , 且  $d(A - C, B - C) = d(A, B)$ ;

(2) 证明:  $\forall A, B, C \in S_n$ ,  $d(A, B), d(A, C), d(B, C)$  三个数中至少有一个是偶数;

设  $P \subseteq S_n$ ,  $P$  中有  $m (m \geq 2)$  个元素, 记  $P$  中所有两元素间距离的平均值为  $\bar{d}(P)$ . 证明

$$: \bar{d}(P) \leq \frac{mn}{2(m-1)}$$

## 参考答案

一、选择题

B C. C. A. C. B. A. D.

二、  $2\sqrt{7}$  填空题

9, ( -1, 1 ).

10, 1。

$\pi+1$  11, 0.030, 3

12, 5,

13,  $(\pm 4, 0)$ ,  $y = \pm\sqrt{3}x$

14, 4,

三、解答题

$$15 \text{ (I)} \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\frac{2\pi}{3} + \sin^2\frac{\pi}{3} - 4\cos\frac{\pi}{3} = -1 + \frac{3}{4} - 2 = -\frac{9}{4}.$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(2\cos^2 x - 1) + (1 - \cos^2 x) - 4\cos x \\ &= 3\cos^2 x - 4\cos x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad &= 3\left(\cos x - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{7}{3}, x \in R \end{aligned}$$

因为  $\cos x \in [-1, 1]$ , 所以当  $\cos x = -1$  时,  $f(x)$  取最大值 6; 当  $\cos x = \frac{2}{3}$  时, 取最小值



$$-\frac{7}{3}.$$

16

证明: (I) 设 AC 与 BD 交于点 G, 因为 EF // AG, 且 EF = 1, AG =  $\frac{1}{2}$  AC = 1, 所以四边形 AGEF 为平行四边形。所以 AF // EG。

因为 EG  $\subset$  平面 BDE, AF  $\not\subset$  平面 BDE, 所以 AF // 平面 BDE。

(II) 因为正方形 ABCD 和四边形 ACEF 所在的平面互相垂直, 且 CE  $\perp$  AC, 所以 CE  $\perp$  平面 ABCD。如图, 以 C 为原点, 建立空间直角坐标系 C-xyz。则 C (0, 0, 0), A ( $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2}$ , 0), D ( $\sqrt{2}$ , 0, 0), E (0, 0, 1), F ( $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ , 1)。所以  $\overrightarrow{CF} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ ,  $\overrightarrow{BE} = (0, -\sqrt{2}, 1)$ ,  $\overrightarrow{DE} = (-\sqrt{2}, 0, 1)$ 。所以  $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{BE} =$



$0-1+1=0$ ,  $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{DE} = -1 + 0 + 1 = 0$ 。所以  $CF \perp BE$ ,  $CF \perp DE$ , 所以  $CF \perp$  平面  $BDE$

(III) 由 (II) 知,  $\overrightarrow{CF} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ , 是平面  $BDE$  的一个法向量, 设平面  $ABE$  的

法向量  $\vec{n} = (x, y, z)$ , 则  $\vec{n} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$ ,  $\vec{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$ 。

$$\text{即} \begin{cases} (x, y, z) \cdot (\sqrt{2}, 0, 0) = 0 \\ (x, y, z) \cdot (0, -\sqrt{2}, 1) = 0 \end{cases}$$

所以  $x=0$ , 且  $z=\sqrt{2}y$ 。令  $y=1$ , 则  $z=\sqrt{2}$ 。所以  $\vec{n} = (0, 1, \sqrt{2})$ , 从而  $\cos(\vec{n}, \overrightarrow{CF}) =$

$$\frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{CF}}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{CF}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为二面角  $A-BE-D$  为锐角, 所以二面角  $A-BE-D$  为  $\frac{\pi}{6}$ 。

17解: 事件  $A_i$ , 表示“该生第  $i$  门课程取得优异成绩”,  $i=1, 2, 3$ 。由题意可知

$$P(A_1) = \frac{4}{5}, P(A_2) = p, P(A_3) = q.$$

(I) 由于事件“该生至少有一门课程取得优异成绩”与事件“ $\xi = 0$ ”是对立的, 所以该生至少有一门课程取得优秀成绩的概率是

$$1 - P(\xi = 0) = 1 - \frac{6}{125} = \frac{119}{125}.$$

(II) 由题意可知,

$$P(\xi = 0) = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = \frac{1}{5}(1-p)(1-q) = \frac{6}{125},$$

$$p(\xi = 3) = P(A_1 A_2 A_3) = \frac{4}{5}pq = \frac{24}{125}.$$

$$\text{整理得 } pq = \frac{3}{5}, q = \frac{2}{5}.$$

(III) 由题意知,

$$\begin{aligned} a = P(\xi = 1) &= P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) \\ &= \frac{4}{5}(1-p)(1-q) + \frac{1}{5}p(1-q) + \frac{1}{5}(1-p)q \\ &= \frac{37}{125}. \end{aligned}$$



$$b = P(\xi = 2) = 1 - P(\xi = 0) - P(\xi = 1) - P(\xi = 3) \\ = \frac{58}{125}.$$

$$E\xi = 0 \times P(\xi = 0) + 1 \times P(\xi = 1) + 2 \times P(\xi = 2) + 3 \times P(\xi = 3) \\ = \frac{9}{5}.$$

18解: (I) 当  $k=2$  时,  $f(x) = \ln(1+x) - x + x^2, f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + 2x$ .

由于  $f(1) = \ln(2), f'(1) = \frac{3}{2}$ , 所以曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程为

$$y = \ln 2 = \frac{3}{2}(x-1). \text{ 即 } 3x - 2y + 2\ln 2 - 3 = 0$$

(II)  $f'(x) = \frac{x(kx+k-1)}{1+x}, x \in (-1, +\infty)$ . 当  $k=0$  时,  $f'(x) = -\frac{x}{1+x}$ .

因此在区间  $(-1, 0)$  上,  $f'(x) > 0$ ; 在区间  $(0, +\infty)$  上,  $f'(x) < 0$ ;

所以  $f(x)$  的单调递增区间为  $(-1, 0)$ , 单调递减区间为  $(0, +\infty)$ ;

当  $0 < k < 1$  时,  $f'(x) = \frac{x(kx+k-1)}{1+x} = 0$ , 得  $x_1 = 0, x_2 = \frac{1-k}{k} > 0$ ;

因此, 在区间  $(-1, 0)$  和  $(\frac{1-k}{k}, +\infty)$  上,  $f'(x) > 0$ ; 在区间  $(0, \frac{1-k}{k})$  上,  $f'(x) < 0$ ;

即函数  $f(x)$  的单调递增区间为  $(-1, 0)$  和  $(\frac{1-k}{k}, +\infty)$ , 单调递减区间为  $(0, \frac{1-k}{k})$ ;

当  $k=1$  时,  $f'(x) = \frac{x^2}{1+x}$ .  $f(x)$  的递增区间为  $(-1, +\infty)$

当  $k > 1$  时, 由  $f'(x) = \frac{x(kx+k-1)}{1+x} = 0$ , 得  $x_1 = 0, x_2 = \frac{1-k}{k} \in (-1, 0)$ ;

因此, 在区间  $(-1, \frac{1-k}{k})$  和  $(0, +\infty)$  上,  $f'(x) > 0$ , 在区间  $(\frac{1-k}{k}, 0)$  上,  $f'(x) < 0$ ;

即函数  $f(x)$  的单调递增区间为  $(-1, \frac{1-k}{k})$  和  $(0, +\infty)$ , 单调递减区间为  $(\frac{1-k}{k}, 0)$ .

19, 解: (1) 因点B与  $(-1, 1)$  关于原点对称, 得B点坐标为  $(1, -1)$ 。

设P点坐标为  $(x, y)$ , 则  $k_{AP} = \frac{y-1}{x+1}, k_{BP} = \frac{y+1}{x-1}$ , 由题意得  $\frac{y-1}{x+1} \cdot \frac{y+1}{x-1} = -\frac{1}{3}$ ,

化简得:  $x^2 + 3y^2 = 4, (x \neq \pm 1)$ 。即P点轨迹为:  $x^2 + 3y^2 = 4, (x \neq \pm 1)$

(2) 因  $\angle APB = \angle MPN$ , 可得  $\sin \angle APB = \sin \angle MPN$ ,

$$\text{又 } S_{\triangle APB} = \frac{1}{2}|PA||PB|\sin \angle APB, S_{\triangle MPN} = \frac{1}{2}|PM||PN|\sin \angle MPN,$$

$$\text{若 } S_{\triangle APB} = S_{\triangle MPN}, \text{ 则有 } |PA||PB| = |PM||PN|, \quad \text{即 } \frac{|PA|}{|PM|} = \frac{|PN|}{|PB|}$$

$$\text{设P点坐标为}(x_0, y_0), \text{ 则有: } \frac{|x_0 + 1|}{|3 - x_0|} = \frac{|3 - x_0|}{|x_0 - 1|} \text{ 解得: } x_0 = \frac{5}{3}, \text{ 又因 } x_0^2 + 3y_0^2 = 4, \text{ 解得}$$

$$y_0 = \pm \frac{\sqrt{33}}{9}.$$

$$\text{故存在点P使得 } \triangle PAB \text{ 与 } \triangle PMN \text{ 的面积相等, 此时P点坐标为 } \left(\frac{5}{3}, \frac{\sqrt{33}}{9}\right) \text{ 或 } \left(\frac{5}{3}, -\frac{\sqrt{33}}{9}\right)$$

$$20\text{解: (1) 设 } A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, b_2, \dots, b_n), C = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in S_n$$

$$\text{因 } a_i, b_i \in \{0, 1\}, \text{ 故 } |a_i - b_i| \in \{0, 1\}, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{即 } A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|) \in S_n$$

$$\text{又 } a_i, b_i, c_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\text{当 } c_i = 0 \text{ 时, 有 } ||a_i - c_i| - |b_i - c_i|| = |a_i - b_i|;$$

$$\text{当 } c_i = 1 \text{ 时, 有 } ||a_i - c_i| - |b_i - c_i|| = |(1 - a_i) - (1 - b_i)| = |a_i - b_i|$$

$$\text{故 } d(A - C, B - C) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| = d(A, B)$$

$$(2) \text{ 设 } A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, b_2, \dots, b_n), C = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in S_n$$

$$\text{记 } d(A, B) = k, d(A, C) = l, d(B, C) = h$$

$$\text{记 } O = (0, 0, \dots, 0) \in S_n, \text{ 由第一问可知:}$$

$$d(A, B) = d(A - A, B - A) = d(O, B - A) = k$$

$$d(A, C) = d(A - A, C - A) = d(O, C - A) = l$$

$$d(B, C) = d(B - A, C - A) = h$$

$$\text{即 } |b_i - a_i| \text{ 中 } 1 \text{ 的个数为 } k, |c_i - a_i| \text{ 中 } 1 \text{ 的个数为 } l, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{设 } t \text{ 是使 } |b_i - a_i| = |c_i - a_i| = 1 \text{ 成立的 } i \text{ 的个数, 则有 } h = k + l - 2t,$$

由此可知,  $k, l, h$  不可能全为奇数, 即  $d(A, B), d(A, C), d(B, C)$  三个数中至少有一个是偶数。

(3) 显然 $P$ 中会产生  $C_m^2$  个距离，也就是说  $\bar{d}(P) = \frac{1}{C_m^2} \sum_{A,B \in P} d(A,B)$ ，其中  $\sum_{A,B \in P} d(A,B)$  表示 $P$ 中每两个元素距离的总和。

分别考察第 $i$ 个位置，不妨设 $P$ 中第 $i$ 个位置一共出现了  $t_i$  个1，

那么自然有  $m - t_i$  个0，因此在这个位置上所产生的距离总和为  $t_i(m - t_i) \leq \frac{m^2}{4}, (i = 1, 2, \dots, n)$

,

那么 $n$ 个位置的总和  $\sum_{A,B \in P} d(A,B) = \sum_{i=1}^n t_i(m - t_i) \leq n \cdot \frac{m^2}{4} = \frac{m^2 n}{4}$

即  $\bar{d}(P) = \frac{1}{C_m^2} \sum_{A,B \in P} d(A,B) \leq \frac{m^2 n}{4C_m^2} = \frac{mn}{2(m-1)}$