

2008年全国统一高考数学试卷（理科）（全国卷 I）

参考答案与试题解析

一、选择题（共12小题，每小题5分，满分60分）

1. （5分）函数 $y = \sqrt{x(x-1)} + \sqrt{x}$ 的定义域为（ ）

- A. $\{x|x \geq 0\}$ B. $\{x|x \geq 1\}$ C. $\{x|x \geq 1\} \cup \{0\}$ D. $\{x|0 \leq x \leq 1\}$

【考点】33：函数的定义域及其求法.

【分析】偶次开方的被开方数一定非负. $x(x-1) \geq 0$, $x \geq 0$, 解关于 x 的不等式组, 即为函数的定义域.





【解答】解: 由 $x(x-1) \geq 0$, 得 $x \geq 1$, 或 $x \leq 0$.

又因为 $x \geq 0$, 所以 $x \geq 1$, 或 $x = 0$; 所以函数的定义域为 $\{x|x \geq 1\} \cup \{0\}$

故选: C.

【点评】定义域是高考必考题通常以选择填空的形式出现, 通常注意偶次开方一定非负, 分式中分母不能为0, 对数函数的真数一定要大于0, 指数和对数的底数大于0且不等于1. 另外还要注意正切函数的定义域.

2. （5分）汽车经过启动、加速行驶、匀速行驶、减速行驶之后停车, 若把这一过程中汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数, 其图象可能是（ ）



【考点】3A：函数的图象与图象的变换.

【专题】16：压轴题；31：数形结合.

【分析】由已知中汽车经过启动、加速行驶、匀速行驶、减速行驶之后停车，汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数，我们可以根据实际分析函数值 S （路程）与自变量 t （时间）之间变化趋势，分析四个答案即可得到结论.

【解答】解：由汽车经过启动后的加速行驶阶段，路程随时间上升的速度越来越快，故图象的前边部分为凹升的形状；在汽车的匀速行驶阶段，路程随时间上升的速度保持不变，故图象的中间部分为平升的形状；在汽车减速行驶之后停车阶段，路程随时间上升的速度越来越慢，故图象的前边部分为凸升的形状；分析四个答案中的图象，只有A答案满足要求，故选：A.

【点评】从左向右看图象，如果图象是凸起上升的，表明相应的量增长速度越来越慢；如果图象是凹陷上升的，表明相应的量增长速度越来越快；如果图象是直线上升的，表明相应的量增长速度保持不变；如果图象是水平直线，表明相应的量保持不变，即不增长也不降低；如果图象是凸起下降的，表明相应的量降低速度越来越快；如果图象是凹陷下降的，表明相应的量降低速度越来越慢；如果图象是直线下降的，表明相应的量降低速度保持不变.

3. （5分）在 $\triangle ABC$ 中， $\overrightarrow{AB}=\vec{c}$ ， $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$. 若点D满足 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ ，则 $\overrightarrow{AD}=(\quad)$
- A. $\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$ B. $\frac{5}{3}\vec{c}-\frac{2}{3}\vec{b}$ C. $\frac{2}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$ D. $\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{c}$

【考点】9B：向量加减混合运算.

【分析】把向量用一组向量来表示，做法是从要求向量的起点出发，尽量沿着已知向量，走到要求向量的终点，把整个过程写下来，即为所求. 本题也可以根据D点把BC分成一比二的两部分入手.

【解答】解：∵由 $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD})$,

$$\therefore 3\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{c} + 2\vec{b},$$

$$\therefore \overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{2}{3}\vec{b}.$$

故选：A.

【点评】用一组向量来表示一个向量，是以后解题过程中常见到的，向量的加减运算是用向量解决问题的基础，要学好运算，才能用向量解决立体几何问题，三角函数问题，好多问题都是以向量为载体的

4. (5分) 设 $a \in \mathbb{R}$ ，且 $(a+i)^2 i$ 为正实数，则 $a =$ ()

A. 2

B. 1

C. 0

D. -1

【考点】A4：复数的代数表示法及其几何意义.

【分析】注意到 $a+bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 为正实数的充要条件是 $a > 0, b = 0$

【解答】解： $(a+i)^2 i = (a^2 + 2ai - 1)i = -2a + (a^2 - 1)i > 0, a = -1$. 故选D.

【点评】本题的计算中，要注意到相应变量的范围.

5. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 4, a_3 + a_5 = 10$ ，则它的前10项的和 $S_{10} =$ ()

A. 138

B. 135

C. 95

D. 23

【考点】83：等差数列的性质；85：等差数列的前n项和.

【专题】11：计算题.

【分析】本题考查的知识点是等差数列的性质，及等差数列前n项和，根据 $a_2 + a_4 = 4, a_3 + a_5 = 10$ 我们构造关于基本量（首项及公差）的方程组，解方程组求出基本量（首项及公差），进而代入前n项和公式，即可求解.

【解答】解：∵ $(a_3 + a_5) - (a_2 + a_4) = 2d = 6$,

$$\therefore d = 3, a_1 = -4,$$

$$\therefore S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times (10-1)d}{2} = 95.$$

故选：C.

【点评】在求一个数列的通项公式或前 n 项和时，如果可以证明这个数列为等差数列，或等比数列，则可以求出其基本项（首项与公差或公比）进而根据等差或等比数列的通项公式，写出该数列的通项公式，如果未知这个数列的类型，则可以判断它是否与某个等差或等比数列有关，间接求其通项公式.

6. (5分) 若函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=(\quad)$

- A. e^{2x-2} B. e^{2x} C. e^{2x+1} D. e^{2x+2}

【考点】4R: 反函数.

【专题】11: 计算题.

【分析】由函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称知这两个函数互为反函数，故只要求出函数 $y=f(x)$ 的反函数即可，欲求原函数的反函数，即从原函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 中反解出 x ，后再进行 x, y 互换，即得反函数的解析式.

【解答】解： $\because y-1=\ln\sqrt{x}, \therefore \sqrt{x}=e^{y-1}, \therefore x=(e^{y-1})^2=e^{2y-2}$ ，改写为： $y=e^{2x-2}$

\therefore 答案为A.

【点评】本题主要考查了互为反函数图象间的关系及反函数的求法.

7. (5分) 已知曲线 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 在点 $(3, 2)$ 处的切线与直线 $ax+y+1=0$ 垂直，则 a 的值为 (\quad)

- A. 2 B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. -2

【考点】6H: 利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】53: 导数的综合应用.

【分析】求出函数的导数，切线的斜率，由两直线垂直的条件，即可得到 a 的值.

【解答】解：∵ $y=\frac{x+1}{x-1}$ ，
 $\therefore y'=\frac{x-1-(x+1)}{(x-1)^2}=\frac{-2}{(x-1)^2}$ ，
 ∴曲线 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 在点（3，2）处的切线的斜率 $k=-\frac{1}{2}$ ，
 ∴曲线 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 在点（3，2）处的切线与直线 $ax+y+1=0$ 垂直，
 ∴直线 $ax+y+1=0$ 的斜率 $k'=-a\times(-\frac{1}{2})=-1$ ，即 $a=-2$ 。

故选：D.

【点评】本题考查导数的几何意义的求法，考查导数的运算，解题时要认真审题，仔细解答，注意直线与直线垂直的性质的灵活运用.

8. （5分）为得到函数 $y=\cos(2x+\frac{\pi}{3})$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（
 ）

- A. 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位 B. 向右平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位
 C. 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位 D. 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

【考点】HJ：函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的图象变换.

【专题】11：计算题.

【分析】先根据诱导公式将函数 $y=\cos(2x+\frac{\pi}{3})$ 化为正弦的形式，再根据左加右减的原则进行平移即可得到答案.

【解答】解：∵ $y=\cos(2x+\frac{\pi}{3})=\sin(2x+\frac{5\pi}{6})=\sin 2(x+\frac{5\pi}{12})$ ，

只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个单位得到函数 $y=\cos(2x+\frac{\pi}{3})$ 的图象.

故选：A.

【点评】本题主要考查诱导公式和三角函数的平移. 属基础题.

9. （5分）设奇函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数，且 $f(1)=0$ ，则不等式 $\frac{f(x)-f(-x)}{x}<0$ 的解集为（ ）

- A. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$
C. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

【考点】3N：奇偶性与单调性的综合.

【专题】16：压轴题.

【分析】首先利用奇函数定义与 $\frac{f(x)-f(-x)}{x} < 0$ 得出 x 与 $f(x)$ 异号，

然后由奇函数定义求出 $f(-1) = -f(1) = 0$ ，

最后结合 $f(x)$ 的单调性解出答案.

【解答】解：由奇函数 $f(x)$ 可知 $\frac{f(x)-f(-x)}{x} = \frac{2f(x)}{x} < 0$ ，即 x 与 $f(x)$ 异号，

而 $f(1) = 0$ ，则 $f(-1) = -f(1) = 0$ ，

又 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数，则奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上也为增函数

，
当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < f(1) = 0$ ，得 $\frac{f(x)}{x} < 0$ ，满足；

当 $x > 1$ 时， $f(x) > f(1) = 0$ ，得 $\frac{f(x)}{x} > 0$ ，不满足，舍去；

当 $-1 < x < 0$ 时， $f(x) > f(-1) = 0$ ，得 $\frac{f(x)}{x} < 0$ ，满足；

当 $x < -1$ 时， $f(x) < f(-1) = 0$ ，得 $\frac{f(x)}{x} > 0$ ，不满足，舍去；

所以 x 的取值范围是 $-1 < x < 0$ 或 $0 < x < 1$.

故选：D.

【点评】本题综合考查奇函数定义与它的单调性.

10. (5分) 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 有公共点，则 ()

- A. $a^2 + b^2 \leq 1$ B. $a^2 + b^2 \geq 1$ C. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \leq 1$ D. $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 1$

【考点】J9：直线与圆的位置关系.

【分析】用圆心到直线的距离小于或等于半径，可以得到结果.


【解答】解：直线与圆有公共点，即直线与圆相切或相交得： $d \leq r$

$$d = \frac{|-1|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} \leq 1, \therefore \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 1,$$

故选：D.

【点评】本题考查点到直线的距离公式，直线和圆的位置关系，是基础题.

11. (5分) 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等， A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心，则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于 ()



A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【考点】LP：空间中直线与平面之间的位置关系.

【专题】11：计算题；31：数形结合；4R：转化法；5G：空间角.

【分析】法一：由题意可知三棱锥 $A_1 - ABC$ 为正四面体，设棱长为2，求出 AB_1 及三棱锥的高，由线面角的定义可求出答案；

法二：先求出点 A_1 到底面的距离 A_1D 的长度，即知点 B_1 到底面的距离 B_1E 的长度，再求出 AE 的长度，在直角三角形 AEB_1 中求 AB_1 与底面 ABC 所成角的正切，再由同角三角函数的关系求出其正弦.

【解答】解：（法一）因为三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等， A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心，设为D，

所以三棱锥 $A_1 - ABC$ 为正四面体，设棱长为2，

则 $\triangle AA_1B_1$ 是顶角为 120° 等腰三角形，

$$\text{所以 } AB_1 = 2 \times 2 \times \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}, \quad A_1D = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3} \times \sqrt{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3},$$

$$\text{所以 } AB_1 \text{ 与底面 } ABC \text{ 所成角的正弦值为 } \frac{A_1D}{AB_1} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3};$$

(法二) 由题意不妨令棱长为2, 点 B_1 到底面的距离是 B_1E ,
如图, A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心, 设为 D ,

$$\text{故 } DA = \frac{2\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{由勾股定理得 } A_1D = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \text{ 故 } B_1E = \frac{2\sqrt{6}}{3},$$


如图作 $A_1S \perp AB$ 于中点 S , 过 B_1 作 AB 的垂线段, 垂足为 F ,

$$BF=1, B_1F=A_1S=\sqrt{3}, AF=3,$$

在直角三角形 B_1AF 中用勾股定理得: $AB_1=2\sqrt{3}$,


$$\text{所以 } AB_1 \text{ 与底面 } ABC \text{ 所成角的正弦值 } \sin \angle B_1AE = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

故选: B.



【点评】 本题考查了几何体的结构特征及线面角的定义, 还有点面距与线面距的转化, 考查了转化思想和空间想象能力.

12. (5分) 如图, 一环形花坛分成A, B, C, D四块, 现有4种不同的花供选种, 要求在每块里种1种花, 且相邻的2块种不同的花, 则不同的种法总数为 ()



- A. 96 B. 84 C. 60 D. 48

【考点】C6：等可能事件和等可能事件的概率.

【专题】16：压轴题.

【分析】这道题比起前几年出的高考题要简单些，只要分类清楚没有问题，分为三类：分别种两种花、三种花、四种花，分这三类来列出结果.

【解答】解：分三类：种两种花有 A_4^2 种种法；

种三种花有 $2A_4^3$ 种种法；

种四种花有 A_4^4 种种法.

共有 $A_4^2+2A_4^3+A_4^4=84$.

故选：B.

【点评】本题也可以这样解：按A - B - C - D顺序种花，可分A、C同色与不同色有 $4 \times 3 \times (1 \times 3 + 2 \times 2) = 84$.

二、填空题（共4小题，每小题5分，满分20分）


13. （5分）若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 0 \\ x-y+3 \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$ ，则 $z=2x-y$ 的最大值为 9.

【考点】7C：简单线性规划.

【专题】11：计算题；13：作图题.

【分析】首先作出可行域，再作出直线 $l_0: y=2x$ ，将 l_0 平移与可行域有公共点，直线 $y=2x-z$ 在 y 轴上的截距最小时， z 有最大值，求出此时直线 $y=2x-z$ 经过的可行域内的点的坐标，代入 $z=2x-y$ 中即可.

【解答】解：如图，作出可行域，作出直线 $l_0: y=2x$ ，将 l_0 平移至过点A处时，函数 $z=2x-y$ 有最大值9.



【点评】本题考查线性规划问题，考查数形结合思想.

14. (5分) 已知抛物线 $y=ax^2-1$ 的焦点是坐标原点, 则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为 2.

【考点】K8: 抛物线的性质.

【专题】11: 计算题.

【分析】先根据抛物线 $y=ax^2-1$ 的焦点坐标为坐标原点, 求得 a , 得到抛物线方程, 进而可知与坐标轴的交点的坐标, 进而可得答案.

【解答】解: 由抛物线 $y=ax^2-1$ 的焦点坐标为 $(0, \frac{1}{4a}-1)$ 坐标原点得,

$$a=\frac{1}{4}, \text{ 则 } y=\frac{1}{4}x^2-1$$

与坐标轴的交点为 $(0, -1)$, $(-2, 0)$, $(2, 0)$

, 则以这三点围成的三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2$

故答案为2

【点评】本题主要考查抛物线的应用. 考查了学生综合运用所学知识, 解决实际问题的能力.

15. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=BC$, $\cos B = -\frac{7}{18}$. 若以 A, B 为焦点的椭圆经过点 C , 则该椭圆的离心率 $e = \underline{\frac{3}{8}}$.

【考点】K4: 椭圆的性质.

【专题】11: 计算题; 16: 压轴题.

【分析】设 $AB=BC=1$, $\cos B = -\frac{7}{18}$, 则 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = \frac{25}{9}$, 由此可

知 $2a = \frac{8}{3}$, $2c = 1$, 从而求出该椭圆的离心率.

【解答】解: 设 $AB=BC=1$, $\cos B = -\frac{7}{18}$, 则 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = \frac{25}{9}$,

$$\therefore AC = \frac{5}{3}, 2a = 1 + \frac{5}{3} = \frac{8}{3}, 2c = 1, e = \frac{2c}{2a} = \frac{3}{8}.$$

答案: $\frac{3}{8}$.

【点评】 本题考查椭圆的性质及应用，解题时要注意的正确计算.

16. (5分) 等边三角形 ABC 与正方形 $ABDE$ 有一公共边 AB ，二面角 $C-AB-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ， M ， N 分别是 AC ， BC 的中点，则 EM ， AN 所成角的余弦值等于 $\frac{1}{6}$.

【考点】 LM： 异面直线及其所成的角； MJ： 二面角的平面角及求法.

【专题】 11： 计算题； 16： 压轴题.

【分析】 先找出二面角的平面角，建立边之间的等量关系，再利用向量法将所求异面直线用基底表示，然后利用向量的所成角公式求出所成角即可.

【解答】 解： 设 $AB=2$ ，作 $CO\perp$ 面 $ABDE$ ，

$OH\perp AB$ ，则 $CH\perp AB$ ， $\angle CHO$ 为二面角 $C-AB-D$ 的平面角


$$CH=\sqrt{3}, OH=CH\cdot\cos\angle CHO=1,$$

结合等边三角形 ABC 与正方形 $ABDE$ 可知此四棱锥为正四棱锥，

$$\text{则 } \overrightarrow{AN}=\overrightarrow{EM}=\overrightarrow{CH}=\sqrt{3}\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}), \quad \overrightarrow{EM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AE},$$

$$\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{EM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AE})=\frac{1}{2}$$

$$\text{故 } EM, AN \text{ 所成角的余弦值 } \frac{\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{EM}}{|\overrightarrow{AN}||\overrightarrow{EM}|}=\frac{1}{6} \text{ 故答案为: } \frac{1}{6}$$



【点评】 本小题主要考查异面直线所成的角，考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力，属于基础题.

三、解答题（共6小题，满分70分）

17. (10分) 设 $\triangle ABC$ 的内角 A ， B ， C 所对的边长分别为 a ， b ， c ，且 $a\cos B - b\cos A$

$$sA = \frac{3}{5}c.$$

(I) 求 $\frac{\tan A}{\tan B}$ 的值;

(II) 求 $\tan(A - B)$ 的最大值.

【考点】 GP: 两角和与差的三角函数; HP: 正弦定理.

【分析】 本题考查的知识点是正弦定理及两角和与差的正切函数,

(I) 由正弦定理的边角互化, 我们可将已知中 $a\cos B - b\cos A = \frac{3}{5}c$, 进行转化得到 $\sin A\cos B = 4\cos A\sin B$, 再利用弦化切的方法即可求 $\frac{\tan A}{\tan B}$ 的值.

(II) 由 (I) 的结论, 结合角 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的内角, 我们易得 $\tan A = 4\tan B > 0$, 则 $\tan(A - B)$ 可化为 $\frac{3}{\cot B + 4\tan B}$, 再结合基本不等式即可得到 $\tan(A - B)$ 的最大值.

【解答】 解: (I) 在 $\triangle ABC$ 中, $a\cos B - b\cos A = \frac{3}{5}c$,

由正弦定理得

$$\sin A\cos B - \sin B\cos A = \frac{3}{5}\sin C = \frac{3}{5}\sin(A+B) = \frac{3}{5}\sin A\cos B + \frac{3}{5}\cos A\sin B$$

即 $\sin A\cos B = 4\cos A\sin B$,

$$\text{则 } \frac{\tan A}{\tan B} = 4;$$

(II) 由 $\frac{\tan A}{\tan B} = 4$ 得

$$\tan A = 4\tan B > 0$$

$$\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} = \frac{3\tan B}{1 + 4\tan^2 B} = \frac{3}{\cot B + 4\tan B} \leq \frac{3}{2\sqrt{\cot B \cdot 4\tan B}} = \frac{3}{4}$$

当且仅当 $4\tan B = \cot B$, $\tan B = \frac{1}{2}$, $\tan A = 2$ 时, 等号成立,

故当 $\tan A = 2$, $\tan B = \frac{1}{2}$ 时,


$\tan(A - B)$ 的最大值为 $\frac{3}{4}$.

【点评】 在解三角形时, 正弦定理和余弦定理是最常用的方法, 正弦定理多用于边角互化, 使用时要注意一般是等式两边是关于三边的齐次式.

18. (12分) 四棱锥A - BCDE中, 底面BCDE为矩形, 侧面ABC⊥底面BCDE, BC=2, CD= $\sqrt{2}$, AB=AC.

(I) 证明: AD⊥CE;

(II) 设CE与平面ABE所成的角为45°, 求二面角C - AD - E的大小.



【考点】LY: 平面与平面垂直; MJ: 二面角的平面角及求法.

【专题】5F: 空间位置关系与距离.

【分析】(1) 取BC中点F, 证明CE⊥面ADF, 通过证明线面垂直来达到证明线线垂直的目的.

(2) 在面AED内过点E作AD的垂线, 垂足为G, 由(1)知, CE⊥AD, 则∠CGE即为所求二面角的平面角, △CGE中, 使用余弦定理求出此角的大小.

【解答】解: (1) 取BC中点F, 连接DF交CE于点O,

∵AB=AC, ∴AF⊥BC.

又面ABC⊥面BCDE, ∴AF⊥面BCDE, ∴AF⊥CE.

再根据 $\tan \angle CED = \tan \angle FDC = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 可得∠CED=∠FDC.

又∠CDE=90°, ∴∠OED+∠ODE=90°,

∴∠DOE=90°, 即CE⊥DF, ∴CE⊥面ADF, ∴CE⊥AD.

(2) 在面ACD内过C点作AD的垂线, 垂足为G.

∴CG⊥AD, CE⊥AD, ∴AD⊥面CEG, ∴EG⊥AD,

则∠CGE即为所求二面角的平面角.

作CH⊥AB, H为垂足.

∵平面ABC⊥平面BCDE, 矩形BCDE中, BE⊥BC, 故BE⊥平面ABC, CH⊂平面ABC, 故BE⊥CH, 而AB∩BE=B, 故CH⊥平面ABE,

∴∠CEH=45°为CE与平面ABE所成的角.

∵CE= $\sqrt{6}$, ∴CH=EH= $\sqrt{3}$.

直角三角形CBH中，利用勾股定理求得 $BH=\sqrt{CB^2-CH^2}=\sqrt{4-3}=1$ ， $\therefore AH=AB-BH=A$

C - 1;

直角三角形ACH中，由勾股定理求得 $AC^2=CH^2+AH^2=3+(AC-1)^2$ ， $\therefore AB=AC=2$.

由面 $ABC\perp$ 面BCDE，矩形BCDE中 $CD\perp CB$ ，可得 $CD\perp$ 面ABC，

故 $\triangle ACD$ 为直角三角形， $AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{4+2}=\sqrt{6}$ ，


故 $CG=\frac{AC\cdot CD}{AD}=\frac{2\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $DG=\sqrt{CD^2-CG^2}=\frac{\sqrt{6}}{3}$ ，

$EG=\sqrt{DE^2-DG^2}=\frac{\sqrt{30}}{3}$ ，又 $CE=\sqrt{6}$ ，

则 $\cos\angle CGE=\frac{CG^2+GE^2-CE^2}{2CG\cdot GE}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$ ，

$\therefore \angle CGE=\pi-\arccos(\frac{\sqrt{10}}{10})$ ，

即二面角C - AD - E的大小 $\pi-\arccos(\frac{\sqrt{10}}{10})$.



【点评】 本题主要考查通过证明线面垂直来证明线线垂直的方法，以及求二面角的大小的方法，属于中档题.

19. (12分) 已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 1 - \ln x$.

(I) 当 $a=3$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调递增区间；

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上是减函数，求实数 a 的取值范围.

【考点】 3D: 函数的单调性及单调区间; 3E: 函数单调性的性质与判断.

【专题】 16: 压轴题.

【分析】（1）求单调区间，先求导，令导函数大于等于0即可.

（2）已知 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上是减函数，即 $f'(x) \leq 0$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上

恒成立，然后用分离参数求最值即可.

【解答】解：（I）当 $a=3$ 时， $f(x) = -x^2 + 3x + 1 - \ln x$

$$\therefore f'(x) = -2x + 3 - \frac{1}{x} = \frac{-(2x^2 - 3x + 1)}{x}$$

$$\text{解 } f'(x) > 0,$$

$$\text{即: } 2x^2 - 3x + 1 < 0$$

函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(\frac{1}{2}, 1)$.

$$\text{(II)} f'(x) = -2x + a - \frac{1}{x},$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上为减函数，

$$\therefore x \in (0, \frac{1}{2}) \text{ 时 } -2x + a - \frac{1}{x} \leq 0 \text{ 恒成立.}$$

$$\text{即 } a \leq 2x + \frac{1}{x} \text{ 恒成立.}$$

$$\text{设 } g(x) = 2x + \frac{1}{x}, \text{ 则 } g'(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$$

$$\therefore x \in (0, \frac{1}{2}) \text{ 时, } \frac{1}{x^2} > 4,$$

$$\therefore g'(x) < 0,$$

$$\therefore g(x) \text{ 在 } (0, \frac{1}{2}) \text{ 上递减,}$$

$$\therefore g(x) > g(\frac{1}{2}) = 3,$$

$$\therefore a \leq 3.$$

【点评】本题考查函数单调性的判断和已知函数单调性求参数的范围，此类问题一般用导数解决，综合性较强.

20. （12分）已知5只动物中有1只患有某种疾病，需要通过化验血液来确定患病的动物. 血液化验结果呈阳性的即为患病动物，呈阴性即没患病. 下面是两种化验方法：

方案甲：逐个化验，直到能确定患病动物为止.

方案乙：先任取3只，将它们的血液混在一起化验．若结果呈阳性则表明患病动物为这3只中的1只，然后再逐个化验，直到能确定患病动物为止；若结果呈阴性则在另外2只中任取1只化验．

(I) 求依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率；

(II) ξ 表示依方案乙所需化验次数，求 ξ 的期望．

【考点】 C6：等可能事件和等可能事件的概率；CH：离散型随机变量的期望与方差．

【分析】 (1) 由题意得到这两种方案的化验次数，算出在各个次数下的概率，写出化验次数的分布列，求出方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率．

(2) 根据上一问乙的化验次数的分布列，利用期望计算公式得到结果．

【解答】 解：(I) 若乙验两次时，有两种可能：

①先验三只结果为阳性，再从中逐个验时，恰好一次验中概率为：

$$\frac{C_4^2 A_3^3}{A_5^3} \times \frac{1}{A_3^1} = \frac{6 \times 6}{3 \times 4 \times 5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

②先验三只结果为阴性，再从其它两只中验出阳性（无论第二次试验中有没有，均可以在第二次结束）

$$\frac{A_4^3 A_2^1}{A_5^3 A_2^2} = \frac{24}{5 \times 3 \times 4} = \frac{2}{5},$$

\therefore 乙只用两次的概率为 $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ．

若乙验三次时，只有一种可能：

先验三只结果为阳性，再从中逐个验时，恰好二次验中概率为在三次验出时概率为 $\frac{2}{5}$

\therefore 甲种方案的次数不少于乙种次数的概率为：

$$\frac{3}{5} \times (1 - \frac{1}{5}) + \frac{2}{5} (1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{5}) = \frac{12}{25} + \frac{6}{25} = \frac{18}{25}$$

(II) ξ 表示依方案乙所需化验次数，

$\therefore \xi$ 的期望为 $E\xi = 2 \times 0.6 + 3 \times 0.4 = 2.4$ ．

【点评】期望是概率论和数理统计的重要概念之一，是反映随机变量取值分布的特征数，学习期望将为今后学习概率统计知识做铺垫．同时，它在市场预测，经济统计，风险与决策等领域有着广泛的应用，为今后学习数学及相关学科产生深远的影响．

21. (12分) 双曲线的中心为原点O，焦点在x轴上，两条渐近线分别为 l_1, l_2 ，经过右焦点F垂直于 l_1 的直线分别交 l_1, l_2 于A, B两点．已知 $|\overrightarrow{OA}|, |\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{OB}|$ 成等差数列，且 \overrightarrow{BF} 与 \overrightarrow{FA} 同向．
- (I) 求双曲线的离心率；
- (II) 设AB被双曲线所截得的线段的长为4，求双曲线的方程．

【考点】KB：双曲线的标准方程；KC：双曲线的性质．

【专题】11：计算题；16：压轴题．

【分析】(1) 由2个向量同向，得到渐近线的夹角范围，求出离心率的范围，再用勾股定理得出直角三角形的2个直角边的长度比，联想到渐近线的夹角，求出渐近线的斜率，进而求出离心率．

(2) 利用第(1)的结论，设出双曲线的方程，将AB方程代入，运用根与系数的关系及弦长公式，求出待定系数，即可求出双曲线方程．

【解答】解：(1) 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ， $c^2 = a^2 + b^2$ ，由 $\overrightarrow{BF}, \overrightarrow{FA}$ 同向，

\therefore 渐近线的倾斜角范围为 $(0, \frac{\pi}{4})$ ，

\therefore 渐近线斜率为： $k_1 = \frac{b}{a} < 1 \therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 < 1, \therefore 1 < e^2 < 2$ ．

$\therefore |\overrightarrow{OA}|, |\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{OB}|$ 成等差数列， $\therefore |\overrightarrow{OB}| + |\overrightarrow{OA}| = 2|\overrightarrow{AB}|$ ，

$\therefore |\overrightarrow{AB}|^2 = (|\overrightarrow{OB}| - |\overrightarrow{OA}|)(|\overrightarrow{OB}| + |\overrightarrow{OA}|) = (|\overrightarrow{OB}| - |\overrightarrow{OA}|) \cdot 2|\overrightarrow{AB}|$ ，

$\therefore |\overrightarrow{AB}| = 2(|\overrightarrow{OB}| - |\overrightarrow{OA}|) \therefore \begin{cases} |\overrightarrow{OB}| - |\overrightarrow{OA}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}|, \\ |\overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{OB}| = 2|\overrightarrow{AB}| \end{cases}$

$\therefore |\overrightarrow{OA}| = \frac{3}{4} |\overrightarrow{AB}| \therefore |\overrightarrow{OA}|^2 = \frac{9}{16} |\overrightarrow{AB}|^2$ ，

可得： $\frac{|AB|}{|OA|} = \frac{4}{3}$ ，而在直角三角形OAB中，

注意到三角形OAF也为直角三角形，即 $\tan \angle AOB = \frac{4}{3}$ ，

而由对称性可知：OA的斜率为 $k = \tan \frac{1}{2} \angle AOB$ ，

$$\therefore \frac{2k}{1-k^2} = \frac{4}{3}, \therefore 2k^2 + 3k - 2 = 0, \therefore k = \frac{1}{2} (k = -2 \text{ 舍去});$$

$$\therefore \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{1}{4}, \therefore e^2 = \frac{5}{4}, \therefore e = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

(2) 由第(1)知， $a = 2b$ ，可设双曲线方程为 $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ， $\therefore c = \sqrt{5}b$ 。

由于AB的倾斜角为 $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \angle AOB$ ，故AB的斜率为 $\tan \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \angle AOB \right)$

$$= -\cot \left(\frac{1}{2} \angle AOB \right) = -2,$$

\therefore AB的直线方程为

$$y = -2(x - \sqrt{5}b), \text{ 代入双曲线方程得: } 15x^2 - 32\sqrt{5}bx + 84b^2 = 0,$$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{32\sqrt{5}b}{15}, x_1 \cdot x_2 = \frac{84b^2}{15},$$

$$\therefore 4 = \sqrt{1+4} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{\left(\frac{32\sqrt{5}b}{15}\right)^2 - 4 \cdot \frac{84b^2}{15}}, \text{ 即 } 16 = \frac{32^2 \cdot b^2}{9} - 11$$

$$2b^2,$$

$$\therefore b^2 = 9, \text{ 所求双曲线方程为: } \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

【点评】 做到边做边看，从而发现题中的巧妙，如据 $\frac{|AB|}{|OA|} = \frac{4}{3}$ ，联想到对应的是2渐近线的夹角的正切值，属于中档题。

22. (12分) 设函数 $f(x) = x - x \ln x$. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = f(a_n)$.

(I) 证明：函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 是增函数；

(II) 证明： $a_n < a_{n+1} < 1$ ；

(III) 设 $b \in (a_1, 1)$ ，整数 $k \geq \frac{a_1 - b}{a_1 \ln b}$. 证明： $a_{k+1} > b$.

【考点】6B：利用导数研究函数的单调性；RG：数学归纳法.

【专题】16：压轴题.

【分析】（1）首先求出函数的导数，然后令 $f'(x)=0$ ，解出函数的极值点，最后根据导数判断函数在区间 $(0, 1)$ 上的单调性，从而进行证明.

（2）由题意数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < 1$ ， $a_{n+1}=f(a_n)$ ，求出 $a_{n+1}=a_n - a_n \ln a_n$ ，然后利用归纳法进行证明；

（3）由题意 $f(x)=x - x \ln x$ ， $a_{n+1}=f(a_n)$ 可得 $a_{k+1}=a_k - b - a_k$ ，然后进行讨论求解.

【解答】解：（I）证明： $\because f(x)=x - x \ln x$ ，

$$\therefore f'(x) = -\ln x,$$

当 $x \in (0, 1)$ 时， $f'(x) = -\ln x > 0$

故函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上是增函数；

（II）证明：（用数学归纳法）

（i）当 $n=1$ 时， $0 < a_1 < 1$ ， $a_1 \ln a_1 < 0$ ，

$$a_2=f(a_1)=a_1 - a_1 \ln a_1 > a_1,$$

\because 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 是增函数且函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，

$\therefore f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 是增函数，

$$a_2=f(a_1)=a_1 - a_1 \ln a_1 < 1, \text{ 即 } a_1 < a_2 < 1 \text{ 成立,}$$

（ii）假设当 $x=k$ （ $k \in \mathbb{N}^+$ ）时， $a_k < a_{k+1} < 1$ 成立，

$$\text{即 } 0 < a_1 \leq a_k < a_{k+1} < 1,$$

那么当 $n=k+1$ 时，由 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 是增函数， $0 < a_1 \leq a_k < a_{k+1} < 1$ ，

$$\text{得 } f(a_k) < f(a_{k+1}) < f(1),$$

而 $a_{n+1}=f(a_n)$ ，

$$\text{则 } a_{k+1}=f(a_k), a_{k+2}=f(a_{k+1}), a_{k+1} < a_{k+2} < 1,$$

也就是说当 $n=k+1$ 时， $a_n < a_{n+1} < 1$ 也成立，

根据（i）、（ii）可得对任意的正整数 n ， $a_n < a_{n+1} < 1$ 恒成立.

（III）证明：由 $f(x)=x - x \ln x$ ， $a_{n+1}=f(a_n)$ 可得

$$a_{k+1}=a_k - a_k \ln a_k = a_1 - b - \sum_{i=1}^k a_i \ln a_i,$$

1) 若存在某 $i \leq k$, 满足 $a_i \leq b$, 则由 (II) 知: $a_{k+1} - b > a_i - b \geq 0$,

2) 若对任意 $i \leq k$, 都有 $a_i > b$, 则 $a_{k+1} = a_k - a_k \ln a_k = a_1 - b - \sum_{i=1}^k a_i \ln a_i =$

$$a_1 - b - \sum_{i=1}^k a_i \ln b \geq a_1 - b_1 - k a_1 \ln b = 0,$$

即 $a_{k+1} > b$ 成立.

【点评】 此题主要考查多项式函数的导数, 函数单调性的判定, 函数最值, 函数、方程与不等式等基础知识及数学归纳法的应用, 一般出题者喜欢考查学生的运算求解能力、推理论证能力及分析与解决问题的能力, 要出学生会用数形结合的思想、分类与整合思想, 化归与转化思想、有限与无限的思想来解决问题.