

2009年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

数学（理科）

本试卷共4页，21小题，满分150分。考试用时120分钟。

注意事项：1. 答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、试室号、座位号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2. 选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4. 作答选做题时，请先用2B铅笔填涂选做题的题组号对应的信息点，再作答。漏涂、错涂、多涂的，答案无效。

5. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

参考公式：锥体的体积公式 $V = \frac{1}{3}sh$ ，其中 S 是锥体的底面积， h 是锥体的高

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，满分40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $M = \{x | -2 \leq x-1 \leq 2\}$ 和 $N = \{x | x = 2k-1, k = 1, 2, \dots\}$ 的关系的韦恩（Venn）图如图1所示，则阴影部分所示的集合的元素共有

- A. 3个 B. 2个
C. 1个 D. 无穷个




图1

2. 设 z 是复数， $a(z)$ 表示满足 $z^n = 1$ 的最小正整数 n ，则对虚数

- A. 8 B. 6 C. 4 D. 2

单位 i ， $a(i) =$

3. 若函数 $y = f(x)$ 是函数 $y = a^x (a > 0, \text{且} a \neq 1)$ 的反函数，其图像经过点 (\sqrt{a}, a) ，则 $f(x) =$

- A. $\log_2 x$ B. $\log_{\frac{1}{2}} x$ C. $\frac{1}{2^x}$ D. x^2

3。

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$ ，且 $a_5 \cdot a_{2n-5} = 2^{2n} (n \geq 3)$ ，则当 $n \geq 1$ 时，

$$\log_2 a_1 + \log_2 a_3 + \dots + \log_2 a_{2n-1} =$$

- A. $n(2n-1)$ B. $(n+1)^2$ C. n^2 D. $(n-1)^2$

4

5. 给定下列四个命题：

①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，那么这两个平面相互平行；

②若一个平面经过另一个平面的垂线，那么这两个平面相互垂直；

③垂直于同一直线的两条直线相互平行；

④若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直。其中，为真命题的是

- A. ①和② B. ②和③ C. ③和④ D. ②和④

6. 一质点受到平面上的三个力 F_1, F_2, F_3 （单位：牛顿）的作用而处于平衡状态。已知 F_1, F_2 成 60° 角，且 F_1, F_2

的大小分别为 2 和 4，则 F_3 的大小为


- A. 6 B. 2 C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{7}$

7. 2010年广州亚运会组委会要从小张、小赵、小李、小罗者中选派四人分别从事翻译、导游、礼仪、司机四项不同工作，若其中小赵和小李只能从事前两项工作，其余三人均能从事这四项工作，则不同的选派方案共有


- A. 36种 B. 12种 C. 18种 D. 48种

8. 已知甲、乙两车由同一起点同时出发,并沿同一路线(假定为直线)行驶. 图中给定的甲车、乙车的速度曲线分别为 $v_{\text{甲}}$ 和 $v_{\text{乙}}$ (如图2所示). 那么对于 t_0 和 t_1 , 下列判断中一定正确的是

- A. 在 t_1 时刻, 甲车在乙车前面
B. t_1 时刻后, 甲车在乙车后面
C. 在 t_0 时刻, 两车的位置相同
D. t_0 时刻后, 乙车在甲车前面



、小王五名志愿工作, 若其中小工作, 则不同的




直线) 行驶. 图中给定的

二、填空题: 本大题共7小题, 考生作答6小题, 每小题5分, 满分30分.

(一) 必做题 (9 ~ 12 题)

9. 随机抽取某产品 n 件, 测得其长度分别为 a_1, a_2, \dots, a_n , 则图3所示的程序框图输出的 $s = \underline{\hspace{2cm}}$, 表示的样本的数字特征是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (注: 框图中的赋值符号“=”也可以写成“ \leftarrow ”“ $:=$ ”)



. (注:

10. 若平面向量 a, b 满足 $|a+b|=1$, $a+b$ 平行于 x 轴, $b=(2, -1)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 已知椭圆 G 的中心在坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 G 上一点到 G 的两个焦点的距离之和为12, 则椭圆 G 的方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 为

12. 已知离散型随机变量 X 的分布列如右表. 若 $EX=0$, $DX=1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

X	-1	0	1	2
P	a	b	c	$\frac{1}{12}$

) 垂直, 则

(二) 选做题 (13 ~ 15 题, 考生只能从中选做两题)

13. (坐标系与参数方程选做题) 若直线

$l_1: \begin{cases} x=1-2t, \\ y=2+kt. \end{cases}$ (t 为参数) 与直线 $l_2: \begin{cases} x=s, \\ y=1-2s. \end{cases}$ (s 为参数) 垂直, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (不等式选讲选做题) 不等式 $\left| \frac{x+1}{x+2} \right| \geq 1$ 的实数解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. (几何证明选讲选做题) 如图4, 点 A, B, C 是圆 O 上的点, 且 $AB = 4, \angle ACB = 45^\circ$, 则圆 O 的面积等于_____




图 4

三、解答题：本大题共6小题，满分80分．解答须写出文字说明、证明过程和演算步骤，

16. (本小题满分12分)

已知向量 $a = (\sin \theta, -2)$ 与 $b = (1, \cos \theta)$ 互相垂直，其中 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$.

- (1) 求 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的值；
- (2) 若 $\sin(\theta - \varphi) = \frac{\sqrt{10}}{10}, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 求 $\cos \varphi$ 的值.

17. (本小题满分12分)

根据空气质量指数API（为整数）的不同，可将空气质量分级如下表：

API	0 ~ 50	51 ~ 100	101 ~ 150	151 ~ 200	201 ~ 250	251 ~ 300	> 300
级别	I	II	III ₁	III ₂	IV ₁	IV ₂	V
状况	优	良	轻微污染	轻度污染	中度污染	中度重污染	重度污染

对某城市一年（365天）的空气质量进行监测，获得API数据按照区间 $[0, 50], (50, 100], (100, 150], (150, 200], (200, 250], (250, 300], (300, 365]$ 进行分组，得

到频率分布直方图如图5

- (1) 求直方图中 x 的值；
- (2) 计算一年中空气质量分别为良和轻微污染的天数
- (3) 求该城市某一周至少有2天的空气质量为良或轻微污染概率.

(结果用分数表示. 已知 $5^7 = 78125, 2^7 = 128$, $\frac{3}{1825} + \frac{2}{365} + \frac{7}{1825} + \frac{3}{1825} + \frac{8}{9125} = \frac{123}{9125}$, $365 = 73 \times 5$)




图 5

18. (本小题满分 1 4 分)

如图 6，已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，正方形 BCC_1B_1 的中心，点 F 、 G 分别是棱 C_1D_1, AA_1 的中点. 设点 E_1, G_1 分别是点 E 、 G 在平面 DCC_1D_1 内的正投影.

- (1) 求以 E 为顶点，以四边形 $FGAE$ 在平面 DCC_1D_1 内的正投影为底面边界的棱锥的体积；
- (2) 证明：直线 $FG_1 \perp$ 平面 FEE_1 ；
- (3) 求异面直线 E_1G_1 与 EA 所成角的正弦值




图 6

19. (本小题满分 1 4 分)

已知曲线 $C: y = x^2$ 与直线 $l: x - y + 2 = 0$ 交于两点 $A(x_A, y_A)$ 和 $B(x_B, y_B)$ ，且 $x_A < x_B$ ．记曲线 C 在点 A 和点 B 之间那一段 L 与线段 AB 所围成的平面区域（含边界）为 D ．设点 $P(s, t)$ 是 L 上的任一点，且点 P 与点 A 和点 B 均不重合．

(1) 若点 Q 是线段 AB 的中点，试求线段 PQ 的中点 M 的轨迹方程；

(2) 若曲线 $G: x^2 - 2ax + y^2 - 4y + a^2 + \frac{51}{25} = 0$ 与 D 有公共点，试求 a 的最小值．

20. (本小题满分 14 分)

已知二次函数 $y = g(x)$ 的导函数的图像与直线 $y = 2x$ 平行，且 $y = g(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值

$m - 1 (m \neq 0)$ ．设 $f(x) = \frac{g(x)}{x}$ ．

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 上的点 P 到点 $Q(0, 2)$ 的距离的最小值为 $\sqrt{2}$ ，求 m 的值；

(2) $k (k \in R)$ 如何取值时，函数 $y = f(x) - kx$ 存在零点，并求出零点．

21. (本小题满分 14 分)

已知曲线 $C_n: x^2 - 2nx + y^2 = 0 (n = 1, 2, \dots)$ ．从点 $P(-1, 0)$ 向曲线 C_n 引斜率为 $k_n (k_n > 0)$ 的切线 l_n ，切点为 $P_n(x_n, y_n)$ ．

(1) 求数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明： $x_1 \cdot x_3 \cdot x_5 \cdots x_{2n-1} < \sqrt{\frac{1-x_n}{1+x_n}} < \sqrt{2} \sin \frac{x_n}{y_n}$