

[总评]本套试题考查的比较到位，覆盖面广泛，试题从易到难梯度变化明显，在考查基础知识、基本方法、基本思想的同时又考查考生分析问题、解决问题的能力，考查推理论证能力、逻辑思维能力、空间想象能力、必然与或然的能力、运算能力，能够体现高考的特质；试题有既保留了以往传统的模式，又有创新变化的部分，创新部分题目综合性强、跨度大、对能力的要求较高.其中选择填空题注重基础知识、基本技能的考查，同时不失灵活性；解答题部分加大了对数学思想、数学方法和技能技巧的考查力度.比如第 16 题在求数列通项时化简转化的技巧、第 18 题是平面向量与概率的综合问题，在随机事件的列举方面体现了考查将两大知识体系相互融合的能力.后两道压轴题在综合能力考查方面又有所提升.

### 2013 年普通高等学校招生全国统一考试（江西卷）

#### 文科数学真题解析

陕西省宝鸡市金台高中 晁群彦

一. 选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分， 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

1. 若数  $z = i(-2 - i)$  ( $i$  为虚数单位) 在复平面内所对应的点在

- A. 第一象限      B. 第二象限      C. 第三象限      D. 第四象限

[答案]D

[解析]  $\because z = -2i - i^2 = 1 - 2i$ ,  $\therefore$  点  $Z$  的坐标为  $(1, -2)$ , 因此选 D.

[学科网考点定位] 本题考查复数的概念、运算、复数与复平面内点的对应关系等基础知识，考查分析判断能力.

2. 若集合  $A = \{x \in R | ax^2 + ax + 1\}$  中只有一个元素，则  $a = ( \quad )$

- A. 4                      B. 2                      C. 0                      D. 0 或 4

[答案]A

[解析]  $\because$  集合  $A$  中只有一个元素,  $\therefore \Delta = a^2 - 4a = 0$ ,  $\therefore a = 0$  或 4. 又当  $a = 0$  时集合  $A$  中无元素, 故选 A.

[学科网考点定位] 该题主要考查集合的概念、集合的表示以及集合与一元二次方程的联系.

3. 若  $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 则  $\cos \alpha =$  ( )

- A.  $-\frac{2}{3}$                       B.  $-\frac{1}{3}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{2}{3}$

[答案]C

[解析]  $\because \cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - 2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$  ... 选C.

[学科网考点定位]此题主要考查三角恒等变换里面的二倍角余弦公式、三角函数求值问题.

4. 若集合  $A = \{2, 3\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$ , 从 A, B 中各任意取一个数, 则这两数之和等于 4 的概率是

- A.  $\frac{2}{3}$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{1}{6}$

[答案]C

[解析]  $\therefore$  从集合 A, B 中各任取一数所有结果为 (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3) 共 6 种, 其中两数和为 4 的有 2 种, 因此所求概率为  $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  选 C.

[学科网考点定位]本题主要考查古典概型的概率的概念和运算, 考查分析问题、解决问题的能力.

5. 总体由编号 01, , 02, ..., 19, 20 的 20 个个体组成。利用下面的随机数表选取 5 个个体, 选取方法是随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始由左到右依次选取两个数字, 则选出来的第 5 个个体的编号为

7816	6572	0802	6314	0702	4369	9728	0198
3204	9234	4935	8200	3623	4869	6938	7481

- A. 08                      B. 07                      C. 02                      D. 01

[答案]D

[解析]从第一行的第 5 列和第 6 列起由左向右读数划去大于 20 的数分别为：08, 02, 14, 07, 01，所以第 5 个个体是 01，选 D.

[学科网考点定位]此题主要考查抽样方法的概念、抽样方法中随机数表法，考查学习能力和运用能力.

6. 下列选项中，使  $x < \frac{1}{x} < x^2$  成立的  $x$  的取值范围是 ( )


A.  $(-\infty, -1)$  B.  $(-1, 0)$  C.  $(0, 1)$  D.  $(1, +\infty)$

[答案]A

[解析]  $\because$  原不等式可化为  $\begin{cases} x < \frac{1}{x} \\ \frac{1}{x} < x^2 \end{cases} \therefore \begin{cases} \frac{(x+1)(x-1)}{x} < 0 \\ \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x} > 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} x < -1, \text{或 } 0 < x < 1 \\ x > 1, \text{或 } x < 0 \end{cases}, \therefore x < -1. \text{ 故选 A.}$

[学科网考点定位]该题主要考查不等式的解法，不等式的性质以及计算能力.

7. 阅读如下程序框图，如果输出  $i = 4$ ，那么空白的判断框中应填入的条件是




A.  $S < 8$  B.  $S < 9$  C.  $S < 10$  D.  $S < 11$

[答案]B

[解析]由程序框图知前 3 次运算结果：1.  $i = 2, s = 5$ ; 2.  $i = 3, s = 8$ ; 3.  $i = 4, s = 9$ . 因此终止条件为  $s < 9$ ，故选 B.

[学科网考点定位]本题主要考查算法的基本思想、算法的结构和功能，考查抽象思维能力和逻辑推理能力.

8. 一几何体的三视图如右图所示，则该几何体的体积为 ( )



- A.  $200+9\pi$     B.  $200+18\pi$     C.  $140+9\pi$     D.  $140+18\pi$

[答案]A

[解析]由三视图知该几何体的体积为  $V = \frac{1}{2} \times \pi \times 3^2 \times 2 + 10 \times 4 \times 5 = 200 + 9\pi$ . 故选 A.

[学科网考点定位] 本题主要考查空间几何体的三视图、直观图、体积的计算.

9. 已知点  $A(2,0)$ , 抛物线  $C: x^2 = 4y$  的焦点  $F$ . 射线  $FA$  与抛物线  $C$  相交于点  $M$ , 与其准线相交于点  $N$ , 则  $|FM|:|MN| = ( \quad )$

- A.  $2:\sqrt{5}$     B.  $1:2$     C.  $1:\sqrt{5}$     D.  $1:3$

9. 已知点  $A(2,0)$ , 抛物线  $C: x^2 = 4y$  的焦点  $F$ . 射线  $FA$  与抛物线  $C$  相交于点  $M$ , 与其准线相交于点  $N$ , 则  $|FM|:|MN| = ( \quad )$

- A.  $2:\sqrt{5}$     B.  $1:2$     C.  $1:\sqrt{5}$     D.  $1:3$


[答案]C

[解析]  $\because |FA| = |AN| = \sqrt{5}$ , 则  $\frac{MN}{FN} = \frac{FM}{2}$ ,  $\therefore MN = 2\sqrt{5} - FM, FN = 2\sqrt{5}, \therefore FM = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ ,  
 $MN = \frac{5\sqrt{5}-5}{2}, \therefore |FM|:|MN| = \frac{5-\sqrt{5}}{2} : \frac{5\sqrt{5}-5}{2} = 1:\sqrt{5}$  故选 C.

[学科网考点定位] 本题主要考查抛物线的概念、标准方程、直线与抛物线相交的基础知识, 考查几何能力.

10. 如图, 已知  $l_1 \perp l_2$ , 圆心在  $l_1$  上, 半径为  $1\text{cm}$  的圆  $O$  在  $t=0$  时与  $l_2$  相切于点  $A$ , 圆  $O$  沿  $l_1$  以  $1\text{m/s}$  的速度匀速向上移动, 圆被直线  $l_2$  所截上方圆弧长记为  $x$ , 令  $y = \cos x$ , 则

$y$  与时间  $t(0 < t < 1, \text{单位: s})$  的函数  $y = f(t)$  的图像大致为 ( )



[答案]B

[解析]因为  $t$  时刻时圆心角  $\alpha = x$ ，所以在弦心距、半径和弦长一半围成的直角三角形中  $\cos \frac{x}{2} = \frac{t}{1}$ ， $\therefore y = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = 2t^2 - 1, \therefore 0 \leq t \leq 1, \therefore$  选项 B 正确.

[学科网考点定位] 本题综合考查函数、三角函数的实际应用，考查数学能力和素养.

## 二. 填空题

11. 若曲线  $y = x^\alpha (\alpha \in R)$  在点  $(1, 2)$  处的切线经过坐标原点，则  $\alpha =$

[答案]  $\alpha = 2$

[解析]  $\because y = x^\alpha (\alpha \in R), \therefore y' = \alpha x^{\alpha-1}, \therefore k = y'|_{x=1} = \alpha, \therefore$  切线  $y - 2 = \alpha(x - 1)$  过原点,  $\therefore \alpha = 2$ .

【学科网考点定位】 此题考查导数的几何意义，函数与导数，导数的应用，考查运算能力.

12. 某住宅小区计划植树不少于 100 棵，若第一天植 2 棵，以后每天植树的棵树是前一天的 2 倍，则需要的最少天数  $n(n \in N_+)$  等于\_\_\_\_\_.

[答案]6

[解析]

依题意该小区每天所植树棵树成等比数列,  $\therefore \frac{2 \times (1 - 2^n)}{1 - 2} \geq 100, \therefore 2^n \geq 51, \therefore n > 5, n$  最小 = 6.

【学科网考点定位】 本题主要考查等比数列的概念、前  $n$  项和及其应用.

13. 设  $f(x) = \sqrt{3} \sin 3x + \cos 3x$ ，若对任意实数  $x$  都有  $|f(x)| \leq a$ ，则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

[答案]  $a \geq 2$

[解析]  $\because f(x) = 2\sin(3x + \frac{\pi}{6})$ ,  $\therefore |f(x)| = 2\left|\sin(3x + \frac{\pi}{6})\right|$ ,  $\therefore \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq 2$ ,  $\therefore a \geq 2$ .

【学科网考点定位】此题主要考查三角函数的最值、最值问题的应用（恒成立问题），考查分析问题和解决问题的能力。

14. 若圆  $C$  经过坐标原点和点  $(4, 0)$ ，且与直线  $y=1$  相切，则圆  $C$  的方程是


[答案]  $(x-2)^2 + (y+\frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$ .

[解析] 由题意得圆心坐标为  $(2, y)$ ，半径  $r=1-y$ ，则有  $(1-y)^2 = 2^2 + y^2$ ,  $\therefore y = -\frac{3}{2}$ ,  $\therefore r = \frac{5}{2}$ .

则圆  $C$  的方程是  $(x-2)^2 + (y+\frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$ .

【学科网考点定位】该题主要考查圆和圆的方程、直线和圆的位置关系以及应用。

15. 如图，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面  $\alpha$  上，且  $AB \parallel CD$ ，则直线  $EF$  与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为\_\_\_\_\_.



[答案] 4

[解析] 因为过  $EF$  做垂直于  $CD$  ( $AB$ ) 的平面  $\alpha$  垂直平分  $CD$ ，所以该平面与过  $AB$  中点并与  $AB$  垂直的平面  $\beta$  平行，平面  $\beta$  和正方体的 4 个侧面相交，由于  $EF$  和正方体的侧棱不平行，所以它与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为 4.

【学科网考点定位】该题主要考查空间点、线、面的位置关系，考查空间直线与平面的平行与相交，考查空间想象能力和逻辑思维能力。

### 三. 解答题

16. 正项数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n^2 - (2n-1)a_n - 2n = 0$ .

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 通项公式 $a_n$ .

(2) 令 $b_n = \frac{1}{(n+1)a_n}$ , 求数列 $\{b_n\}$ 前 $n$ 项的和 $T_n$ .

**【答案】** (1)  $a_n = 2n$  (2)  $T_n = \frac{n}{2(n+1)}$

**【解析】** (1)  $\because a_n^2 - (2n-1)a_n - 2n = 0, \therefore (a_n - 2n)(a_n + 1) = 0, \because a_n > 0, \therefore a_n = 2n$ .

(2) 将 (1) 代入得:

$$b_n = \frac{1}{(n+1) \cdot 2n} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right), \therefore T_n = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{2(n+1)}.$$

**【学科网考点定位】** 本题主要考查数列的概念、通项公式、前  $n$  项和, 考查逻辑思维能力.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 $A, B, C$ 的对边分别是 $a, b, c$ , 已知 $\sin A \sin B + \sin B \sin C + \cos 2B = 1$ .

(1) 求证:  $a, b, c$  成等差数列;

(2) 若 $C = \frac{2}{3}\pi$ , 求 $\frac{a}{b}$ 的值.

**【答案】** (1) 等差; (2)  $\frac{3}{5}$

**【解析】** 由正弦定理化角为边, 化简后确定  $a, b, c$  的大小关系.

$\because \sin B(\sin A + \sin C) + 1 - 2\sin^2 B = 1, \therefore \sin B(\sin A + \sin C - 2\sin B) = 0, \therefore \sin A + \sin C - 2\sin B$ ,  
由正弦定理得:  $a + c - 2b = 0$ , 即  $a + c = 2b, \therefore a, b, c$  成等差数列.

(2) 在三角形  $ABC$  中由余弦定理得:  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{2\pi}{3}, \therefore (2b - a)^2 = a^2 + b^2 + ab$ .

展开化简得:  $3b^2 = 5ab, \therefore \frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ . 通过余弦定理确定了边长的大小关系, 化简后求值.

**【学科网考点定位】** 本题主要考查三角函数的化简、求值, 解三角形, 考查推理论证能力、计算能力等.


18. (本小题满分 12 分)

小波以游戏方式决定是去打球、唱歌还是去下棋. 游戏规则为: 以 0 为起点, 再从

$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$  (如图) 这六个点中任取两点分别为终点得到两个向量, 记这两个向

量的数量积为  $X$ ，若  $X > 0$  就去打球，若  $X = 0$  就去唱歌，若  $X < 0$  就去下棋。

- (1) 写出数量积  $X$  的所有可能值；
- (2) 分别求小波去下棋的概率和不去唱歌的概率。



[答案] (1)  $-2, -1, 0, 1$ ; (2)  $\frac{7}{15}, \frac{11}{15}$

[解析] (1) 依题意有

$\overrightarrow{OA_1} = (1, 0), \overrightarrow{OA_2} = (1, -1), \overrightarrow{OA_3} = (0, -1), \overrightarrow{OA_4} = (0, 1), \overrightarrow{OA_5} = (-1, 1), \overrightarrow{OA_6} = (-1, 0),$   
 $\therefore \overrightarrow{OA_1} \cdot \overrightarrow{OA_2} = \overrightarrow{OA_2} \cdot \overrightarrow{OA_3} = \overrightarrow{OA_4} \cdot \overrightarrow{OA_5} = \overrightarrow{OA_5} \cdot \overrightarrow{OA_6} = 1$  (4个),  $\overrightarrow{OA_1} \cdot \overrightarrow{OA_3} = \cdots = \overrightarrow{OA_3} \cdot \overrightarrow{OA_6} = -1$  (6个),  
 $\overrightarrow{OA_1} \cdot \overrightarrow{OA_3} = \cdots = 0$  (4个),  $\overrightarrow{OA_2} \cdot \overrightarrow{OA_5} = -2$  (1个),  $\therefore X = -2, -1, 0, 1$ .

(2) 由 (1) 知基本事件有 15 种，小波下棋有 7 种，所以其的概率为  $\frac{7}{15}$ . 不唱歌的概率为

$P = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15}$ . 把平面向量和概率综合在一起增加了解题的难度，所以通过计算向量的数量积，列举随机变量  $X$  的取值不能够轻视，同时计算相应取值的概率也是值得细心去做的.


[学科网考点定位] 本题主要考查互斥事件、互斥事件的概率、对立事件的概率，考查平面向量的概念和运算等基础知识和方法；考查综合分析、综合运用能力和计算能力.

19. (本小题满分 12 分)

如图，直四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中， $AB \parallel CD$ ， $AD \perp AB$ ， $AB = 2$ ， $AD = \sqrt{2}$ ，

$AA_1 = 3$ ，E 为 CD 上一点， $DE = 1$ ， $EC = 3$





(1) 证明:  $BE \perp$  平面  $BB_1C_1C$ ;

(2) 求点  $B_1$  到平面  $EA_1C_1$  的距离。

【答案】(2)  $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】(1) 在直角梯形  $ABCD$  中, 先用勾股定理的逆定理计算并证明边的垂直关系, 再用线面垂直的判定证明结果成立.

$\because BE^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3$ ,  $BC^2 = (\sqrt{2})^2 + (3-1)^2 = 6$ ,  $\therefore EC = 3 \therefore EC^2 = BE^2 + BC^2$ ,  
 $\therefore BE \perp BC$ , 又  $\because BE \perp BB_1$ ,  $BB_1 \cap BC = B$ ,  $\therefore BE \perp$  平面  $BB_1C_1C$ .

(2) 分别在直角三角形  $AA_1E$ ,  $ECC_1$ ,  $A_1D_1C_1$  中得

$A_1E = 2\sqrt{3}$ ,  $EC_1 = A_1C_1 = 3\sqrt{2}$ ,  $\therefore S_{\triangle A_1EC_1} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{15} = \sqrt{45}$ ,  $S_{\triangle A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$ ,


$\therefore V_{B_1-A_1EC_1} = V_{E-A_1B_1C_1}$ ,  $\therefore \sqrt{45}h = \sqrt{2} \times 3$ ,  $\therefore h = \frac{\sqrt{10}}{5}$  即所求距离为  $\frac{\sqrt{10}}{5}$ .

点到平面的距离在不能直接作出垂线的情况下, 一般都是由等体积转化的方法解决的, 本题也不例外. 其中要注意已知条件下底面积和高的计算.

【学科网考点定位】该题主要考查空间平行关系和垂直关系的概念、定理、点到平面的距离等基础知识, 考查空间想象能力、推理论证能力、逻辑思维能力和计算能力.

20. (本小题满分 13 分)

椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的离心率  $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $a + b = 3$ .



(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 如图,  $A, B, D$  是椭圆 C 的顶点,  $P$  是椭圆 C 上除顶点外的任意一点, 直线 DP 交  $x$  轴于点  $N$ , 直线 AD 交 BP 于点  $M$ . 设 BP 的斜率为  $k$ , MN 的斜率为  $m$ . 证明:  $2m - k$  为定值.

【答案】  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

【解析】(1)  $\because e = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \therefore a^2 = 4b^2, a = 2b, \therefore a + b = 3, \therefore b = 1, a = 2, \therefore \frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$

(2) 由 (1) 知  $A(-2, 0), B(2, 0), D(0, 1)$ , 则直线 AD 方程为:  $x - 2y + 2 = 0$ ; 直线 BP

方程:  $y = k(x - 2)$ , 联立得  $\begin{cases} x - 2y + 2 = 0 \\ y = k(x - 2) \end{cases} \therefore \begin{cases} x = \frac{4k+2}{2k-1} \\ y = \frac{4k}{2k-1} \end{cases} \therefore M(\frac{4k+2}{2k-1}, \frac{4k}{2k-1})$ . 直线 BP  $y = k(x - 2)$  和

椭圆联立方程组解得 P 点坐标为  $P(\frac{8k^2-2}{4k^2+1}, -\frac{4k}{4k^2+1})$ , 因为 D, N(x, 0), P 三点共线, 所以

有:

$$\frac{-\frac{4k}{4k^2+1}-1}{\frac{8k^2-2}{4k^2+1}} = \frac{0-1}{x-0}, \therefore MN \text{ 的斜率 } m = \frac{\frac{4k}{2k-1}-0}{\frac{4k+2}{2k-1}-\frac{4k-2}{2k+1}} = \frac{4k(2k+1)}{2(2k+1)^2-2(2k-1)^2} = \frac{2k+1}{4}.$$

$$\therefore 2m-k = \frac{2k+1}{2} - k = \frac{1}{2} \text{ (定值).}$$

先通过联立方程组求点的坐标，再计算斜率，化简后得到定值，其中三点共线是关键。本解法适用于一般的直线和圆锥曲线的关系问题。

**【学科网考点定位】** 本题考查椭圆的标准方程、简单的几何性质，考查直线和椭圆相交问题，定值问题，考查综合解答问题的能力。

21. (本小题满分 14 分)

$$\text{设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x, & 0 \leq x \leq a. \\ \frac{1}{1-a}(1-x), & a < x \leq 1. \end{cases} \quad a \text{ 为常数且 } a \in (0,1)$$

(1) 当  $a = \frac{1}{2}$  时，求  $f(f(\frac{1}{3}))$ ；

(2) 若  $x_0$  满足  $f(f(x_0)) = x_0$ ，但  $f(x) \neq 0$ ，则称  $x_0$  为  $f(x)$  的二阶周期点。证明函数  $f(x)$

有且仅有两个二阶周期点，并求二阶周期点  $x_1, x_2$ ；

(3) 对于 (2) 中的  $x_1, x_2$ ，设  $A(x_1, f(f(x_1))), B(x_2, f(f(x_2))), C(a^2, 0)$ ，记  $\triangle ABC$  的面积

为  $S(a)$ ，求  $S(a)$  在区间  $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$  上的最大值和最小值。

**【答案】** (1)  $\frac{2}{3}$  (3)

**【解析】** (1)  $\because$  当  $a = \frac{1}{2}$  时， $f(\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$ ， $\therefore f(f(\frac{1}{3})) = f(\frac{2}{3}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \times (1 - \frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$ 。

$$(2) \quad f(f(x)) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}x, & 0 \leq x \leq a^2 \\ \frac{1}{a(1-a)}(a-x), & a^2 < x \leq a \\ \frac{1}{(1-a)^2}(x-a), & a < x < a^2 - a + 1 \\ \frac{1}{a(1-a)}(1-x), & a^2 - a + 1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

当  $0 \leq x \leq a^2$  时, 由  $\frac{1}{a^2}x = x$  得  $x = 0$ .  $\because f(0) = 0$ ,  $\therefore x = 0$  不是  $f(x)$  的二阶周期点.

当  $a^2 < x \leq a$  时, 由  $\frac{1}{a(1-a)}(a-x) = x$ ,  $\therefore x = \frac{a}{-a^2+a+1} \in (a^2, a)$ ,

$$\therefore f\left(\frac{a}{-a^2+a+1}\right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{a}{-a^2+a+1} = \frac{1}{-a^2+a+1} \neq \frac{a}{-a^2+a+1}.$$

$\therefore x = \frac{a}{-a^2+a+1}$  为  $f(x)$  的二阶周期点.

当  $a < x < a^2 - a + 1$  时, 由  $\frac{1}{(1-a)^2}(x-a) = x$  得  $x = \frac{1}{2-a} \in (a, a^2 - a + 1)$ ,

$$\therefore f\left(\frac{1}{2-a}\right) = \frac{1}{1-a} \left(1 - \frac{1}{2-a}\right) = \frac{1}{2-a}, \therefore x = \frac{1}{2-a} \text{ 不是二阶周期点.}$$

当  $a^2 - a + 1 \leq x \leq 1$  时, 由  $\frac{1}{a(1-a)}(1-x) = x$  得  $x = \frac{1}{-a^2+a+1}$ ,  $f\left(\frac{1}{-a^2+a+1}\right) = \frac{a}{-a^2+a+1} \neq \frac{1}{-a^2+a+1}$ ,

$\therefore x = \frac{1}{-a^2+a+1}$  是  $f(x)$  的二阶周期点.

因此  $f(x)$  的二阶周期点有两个:  $x = \frac{a}{-a^2+a+1}$ ,  $x = \frac{1}{-a^2+a+1}$ .

(3) 由 (2) 得  $A\left(\frac{a}{-a^2+a+1}, \frac{a}{-a^2+a+1}\right)$ ,  $B\left(\frac{1}{-a^2+a+1}, \frac{1}{-a^2+a+1}\right)$ ,

$$\text{则 } S(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2(1-a)}{-a^2+a+1}, S'(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a(a^3-2a^2-2a+2)}{(-a^2+a+1)^2},$$

$$\because a \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right], \therefore a^2 + a < 1, \therefore S'(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a(a^3-2a^2-2a+2)}{(-a^2+a+1)^2} =$$

$$S'(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a[(a+1)(a-1)^2 + (1-a^2-a)]}{(-a^2+a+1)^2} > 0.$$

【学科网考点定位】此题考查分段函数的概念、求值，考查理解能力和运用能力、考查运用能力以及函数与导数等数学能力.