

Le modèle de Hubbard

par

John Hubbard

Mémoire présenté au département de physique  
en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.)

FACULTÉ des SCIENCES  
UNIVERSITÉ de SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, Canada, **DATE DU DEPOT FINAL**

Le **DATE DU DEPOT FINAL**

*le jury a accepté le mémoire de Monsieur Hubbard dans sa version finale.*

Membres du jury

Professeur Dirac  
Directeur de recherche  
Département de physique

Professeur Plank  
Membre interne  
Département de physique

Professeur Pauli  
Président rapporteur  
Département de physique

À mon idole, GTools

# Sommaire

En gros mon travail est sick est esti.

# Remerciements

Merci à mon homeboy GTools pour être le motherfucker le plus slick que j'ai jamais connu.

# Table des matières

<b>Sommaire</b>	<b>iii</b>
<b>Remerciements</b>	<b>iv</b>
<b>Publications</b>	<b>viii</b>
<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>1 Éléments de théorie et modèle</b>	<b>2</b>
1.1 Modèle de Hubbard . . . . .	2
1.1.1 Hamiltonien . . . . .	2
<b>2 Méthodes de calcul</b>	<b>4</b>
<b>Conclusion</b>	<b>4</b>
<b>Bibliographie</b>	<b>5</b>

# Liste des tableaux

# Table des figures

1.1 Représentation schématique du modèle de Hubbard à une bande. . . . .	3
--	---

# Publications

Les travaux réalisés au cours de ma maîtrise ont mené aux publications suivantes :

— Plein de publications

# Introduction

## Titre significatif

---

*Une introduction très introductive.*

## Chapitre 1

# Éléments de théorie et modèle

On travaille dans les unités telles que  $e = \hbar = k_B = 1$ .

## 1.1 Modèle de Hubbard

---

### MISE EN CONTEXTE


#### 1.1.1 Hamiltonien

Dans sa forme la plus générale, le hamiltonien du modèle prend la forme suivante dans le contexte de la seconde quantification :

$$H = \sum_{ij,\sigma} t_{ij} c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}. \quad (1.1)$$

Les opérateurs  $c_{i\sigma}^{(\dagger)}$  sont les opérateurs annihilation (création) fermioniques d'un électron sur le site  $i$  de spin  $\sigma$ . Ces derniers peuvent être exprimés dans la base réciproque via les transformée de Fourier :

$$c_{i\sigma}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \quad c_{i\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} c_{\mathbf{k}\sigma} \quad (1.2)$$



**FIGURE 1.1** Représentation schématique du modèle de Hubbard à une bande. Les cercles sont les sites du réseau et les flèches sont des abstraction des électrons occupant ces même sites. Elles pointent dans la direction du spin de ces électrons. Un bond d'amplitude  $t$  entre deux site ainsi qu'un double occupation de coût  $U$  sont aussi explicitées.

## Chapitre 2

# Méthodes de calcul

Tu diagonalise dans le fond.

# Conclusion

# Bibliographie

- [1] J. Hubbard et Brian Hilton Flowers. Electron correlations in narrow energy bands. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences* **276**(1365), 238–257 (1963). [doi:10.1098/rspa.1963.0204](https://doi.org/10.1098/rspa.1963.0204).
- [2] J. Hubbard et Brian Hilton Flowers. Electron correlations in narrow energy bands. ii. the degenerate band case. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences* **277**(1369), 237–259 (1964). [doi:10.1098/rspa.1964.0019](https://doi.org/10.1098/rspa.1964.0019).
- [3] J. Hubbard et Brian Hilton Flowers. Electron correlations in narrow energy bands iii. an improved solution. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences* **281**(1386), 401–419 (1964). [doi:10.1098/rspa.1964.0190](https://doi.org/10.1098/rspa.1964.0190).