

Коллоквиум по предмету «Дискретная математика»  
ВШЭ ФКН ПМИ, 2 курс, декабрь 2017г.  
Основано на реальных событиях.

ВОПРОСЫ ПО ЛИНЕЙНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

**1. Определение задачи линейного программирования**

Задача линейного программирования состоит в нахождении максимума или минимума линейной функции при ограничениях, задаваемых линейными равенствами и неравенствами на переменные, которые пробегает действительные числа. Все коэффициенты также действительные числа.

$$\begin{cases} \text{линейная функция} \rightarrow \max, \min, \\ \text{лин. ф.} \leq 0 \\ \quad \geq 0 \\ \quad = 0, \\ \quad \vdots \\ \text{лин. ф.} \leq 0 \\ \quad \geq 0 \\ \quad = 0. \end{cases}$$

**Размерностью** называется количество переменных в задаче. **Допустимые решения** – значения переменных, удовлетворяющие всем ограничениям задачи ЛП. **Целевая функция** – функция, которую необходимо оптимизировать.

У целевой функции либо:

— есть допустимые решения, тогда либо:

— целевая функция ограничена:  $\begin{cases} x \leq 1, \\ x \rightarrow \max. \end{cases}$

— целевая функция не ограничена:  $\begin{cases} x \geq 1, \\ x \rightarrow \max. \end{cases}$

— нет допустимых решений:  $\begin{cases} x \leq 0, \\ x \geq 1 \end{cases}$

**2. Три специальных вида задач ЛП: одни неравенства, одни неравенства на неотрицательные переменные, одни равенства на неотрицательные переменные. Приведение любой задачи ЛП к задаче любого из трех специальных видов**

**Первый вид:** ограничения состоят только из неравенств. Общую задачу ЛП всегда можно привести к задаче такого вида, поскольку равенство  $A = B$  равносильно системе двух неравенств  $A \leq B$  и  $B \leq A$ . При сведении к этому виду размерность не изменяется, а количество ограничений возрастает не более,

чем вдвое: задача ЛП  $\begin{cases} x - z \rightarrow \max, \\ x + y = z + u, \\ y \leq x, \\ z \leq u. \end{cases}$  равносильна задаче  $\begin{cases} x - z \rightarrow \max, \\ x + y \leq z + u, \\ z + u \leq x + y, \\ y \leq x, \\ z \leq u. \end{cases}$

**Второй вид:** ограничения состоят только из неравенств, при этом все переменные пробегает неотрицательные числа. Этот вид является подвидом первого. Чтобы привести задачу ко второму виду, сначала добьемся, чтобы все ограничения были неравенствами (как в первом пункте), а затем заменим в полученной задаче каждую переменную на разность двух новых переменных, после чего наложим требование неотрицательности на все новые переменные. Поскольку каждое действительное число может быть представлено как разность двух неотрицательных чисел, новая задача равносильна исходной. При сведении к этому виду может возрасти как количество ограничений, так и количество

переменных. То есть задача ЛП  $\begin{cases} x - y \rightarrow \max, \\ 2x + 1 \leq y, \\ x \leq y - 1. \end{cases}$  равносильна задаче  $\begin{cases} (x_1 - x_2) - (y_1 - y_2) \rightarrow \max, \\ 2(x_1 - x_2) + 1 \leq y_1 - y_2, \\ (x_1 - x_2) \leq (y_1 - y_2) - 1, \\ x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \end{cases}$

**Третий вид:** ограничения состоят только из равенств, и при этом все переменные пробегает неотрицательные числа. Зная, как переходить из первого ко второму, опишем сведение из второго

к третьему. Заменим каждое неравенство  $A \leq B$  на равенство  $A + y = B$ , где  $y$  новая переменная (своя для каждого неравенства) и добавим требование неотрицательности для каждой добавленной переменной. Поскольку неравенство  $A \leq B$  эквивалентно существованию неотрицательного числа  $y$ , для которого  $A + y = B$ , полученная ЛП равносильна исходной. Добавленные переменные называют

**слабыми.** Задача ЛП 
$$\begin{cases} x - z \rightarrow \max, \\ 2z \leq x + y, \\ x \leq y, \\ x, y, z \geq 0. \end{cases}$$
 равносильна задаче 
$$\begin{cases} x - z \rightarrow \max, \\ 2z + u = x + y, \\ x + v = y, \\ x, y, z, u, v \geq 0. \end{cases}$$

### 3. Полиэдры, грани полиэдров

**Полиэдр** в  $n$ -мерном пространстве – множество, задаваемое линейными неравенствами в переменных  $x_1, \dots, x_n$ .

Пусть полиэдр в  $n$ -мерном пространстве задается  $m$  ограничениями вида  $a_i x \leq b_i$  ( $a_i$  –  $n$ -мерный вектор,  $b_i$  – действительное число,  $a_i x$  – скалярное произведение вектора  $a_i$  и вектора неизвестных  $x_1, \dots, x_n$ ). Выберем некоторое множество индексов  $I \subset \{1, \dots, m\}$  и рассмотрим множество

$$F = \{x \mid a_i x = b_i \text{ для всех } i \in I, a_i x \leq b_i \text{ для всех остальных } i\}.$$

Непустые множества такого вида называются **гранями** полиэдра. В частности, весь полиэдр является своей гранью (для пустого множества индексов  $I$ ).

### 4. Достижимость оптимума в любой задаче линейного программирования (доказательство методом исключения переменных)

**Теорема.** Если значения целевой функции в задаче ЛП ограничены, то оптимальное значение достигается.

**Доказательство.** Пусть дана задача максимизации некоторой линейной функции  $c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$  на полиэдре  $P$ , заданном системой линейных ограничений на переменные  $x_1, \dots, x_n$ . Докажем, описав алгоритм нахождения оптимума задачи с использованием метода исключения переменных.

**Алгоритм.** Введем новую переменную  $x_0$  и рассмотрим новый полиэдр  $P'$  в  $n+1$ -мерном пространстве, задаваемый исходными ограничениями вместе с новым ограничением  $x_0 = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$ . Значения  $x_0$  в точках этого полиэдра – это в точности значения целевой функции  $c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$  в точках исходного полиэдра  $P$ .

Исключим в системе неравенств, задающей  $P'$ , все переменные, кроме  $x_0$ . В результате мы получим систему линейных неравенств на переменную  $x_0$ , которая и задает все возможные значения целевой функции  $c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$  на точках исходного полиэдра  $P$ . Все полученные неравенства нестрогие и задают либо отрезок, либо луч, либо все множество действительных чисел. Если это множество ограничено сверху, оно является отрезком вида  $[e, d]$  или лучом вида  $(-\infty, d]$ . В этом случае  $d$  и является искомым максимумом.

**Пример.** Продемонстрируем алгоритм на конкретном примере:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y \rightarrow \max, \\ 2x + y \leq 4, \\ -4 \leq 2x + 5y, \\ 3y \leq 2x + 4. \end{cases} & \xrightarrow{\text{вводим переменную } t} \begin{cases} t = x + y, \\ 2x + y \leq 4, \\ -4 \leq 2x + 5y, \\ 3y \leq 2x + 4. \end{cases} \xrightarrow{\text{исключаем } x} \begin{cases} 2(t - y) + y \leq 4, \\ -4 \leq 2(t - y) + 5y, \\ 3y \leq 2(t - y) + 4. \end{cases} \longrightarrow \\ & \xrightarrow{\text{разрешаем относительно } y} \begin{cases} 2t - 4 \leq y, \\ -\frac{2}{3}t - \frac{4}{3} \leq y, \\ y \leq \frac{2}{5}t + \frac{4}{5}. \end{cases} \xrightarrow{\text{исключаем } y} \begin{cases} 2t - 4 \leq \frac{2}{5}t + \frac{4}{5}, \\ -\frac{2}{3}t - \frac{4}{3} \leq \frac{2}{5}t + \frac{4}{5}. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} t \leq 3, \\ -2 \leq t. \end{cases} \end{aligned}$$

Таким образом получаем, что наибольшее значение целевой функции равно 3. Отсюда легко найти оптимальные значения, на которых оно достигается:  $x = 1$  и  $y = 2$ . ■

### 5. Задача ЛП, двойственная к данной задаче

**Двойственной** к задаче ЛП, состоящей в максимизации (минимизации) целевой функции  $sx$ , называется задача нахождения наименьшего (наибольшего) числа  $d$ , для которого неравенство  $sx \leq d$  ( $sx \geq d$ ) является синтаксическим следствием ограничений этой задачи.

Правил построения двойственной задачи достаточно много и их долго описывать, да и вряд ли это потребуется на коллоке, но почитать про это дело можно [здесь](#) на страницах 18-21.

Визуализируем симметричность отношения двойственности:

$$\begin{array}{ccc}
 \left\{ \begin{array}{l} cx \rightarrow \max \\ a_1x \leq b_1, [y_1] \\ a_2x \geq b_2, [y_2] \\ a_3x = b_3, [y_3] \\ x_1 \leq 0, [\text{смена знака}] \\ x_2 \geq 0, [\text{сохранение знака}] \\ x_3 \in \mathbb{R}, [\text{не влияет на знак}] \end{array} \right. & \xrightarrow{\text{двойственная}} & \left\{ \begin{array}{l} by \rightarrow \min \\ y_1 \geq 0, [\text{сохранение знака}] \\ y_2 \leq 0, [\text{смена знака}] \\ y_3 \in \mathbb{R}, [\text{не влияет на знак}] \\ d_1x \leq b_1, [x_1] \\ d_2x \geq b_2, [x_2] \\ d_3x = b_3, [x_3] \end{array} \right. & \xrightarrow{\text{двойственная}} & \left\{ \begin{array}{l} cx \rightarrow \max \\ a_1x \leq b_1, \\ a_2x \geq b_2, \\ a_3x = b_3, \\ x_1 \leq 0, \\ x_2 \geq 0, \\ x_3 \in \mathbb{R}. \end{array} \right.
 \end{array}$$

Покажем, почему двойственная задача также является задачей линейного программирования. Пусть исходная задача состоит в максимизации целевой функции  $cx$ . Любое неравенство вида  $cx \leq d$ , которое можно вывести из её ограничений, можно получить, складывая их с некоторыми коэффициентами. Нам нужно подобрать эти коэффициенты, которые будут неизвестными в новой задаче так, чтобы после сложения исходных неравенств с этими коэффициентами получилось неравенство  $cx \leq d$ , в левой части которого стоит целевая функция, а свободный член  $d$  в правой части был как можно меньше. Первое требование выражается в виде линейных ограничений на новые переменные. К ним ещё нужно добавить требования неотрицательности (или неположительности) тех коэффициентов, на которые умножались неравенства. А правая часть полученного неравенства является линейной комбинацией новых переменных с коэффициентами, являющимися правыми частями исходных ограничений (мы предполагаем, что исходные ограничения записаны в стандартной форме).

## 6. Принцип двойственности в линейном программировании в двух формах (доказательство методом исключения переменных)

**Теорема** (Принцип двойственности, 1-я форма). Пусть в задаче ЛП  $cx \rightarrow \max$  оптимальное (максимальное) значение целевой функции равно  $d$ . Тогда неравенство  $cx \leq d$  есть синтаксическое следствие исходных ограничений.

**Доказательство.** Пусть дана задача максимизации линейной функции  $cx$  на полиэдре, заданном некоторыми линейными неравенствами  $a_i x \leq b_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , причем функция  $cx$  ограничена сверху при этих ограничениях. Пусть  $d$  обозначает её наибольшее значение. Наша цель – вывести из исходных ограничений неравенство  $cx \leq d$ .

Введем новую переменную  $x_0$  и добавим в систему ограничений новое ограничение  $x_0 = cx$ . Затем исключим из полученной системы все переменные, кроме  $x_0$ . В конце мы получим совместную систему ограничений на значение переменной  $x_0$ . Некоторые из них ограничивают  $x_0$  сверху конкретным числом (т.к. остальные переменные мы исключили), другие ограничивают  $x_0$  снизу, а третьи вообще не содержат  $x_0$  и являются заведомо истинными неравенствами. При этом должно быть хотя бы одно неравенство первого типа ( $x_0 \leq \text{const}$ ), поскольку иначе  $x_0$  могло бы принимать сколь угодно большие значения. Наибольшее возможное значение  $x_0$ , которое мы обозначили ранее через  $d$ , равно минимальной из таких верхних оценок  $x_0$ . Следовательно, неравенство  $x_0 \leq d$  появилось в некоторый момент в ходе исключения переменных, а значит является синтаксическим следствием нового ограничения  $x_0 = cx$  и исходных  $m$  ограничений. Другими словами, неравенство  $x_0 \leq d$  может быть получено сложением этих ограничений с некоторыми коэффициентами  $\mu_0, \mu_1 \geq 0, \dots, \mu_m \geq 0$ . При этом  $\mu_0 = 1$ , так как только ограничение  $x_0 = cx$  содержит переменную  $x_0$ , а переменная  $x_0$  входит в неравенство  $x_0 \leq d$  с единичным коэффициентом.

Итак, после сложения исходных ограничений с коэффициентами  $\mu_1, \dots, \mu_m$  и добавления к полученному неравенству равенства  $x_0 = cx$ , мы получаем неравенство  $x_0 \leq d$ . Это означает, что до добавления этого равенства мы имели неравенство  $cx \leq d$ , что и требовалось доказать.

**Пример.** Прдемонстрируем доказательство на примере задачи ЛП:

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} x + y \rightarrow \max, \\ 2x + y \leq 4, \\ -4 \leq 2x + 5y, \\ 3y \leq 2x + 4. \end{cases} \xrightarrow{\text{вводим переменную } t} \begin{cases} t = x + y, \\ 2x + y \leq 4, \\ -4 \leq 2x + 5y, \\ 3y \leq 2x + 4. \end{cases} \xrightarrow{\text{исключаем } x} \begin{cases} 2(t - y) + y \leq 4, \\ -4 \leq 2(t - y) + 5y, \\ 3y \leq 2(t - y) + 4. \end{cases} \longrightarrow \\
& \xrightarrow{\text{разрешаем относительно } y} \begin{cases} 2t - 4 \leq y, \\ -\frac{2}{3}t - \frac{4}{3} \leq y, \\ y \leq \frac{2}{5}t + \frac{4}{5}. \end{cases} \xrightarrow{\text{исключаем } y} \begin{cases} 2t - 4 \leq \frac{2}{5}t + \frac{4}{5}, \\ -\frac{2}{3}t - \frac{4}{3} \leq \frac{2}{5}t + \frac{4}{5}. \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} t \leq 3, \\ -2 \leq t. \end{cases}
\end{aligned}$$

Наибольшее значение целевой функции равно 3. Как мы выяснили выше, неравенство  $t \leq 3$  является следствием исходных неравенств. То есть, если сложить второе, третье и четвертое ограничение с коэффициентами  $\frac{5}{8}$ , 0,  $\frac{1}{8}$ , получим неравенство  $x + y \leq 3$ , что и требовалось. ■

**Теорема** (Принцип двойственности, 2-я форма). Если в исходной совместной задаче ЛП (максимизации) целевая функция ограничена сверху, то двойственная задача тоже совместна и в ней минимальное значение целевой функции равно максимальному значению исходной задачи.

**Доказательство.** Видимо, не было ни в конспекте лекций, ни на живой лекции. ■

## 7. Теорема о проекции полиэдра

**Проекцией**  $\Pi_n X$  множества  $X \subset \mathbb{R}^n$  называется множество таких точек  $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$ , что для некоторого  $\lambda \in \mathbb{R}$  выполняется  $(x', \lambda) \in X$ . Смысл термина "проекция" ясен из (рис. 1).




Рис. 1: проекция – тень множества

**Лемма.** Проекция любого полиэдра снова полиэдр.

**Доказательство.** Проекция полиэдра состоит в точности из решений системы неравенств, которая получается исключением переменной  $x_n$ . ■

## 8. Лемма Фаркаша (знать два доказательства: вывод из первого принципа двойственности и геометрическое доказательство)

**Лемма Фаркаша** (формулировка из лекции). Пусть в  $\mathbb{R}^n$  даны векторы  $u_1, \dots, u_n$  и  $v$ . Тогда вектор  $v$  нельзя представить в виде  $v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$ , где  $\lambda_i \geq 0 \iff \exists w : wv > 0$  и  $wu_1 \leq 0, \dots, wu_n \leq 0$ . То есть вектор  $v$  невозможно представить в виде неотрицательной линейной комбинации каких-то векторов тогда и только тогда, когда его можно отделить от этих векторов некоторой гиперплоскостью  $\{x \mid (v - x_0)x = 0\}$ ,  $v \neq 0$ , проходящей через 0.

**Лемма Фаркаша** (формулировка из конспекта). Система линейных ограничений  $Ax = b$ ,  $x \geq 0$  несовместна тогда и только тогда, когда найдётся вектор-строка  $y$ , удовлетворяющая неравенствам  $yA \leq 0$ ,  $yb > 0$ . То есть вектор  $b$  невозможно представить в виде неотрицательной линейной комбинации каких-то векторов (столбцов матрицы  $A$ ) тогда и только тогда, когда его можно отделить от этих векторов некоторой гиперплоскостью  $\{x \mid yx = 0\}$ , проходящей через 0 (вектор  $y$  задает коэффициенты в уравнении искомой гиперплоскости).

**Доказательство** (вывод из 1-го принципа двойственности). Для начала вспомним, что такое 1-й принцип двойственности (он же критерий совместности).

**Теорема** (1-й принцип двойственности, конспект основы). Если система линейных ограничений несовместна, то из неё можно вывести неравенство  $0 \leq -1$ .

**Теорема** (1-й принцип двойственности, конспект пилота). Система линейных неравенств  $Ax \leq b$  несовместна тогда и только тогда, когда из неё синтаксически следует неравенство  $0 \cdot x \leq -1$ .

Нетрудно заметить, что лемма Фаркаша является переформулировкой критерия совместности для систем линейных ограничений третьего специального вида (одни равенства на неотрицательные переменные), поэтому докажем аналогично.

Пусть система, состоящая из равенств  $a_i x = b_i$  несовместна. Нам нужно вывести из неё некоторое заведомо ложное равенство. Для этого применим к ней алгоритм проверки совместности методом исключения переменных. Поскольку система несовместна, в некоторый момент мы получим заведомо ложное равенство. Заметим, что все новые равенства, возникающие в ходе исключения переменных, являются синтаксическими следствиями исходных равенств. В самом деле, в методе исключения переменных мы использовали шаги следующего вида: для некоторой переменной  $x_j$  мы брали два равенства вида  $px_j = r$  и  $qx_j = s$  (где  $p, q$  положительные числа, а  $r, s$  – линейные функции от других переменных), разрешали их относительно  $x_j$ , получая равенства  $x_j = \frac{r}{p}$  и  $\frac{s}{q} = x_j$  и затем составляли равенство  $\frac{s}{q} = \frac{r}{p}$ . То же самое равенство можно получить, сложив равенства  $px_j = r$  и  $qx_j = s$  с положительными коэффициентами  $\frac{1}{p}$  и  $\frac{1}{q}$  (переменная  $x_j$  сократится). Поэтому равенство  $\frac{s}{q} = \frac{r}{p}$  является синтаксическим следствием равенств  $px_j = r$  и  $qx_j = s$ . Значит, все равенства, появляющиеся в ходе исключения переменных, являются синтаксическими следствиями исходных равенств. В частности и заведомо ложное равенство, возникшее в ходе исключения переменных, является синтаксическим следствием исходных равенств, что и требовалось доказать. ■

**Доказательство** (геометрическое, из конспекта). Докажем в обе стороны:

( $\Leftarrow$ ) Очевидно: если  $yA \leq 0$ ,  $yb > 0$ , то для любого  $x \geq 0$  выполняется  $yAx \leq 0$ , а так как  $yb > 0$ , то  $Ax \neq b$ , поскольку равенство  $\underbrace{yAx}_{\leq 0} = \underbrace{yb}_{> 0}$  не выполняется.

( $\Rightarrow$ ) Неочевидно: Пусть система линейных ограничений  $Ax = b$ ,  $x \geq 0$  несовместна. Множество векторов вида  $Ax$ ,  $x \geq 0$  состоит из неотрицательных линейных комбинаций столбцов матрицы  $A$  и называется выпуклым конусом (рис. 2), порожденным этими столбцами.




Рис. 2: выпуклый конус

Нам важно, что вместе с любым вектором  $v$  это множество содержит и все вектора  $\lambda v$  для положительных  $\lambda$ , а также, вместе с любыми двумя векторами содержит их сумму. Кроме того важно, что оно замкнуто (в топологическом смысле).

Нам дано, что этот выпуклый конус не содержит точку  $b$ . Нам нужно отделить эту точку от выпуклого конуса гиперплоскостью, проходящей через ноль. Для этого возьмём в конусе точку  $x_0$ , ближайшую к точке  $b$  (хотя и существование такой точки геометрически очевидно, не менее оно требует доказательства (не это не точно)).

**Доказательство** (существования ближайшей точки). Для этого мы пересечём наш конус с шаром в центре в точке  $b$  и такого радиуса, чтобы он пересекался с конусом (рис. 3). Это пересечение есть замкнутое и ограниченное множество, то есть компакт. А среди расстояний от фиксированной точки до любого непустого компакта есть наименьшее. Ближайшая к  $b$  точка конуса в этом шаре (пусть  $x$ ) и будет ближайшей точкой всего конуса, поскольку все точки конуса вне шара находятся от точки  $b$  на расстоянии большем радиуса шара, а найденная точка лежит в шаре, значит её расстояние от  $b$  не более радиуса шара. ■

По условию  $x_0 \neq b$ . Рассмотрим гиперплоскость с уравнением  $(b - x_0)x = 0$ . Эта гиперплоскость перпендикулярна (ненулевому) вектору  $b - x_0$  и содержит точку 0. Эта гиперплоскость и будет искомой отделяющей гиперплоскостью.




Рис. 3: компакт и ближайшая точка

Докажем для начала, что  $(b - x_0)x_0 = 0$  (то есть эта гиперплоскость содержит точку  $x_0$ ). Если  $x_0 = 0$ , то это очевидно. Иначе рассмотрим луч  $\{\lambda x_0 \mid \lambda > 0\}$ . Этот луч целиком лежит в выпуклом конусе. Поэтому точка  $x_0$ , будучи ближайшей к  $b$  точкой во всем конусе, является и ближайшей к  $x_0$  точно на этом луче. Поэтому вектор с началом в  $x_0$  и концом в  $b$  (то есть  $b - x_0$ ) перпендикулярен этому лучу, то есть перпендикулярен  $x_0$  (рис. 4). Это и требовалось доказать.




Рис. 4: точка  $x_0$  - ближайшая к  $b$  на луче  $\lambda x : \lambda > 0$

Итак, мы установили, что  $(b - x_0)x_0 = 0$ . Наша гиперплоскость делит все пространство на два полупространства:  $\{x \mid (b - x_0)x > 0\}$  ("положительное полупространство") и  $\{x \mid (b - x_0)x \leq 0\}$  (неположительное полупространство). Точка  $b$  лежит в положительном, поскольку

$$\underbrace{(b - x_0)b = (b - x_0)(b - x_0)}_{\text{скалярный квадрат положителен}} + \underbrace{(b - x_0)x_0}_{=0, \text{ как доказали}}.$$

Осталось установить, что весь конус лежит в неположительном полупространстве. Допустим противное: некоторая точка  $x_1$  из конуса лежит в положительном полупространстве, то есть в  $(b - x_0)x_1 > 0$ . Рассмотрим луч, состоящий из точек  $x_0 + tx_1$  для всех  $t \geq 0$ . Этот луч лежит в конусе и содержит точку  $x_0$ . Поскольку точка  $x_0$  есть ближайшая к  $b$  точка всего конуса, то она будет и ближайшей к  $b$  точкой этого луча. Угол между векторами  $b - x_0$  и  $x_1$  острый, поэтому основание перпендикуляра из  $b$  на прямую  $(x_0, x_0 + tx_1)$  лежит на этом луче (а не на его продолжении, рис. 5). Получаем противоречие, поскольку основание этого перпендикуляра ближе к точке  $b$ , чем начало луча  $x_0$ .




Рис. 5: угол между векторами  $(b - x_0)$  и  $x_1$  острый, поэтому основание перпендикуляра из  $b$  на прямую  $(x_0, x_0 + tx_1)$  лежит на луче  $\{x_0 + tx_1 : t > 0\}$

■

## 9. Вывод обоих принципов двойственности из леммы Фаркаша

**Вывод 1-го принципа.** Пусть дана несовместная система из  $m$  линейных ограничений первого специального вида (все неравенства). Сначала с помощью введения слабых переменных перепишем всё в виде равенств, т.е.  $a_i x \leq b \Rightarrow a_i x + z_i = b_i, z_i \geq 0$ . После этого заменим каждую переменную  $x_j$  на разность новых неотрицательных переменных  $u_j - v_j$ , получив систему ограничений, состоящую только из равенств в неотрицательных переменных. Поскольку исходная система несовместна, то новая также несовместна. Обозначим через  $A$  матрицу исходной системы ограничений, а через  $A'$  – матрицу новой системы.

Пусть исходная система ограничений имеет вид 
$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 4x + 5y \leq 6, \\ 7x + 8y \leq 9. \end{cases}$$
 Её матрица равна  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ . Тогда новая система ограничений есть 
$$\begin{cases} (u - v) + 2(r - s) = 3, \\ 4(u - v) + 5(r - s) + a = 6, \\ 7(u - v) + 8(r - s) + b = 9. \end{cases}$$
 Её матрица  $A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 4 & -4 & 1 & 0 \\ 7 & -7 & 8 & -8 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

По лемме Фаркаша существует  $y$ , для которого  $yA' \geq 0$  и  $yb < 0$ . Докажем, что  $yA = 0$ . Для этого рассмотрим  $i$ -ую координату вектора  $yA$ . Она получается умножением  $y$  на  $i$ -ый столбец матрицы  $A$ . Этот столбец входит в матрицу  $A'$  дважды – один раз с плюсом, а другой раз с минусом. Поскольку все координаты вектора  $yA'$  неотрицательны, произведение  $y$  и  $i$ -го столбца матрицы  $A$  должно быть как неотрицательно, так и неположительно, а значит равно нулю. Следовательно,  $yA = 0$ . Таким образом, складывая исходные ограничения с коэффициентами  $y_1, \dots, y_m$ , мы получим неравенство, у которого в левой части все переменные сократились, а в правой части стоит отрицательное число (напомним, что  $yb < 0$ ).

Осталось доказать, что такое сложение выведет неравенство вида  $\leq$  (оно будет заведомо ложным). Для этого нужно установить, что  $y_i \geq 0$ . Для этого рассмотрим  $i$ -е ограничение  $a_i x \leq b_i$ . После введения слабой переменной оно превратилось в ограничение вида  $a_i x + z_i = b_i$ . Значит в матрице  $A'$  имеется столбец (соответствующей переменной  $z_i$ ), содержащий нули везде, кроме  $i$ -й строки, в которой стоит 1. Поэтому соответствующая этому столбцу координата вектора-строки  $yA'$  равна  $y_i$ , следовательно  $y_i \geq 0$ . ■

**Вывод 2-го принципа.** Пусть исходная задача имеет вид  $cx \rightarrow \max$  при ограничениях  $a_i x \leq b_i, i = 1, \dots, m$ . Пусть  $x^*$  есть оптимальное решение этой задачи. Нам нужно установить, что неравенство  $cx \leq cx^*$  выводимо из исходных  $m$  неравенств.

Обозначим через  $I$  множество номеров неравенств, насыщаемых в точке  $x^*$ :  $I = \{i \mid a_i x^* = b_i\}$ .

**Лемма.** Существуют неотрицательные числа  $\lambda_i, i \in I$ , для которых вектор  $c = \sum_{i \in I} \lambda_i a_i$  (рис. 6).

**Доказательство.** Допустим, что это не так. Тогда по лемме Фаркаша можно отделить вектор  $c$  от векторов  $a_i, i \in I$ , некоторой гиперплоскостью, проходящей через 0. То есть существует вектор  $u$ , для которого  $cu > 0$ , но  $a_i u \leq 0$  для всех  $i \in I$ . Докажем, что для достаточно малого положительного  $t$  точка  $x = x^* + ut$  удовлетворяет всем исходным неравенствам и значение целевой функции в ней больше, чем в  $x^*$ .




Рис. 6: многогранник отделен от вектора  $c$  гиперплоскостью

Значение целевой функции в  $x^*$  равно  $cx = c(x^* + ut) = cx^* + tcu$ . Поскольку  $cu > 0$ , это значение строго больше  $cx^*$  для любого положительного  $t$ .

Теперь нужно показать, что при достаточно малом  $t$  точка  $x = x^* + ut$  удовлетворяет всем неравенствам. Это делается по-разному для насыщенных и ненасыщенных (в точке  $x^*$ ) неравенств. Все насыщенные неравенства истинны в точке  $x$  при любом положительном  $t$ , поскольку для них верно

$$a_i x = a_i(x^* + ut) = a_i x^* + ta_i u = b_i + \underbrace{t}_{>0} \underbrace{a_i u}_{\leq 0 \forall i \in I} \leq b_i,$$

а все ненасыщенные неравенства  $a_i x \leq b_i$  сохраняют свою истинность при достаточно малом  $t$ . В самом деле, для них  $a_i x^*$  строго меньше  $b_i$ . Поэтому при достаточно малом  $t$  величина  $ta_i u$  меньше разницы между  $b_i$  и  $a_i x^*$ , и поэтому  $a_i x = a_i x^* + ta_i u < b_i$ . Полученное противоречие доказывает лемму. ■

Теперь докажем, что если сложить все насыщенные неравенства с коэффициентами  $\lambda_i$  из леммы, то как раз и получится искомое неравенство  $cx \leq cx^*$ . В самом деле, при таком сложении в левой части мы получим  $cx$ , поскольку  $c = \sum_{i \in I} a_i$ . А в правой части мы получим  $\sum_{i \in I} \lambda_i b_i$ , но поскольку в точке  $x^*$  все складываемые неравенства насыщены, это то же самое, что  $\sum_{i \in I} \lambda_i a_i x^* = cx^*$ . ■

## 10. Соотношения дополняющей нежесткости

Оптимальные решения прямой и двойственной задач обладают важным свойством: если оптимальное решение не насыщает какое-то неравенство, то соответствующая этому неравенству переменная в оптимальном решении двойственной задачи обращается в 0. В этом случае говорят, что для этого неравенства и этой пары решений выполнено **соотношение дополняющей нежесткости**.

**Теорема.** Пусть  $x^*$ ,  $y^*$  – допустимые решения прямой и двойственной задач соответственно. Тогда  $x^*$ ,  $y^*$  – оптимальные тогда и только тогда, когда для всех ограничений прямой и двойственной задач выполнены соотношения дополняющей нежесткости.

**Доказательство.** Докажем для задач 2-го специального вида. Пусть имеем

$$\begin{cases} Ax \leq b, \\ x \geq 0, \\ cx \rightarrow \max \end{cases} \quad \xleftrightarrow{\text{двойственная задача}} \quad \begin{cases} yA \geq c, \\ y \geq 0, \\ yb \rightarrow \min \end{cases}$$

Запишем неравенство, доказывающее, что любое возможное значение целевой функции в двойственной задаче ограничивает сверху возможные значения целевой функции в прямой задаче:

$$cx^* \leq y^* Ax^* \leq y^* b.$$

По принципу двойственности оптимальность пары решений  $x^*$ ,  $y^*$  означает, что  $cx^* = y^* b$ , поэтому достаточно показать, что соотношения дополняющей нежесткости неравенств прямой задачи означают, что второе неравенство обращается в равенство и наоборот, соотношения дополняющей нежесткости для двойственной задачи означают, что первое неравенство обращается в равенство.

В самом деле, умножим строку  $y^*$  на столбец  $b - Ax^*$ , то есть сложим произведения соответствующих координат этих строки и столбца. Поскольку  $x^*$ ,  $y^*$  – допустимые решения, то все складываемые произведения неотрицательны. Соотношения дополняющей нежесткости для неравенств прямой задачи требуют, чтобы в этой сумме все слагаемые были нулевыми. Поскольку все слагаемые неотрицательны, это равносильно тому, что  $y^* (b - Ax^*) = 0$ . Аналогично соотношения дополняющей нежесткости для неравенств двойственной задачи означают, что  $(y^* A - c)x^* = 0$ . ■

Для общего случая мы на лекции не доказывали, так что прочитать можно [здесь](#) на странице 32.

## 11. Теорема Форда-Фалкерсона о потоках и разрезах (доказательство сведением к задаче ЛП)

**Теорема.** Максимальный размер потока сети равен минимальной пропускной способности разреза.

**Доказательство.** Введем дополнительно ребро  $(t, s)$  (рис. 7) и потребуем, чтобы дивергенция потока в вершинах  $s$ ,  $t$  была также нулевой, как и на остальных вершинах. Пропускную способность добавленного ребра никак не ограничиваем. Нетрудно понять, что каждому потоку в старой сети соответствует поток в новой сети, в котором количество нефти, пропускаемое через добавленное ребро,






Рис. 7: пример потока в графе

равно величине исходного потока. И наоборот, каждому потоку в новой сети соответствует поток в старой сети, размер которого равен количеству нефти, пропускаемому через добавленное ребро.

Таким образом исходная задача эквивалентна задаче максимизации переменной, соответствующей добавленному ребру при тех же ограничениях, что и раньше, плюс два новых равенства нулю дивергенций в  $s$  и  $t$ . У полученной задачи, очевидно, есть допустимые решения (скажем, всюду нулевой поток).

Распишем прямую задачу для графа:

$$\begin{cases} x_{uv} \geq 0, [\text{количество нефти, которое можно пропустить по ребру}] \\ x_{ts} \geq 0, [\text{также не забываем про добавленное ребро } ts] \\ x_{uv} \leq w_{uv}, [w_{uv} - \text{ограничение пропускной способности ребра}] \\ p \in V : \sum_{(p,v) \in E} x_{pv} - \sum_{(u,p) \in E} x_{up} = 0, [\text{дивергенция вершин}] \\ x_{ts} \rightarrow \max [\text{целевая функция}] \end{cases}$$

А теперь построим двойственную:

$$\begin{cases} z_{uv} \geq 0, [\text{переменная, соответствующая ограничению } x_{uv} \leq w_{uv}] \\ y_v \in \mathbb{R}, [\text{каждой вершине } v \text{ соответствует переменная } y_v] \\ z_{uv} + y_u - y_v \geq 0, [\text{ограничение для каждого ребра } (u,v)]^* \\ y_t - y_s \geq 1, [\text{ограничение на добавленное ребро}] \\ \sum_{u,v \in E} w_{uv} z_{uv} \rightarrow \min [\text{сумма по ребрам, исключая добавленное}] \end{cases}$$

\* – переменная  $x_{uv}$  входила с плюсом в ограничение  $x_{uv} \leq w_{uv}$ , с минусом в дивергенцию в вершине  $v$  и с плюсом в дивергенцию в вершине  $u$ .

$x_{ts} \rightarrow \max$	$\sum_{(u,v) \in E} w_{u,v} z_{u,v} \rightarrow \min,$
$x_{ts} \geq 0$	$y_t - y_s \geq 1,$
$x_{u,v} \geq 0$	$z_{u,v} + y_u - y_v \geq 0$
$x_{u,v} \leq w_{u,v}$	$z_{u,v} \geq 0$
$\text{div}_v = 0$	$y_v \in \mathbb{R}$

Рис. 8: слева – задача о потоке, справа – двойственная к ней;  $v$  пробегает все вершины сети, а  $(u,v)$  пробегает все ребра.

Значения переменных  $y_v$  называют **потенциалами** или **высотами** вершин. Смысл двойственной задачи таков: каждой вершине сети нужно сопоставить некоторый потенциал так, чтобы потенциал  $t$  был по крайней мере на единицу больше потенциала  $s$ . После этого нужно рассмотреть все ребра  $(u,v)$ , у которых потенциал конца больше потенциала начала, и для таких ребер  $(u,v)$  просуммировать разности потенциалов конца и начала  $y_v - y_u$  с коэффициентами  $w_{uv}$ . Эту сумму мы хотим сделать как можно меньшей.

Пусть  $x^*, y^*, z^*$  – оптимальные решения прямой и двойственной задач, а  $f$  – оптимум.

Для доказательства теоремы нам нужно построить разрез пропускной способности  $f$ . Для этого выберем произвольное число  $r \in [y_s, y_t)$  (этот интервал не пуст, так как  $y_t \geq y_s + 1$ ) и определим разрез  $(S, T)$  по правилу:

$$S = \{v \mid y_v^* \leq r\} \text{ [все вершины, потенциал которых не больше } r]$$

$$T = \{v \mid y_v^* > r\} \text{ [все вершины, потенциал которых строго больше } r]$$

По построению  $s \in S$  и  $t \in T$ . Мы докажем, что пропускная способность построенного разреза равна  $f$  с помощью следующей леммы:

**Лемма.** Для любого потока и любого разреза размер потока равен общему количеству нефти, перетекающему по ребрам, ведущим из  $S$  в  $T$  минус общее количество нефти, перетекающее по ребрам, ведущим из  $T$  в  $S$ . То есть размер потока = поток  $(S \rightarrow T)$  – поток  $(T \rightarrow S)$ .

Мы установим, что поток ко всем ребрам  $(u, v)$  из  $S$  в  $T$  максимален, то есть  $x_{uv}^* = w_{uv}$ , а поток ко всем ребрам  $(u, v)$  из  $T$  в  $S$  нулевой, то есть  $x_{uv}^* = 0$ . Эти два равенства будут следовать из соотношений дополняющей нежесткости.

В самом деле, для ребер  $(u, v)$  из  $S$  в  $T$  высота конца больше высоты начала, поэтому соответствующая переменная  $z_{uv}^*$  положительна:  $z_{uv}^* \geq y_v^* - y_u^* > 0$ . Из соотношений дополняющей нежесткости для ограничения  $x_{uv} \leq w_{uv}$  получаем, что  $x_{uv}^* = w_{uv}$ .

Для ребер  $(u, v)$  из  $T$  в  $S$  наоборот, высота конца меньше высоты начала. Поэтому неравенство  $z_{uv}^* + y_u^* - y_v^* \geq 0$  не насыщено. Из соотношений дополняющей нежесткости для этого неравенства мы получаем, что  $x_{uv}^* = 0$ . ■

## 12. Игры с нулевой суммой. Теорема фон Ноймана об играх с нулевой суммой

В отличие от игр с полной информацией, в играх с нулевой суммой игроки делают ход одновременно и поэтому не знают, какой ход выбрать противник. Результат игры полностью определяется сделанными ходами, при этом результаты игроков противоположны: если один игрок выиграл  $+1$ , то другой проиграл  $1$ , то есть выиграл  $-1$ . Игроков будем называть **максимизатором** и **минимизатором**.

В качестве примера смоделируем простейшую матрицу игры:

		min	
		$b_1$	$b_2$
max	$a_1$	0	1
	$a_2$	-1	2

Если максимизатор делает ход  $a_1$ , а минимизатор  $b_2$ , то выигрыш максимизатора равен  $+1$ .

Предположим, что игроки играют много игр подряд. Если минимизатор будет делать ход  $b_2$  все время, то рано или поздно максимизатор сообразит, что ему выгоднее отвечать ходом  $a_2$ : в этом случае его выигрыш составит  $+2$ .

Говорят, что пара (**чистых**) стратегий  $(a_1, b_2)$  **не равновесна**. Это означает в общем случае, что один из игроков может улучшить свой результат, отклонившись от выбранной стратегии (в предположении, что второй игрок придерживается той же самой стратегии). **Чистая стратегия** состоит в том, что игрок делает какой-то избранных ход.

Эта игра очень маленькая и легко разобрать все случаи. Оказывается, в ней есть три неравновесных пар чистых стратегии и одна равновесная пара:  $(a_1, b_1)$ . Действительно, выигрыш в этой стратегии равен 0. Если от неё отклонится максимизатор, а минимизатор будет придерживаться равновесной стратегии, то выигрыш максимизатора станет равным  $-1$ , то есть уменьшится. Если отклонится минимизатор, то выигрыш максимизатора станет равным  $+1$ , т.е. выигрыш минимизатора уменьшится.

Теперь рассмотрим игру "камень-ножницы-бумага":

		min		
		К	Н	Б
max	К	0	1	-1
	Н	-1	0	1
	Б	1	-1	0

В этой игре нет равновесной чистой стратегии (любой игрок может улучшить свой результат, если противник не меняет свою чистую стратегию). В данной игре надежнее всего выбирать ход случайно. Стратегии со случайным выбором хода называются **смешанными**.

Пусть максимизатор выбирает каждый ход с вероятностью  $\frac{1}{3}$ . Тогда при любом ходе минимизатора математическое ожидание его выигрыша равно 0:

$$\begin{aligned} \text{К} : \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot (1) + \frac{1}{3} \cdot (-1) &= 0, \\ \text{Н} : \frac{1}{3} \cdot (-1) + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 &= 0, \\ \text{Б} : \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot (-1) + \frac{1}{3} \cdot 0 &= 0. \end{aligned}$$

Аналогично и для минимизатора. Таким образом, для этой игры пара смешанных стратегий, в которой оба игрока выбирают ход случайно и равновероятно, является **равновесной**. Но не для любой игры пара таких стратегий равновесна – существует игра, для которой это неверно (пример выше).

**Теорема** (фон Нойман). Пусть нам дано:  $i = 1, \dots, m$  – количество ходов максимизатора (смешанная стратегия максимизатора определяется выбором вероятностей  $p_1, \dots, p_m$  каждого хода);  $j = 1, \dots, n$  (аналогично смешанная стратегия минимизатора определяется выбором вероятностей  $q_1, \dots, q_n$  каждого хода) – количество ходов минимизатора;  $G_{ij}$  – выигрыш максимизатора (проигрыш минимизатора) и математическое ожидание максимизатора при выборе игроками пары стратегий  $(p, q)$ :

$$W(p, q) = \sum_{i,j} p_i q_j G_{ij} = pGq.$$

Тогда существует такая пара стратегий  $p^*, q^*$ , называемая **равновесной**, что для любых  $p, q$  выполняется:

$$\underbrace{W(p, q^*)}_{\text{гарантия минимизатора}} \leq \underbrace{W(p^*, q^*)}_{\text{цена игры}} \leq \underbrace{W(p^*, q)}_{\text{гарантия максимизатора}}$$

Иными словами, в любой антагонистической матричной игре двух игроков есть равновесие в смешанных стратегиях.

**Доказательство.** Сначала рассмотрим игру с точки зрения максимизатора. Пусть максимизатор хочет гарантировать себе средний выигрыш не меньше некоторого числа  $u$ , используя смешанную стратегию  $p = (p_1, \dots, p_m)$ :

$$p_1 G_{1j} + p_2 G_{2j} + \dots + p_m G_{mj} \geq u, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

В этой системе  $j$ -ое неравенство гарантирует выигрыш не меньше  $u$  при условии, что минимизатор использует чистую стратегию и всегда делает  $j$ -ый ход. Для смешанных стратегий аналогично неравенства записывать не надо, поскольку гарантия для смешанных стратегий следует из гарантий для чистых. В самом деле, просуммируем неравенства этой системы с коэффициентами  $q_1, \dots, q_m$ , задающими смешанную стратегию минимизатора. В левой части получится сумма  $\sum_{i,j} p_i q_j G_{ij}$ , а в правой –  $\sum_j q_j u$ .

Поскольку сумма чисел  $q_1, \dots, q_m$  равна единице, мы как раз получим неравенство

$$\sum_{i,j} p_i q_j G_{ij} \geq u,$$

означающее, что средний выигрыш максимизатора не меньше  $u$  при игре против смешанной стратегии  $q_1, \dots, q_m$ . Теперь представим себе, что максимизатор ищет смешанную стратегию, гарантирующую ему максимальный выигрыш. Это означает, что он должен найти оптимальное решение задачи ЛП:

$$\begin{cases} p_1 G_{1j} + p_2 G_{2j} + \dots + p_m G_{mj} \geq u, \quad \forall j = 1, \dots, n, \\ \sum_i p_i = 1, \quad p_1, \dots, p_m \geq 0, \\ u \rightarrow \max \end{cases}$$

Аналогичным образом можно проанализировать игру с точки зрения минимизатора. Стремясь найти смешанную стратегию, гарантирующую ему наименьший проигрыш, он ищет оптимальное решение задачи ЛП:

$$\begin{cases} q_1 G_{i1} + q_2 G_{i2} + \dots + q_n G_{in} \leq v, \quad \forall i = 1, \dots, m, \\ \sum_j q_j = 1, \quad q_1, \dots, q_n \geq 0, \\ v \rightarrow \min \end{cases}$$

Докажем, что эти задачи двойственны друг к другу путём построения двойственной задачи к задаче ЛП максимизатора. Перепишем неравенства первой задачи в виде:

$$-p_1 G_{1j} - p_2 G_{2j} - \dots - p_m G_{mj} + u \leq 0,$$

(чтобы двойственные переменные были положительными). Теперь применим к этой задаче резуммирующий алгоритм (?) построения двойственной задачи. Результат показан на рис. 9. Как видно, это в точности задача, решаемая минимизатором.

Прямая задача	Двойственная задача
$u \rightarrow \max$	$v \rightarrow \min,$
$p_i \geq 0$	$-q_1 G_{i1} - q_2 G_{i2} - \dots - p_n G_{in} + v \geq 0,$
$-p_1 G_{1j} - p_2 G_{2j} - \dots - p_m G_{mj} + u \leq 0$	$g_j \geq 0$
$p_1 + \dots + p_n = 1$	$v \in \mathbb{R}$
$u \in \mathbb{R}$	$q_1 + \dots + q_m = 1$

Рис. 9: прямая задача – задача, решаемая максимизатором; двойственная – минимизатором.

По принципу двойственности существуют их решения с одним и тем же значением целевых функций. Эти решения и дают равновесные стратегии. В самом деле, обозначим через  $u^* = v^*$  оптимальные значения  $u, v$  в обеих задачах, а через  $p^*, q^*$  – их оптимальные решения. Каков средний выигрыш максимизатора, если он придерживается стратегии  $p^*$ , а минимизатор – стратегии  $q^*$ ? Ясно, что он равен  $u^*$ , поскольку стратегия  $p^*$  гарантирует максимизатору выигрыш не меньше  $u^*$ , а стратегия  $q^*$  гарантирует минимизатору проигрыш не больше  $v^*$ . С другой стороны, эти гарантии означают, что если один из игроков будет отклоняться от оптимальной стратегии, а другой не будет этого делать, то средний выигрыш отклоняющегося игрока не увеличится. ■

## Источники

1. записи (лекция за 05.09.17), конспект (стр. 1);
2. записи (лекция за 19.09.17), конспект (стр. 12-13);
3. конспект (стр. 43);
4. конспект (стр. 11-12);
5. записи (лекция за 15.09.17), конспект (стр. 15-16), импровизация;
6. записи (лекция за 15.09.17), конспект (стр. 22-24);
7. конспект пилота (стр. 14-15)
8. записи (лекции за 19.09.17, 29.09.17), конспект (стр. 23-30);
9. записи (лекция за 29.09.17), конспект (стр. 27-29)
10. записи (лекция за 29.09.17), конспект (стр. 31-32)
11. записи (лекция за 03.10.17), конспект (стр. 35-37)
12. записи (лекция за 03.10.17), конспект (стр. 39-42)

## ЧЕНЖЛОГИ

v0.0 (03.12.2017) – исходное: добавлены вопросы 1-12 по ЛП