

Линейная алгебра.  
Коллоквиум 2 семестр.  
Основано на реальных событиях.  
v0.3

26 мая 2017

## Ченжлоги

v0.0 (20.05.2017) — исходное: добавлены 1–10 вопросы (спасибо Соне, Даше, Лизе, Наташе, Алёне)  
v0.1 (21.05.2017) — поправил 1, 2, 6 (спасибо Борису, Соне, Александру Г. (Ц.))  
v0.2 (22.05.2017) — добавил 11–15. Поправил 2, 7 (спасибо Александру Г. (Ц.), Борису, Наташе)  
v0.3 (23.05.2017) — поправил 2 ( $2 \Rightarrow 3$  и  $3 \Rightarrow 4$ ), дополнил 3, (спасибо Наташе, Глебу, Соне), добавил 16–20

## Доказательства

### 1. Теорема о связи размерности суммы двух подпространств с размерностью их пересечения

**Теорема.**  $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W)$

**Доказательство.** Пусть  $p = \dim(U \cap W)$ ,  $k = \dim U$ ,  $m = \dim W$ . Выберем базис  $a = \{a_1, \dots, a_p\}$  в пересечении. Его можно дополнить до базиса  $U$  и до базиса  $W$ . Значит,  $\exists b = \{b_1, \dots, b_{k-p}\}$  такой, что  $a \cup b$  — базис в  $U$  и  $\exists c = \{c_1, \dots, c_{m-p}\}$  такой, что  $a \cup c$  — базис в  $W$ .

Докажем, что  $a \cup b \cup c$  — базис в  $U + W$ .

1. Докажем, что  $U + W$  порождается множеством  $a \cup b \cup c$ .

$$\left. \begin{array}{l} v \in U + W \Rightarrow \exists u \in U, w \in W : v = u + w \\ u \in U = \langle a \cup b \rangle \subset \langle a \cup b \cup c \rangle \\ w \in W = \langle a \cup c \rangle \subset \langle a \cup b \cup c \rangle \end{array} \right| \Rightarrow \begin{array}{l} v = u + w \in \langle a \cup b \cup c \rangle \Rightarrow \\ \Rightarrow U + W = \langle a \cup b \cup c \rangle \end{array}$$

2. Докажем линейную независимость векторов из  $a \cup b \cup c$ .

Пусть скаляры  $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_{k-p}, \gamma_1, \dots, \gamma_{m-p}$  таковы, что

$$\underbrace{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_p a_p}_x + \underbrace{\beta_1 b_1 + \dots + \beta_{k-p} b_{k-p}}_y + \underbrace{\gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_{m-p} c_{m-p}}_z = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ z = -x - y \\ z \in W \\ -x - y \in U \cap W \end{array} \right| \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in F : z = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_p a_p$$

Тогда  $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_p a_p - \gamma_1 c_1 - \dots - \gamma_{m-p} c_{m-p} = 0$ . Но  $a \cup c$  — базис  $W$ . Следовательно,  $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = \gamma_1 = \dots = \gamma_{m-p} = 0$ . Но тогда  $0 = x + y = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_p a_p + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_{k-p} b_{k-p}$ . Но  $a \cup b$  — базис  $U \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_p = \beta_1 = \dots = \beta_{k-p} = 0$ . Итого, все коэффициенты равны нулю и линейная независимость тем самым доказана. Т.е.  $a \cup b \cup c$  — базис  $U + W$ .

$$\begin{aligned} \dim(U + W) = |a \cup b \cup c| &= |a| + |b| + |c| = p + k - p + m - p = k + m - p = \\ &= \dim U + \dim W - \dim(U \cap W). \end{aligned}$$

## 2. Теорема о пяти эквивалентных условиях, определяющих набор линейно независимых подпространств векторного пространства

**Определение.** Сумма  $U_1 + \dots + U_k = \{u_1 + \dots + u_k \mid u_i \in U_i\}$  называется прямой, если из условия  $u_1 + \dots + u_k = 0$  следует, что  $u_1 = \dots = u_k = 0$ . *Обозначение:*  $U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ .

В этом случае, подпространства  $U_1, \dots, U_k$  называют линейно независимыми.

1. Если  $u_1 + \dots + u_k = 0 \Rightarrow u_1 = \dots = u_k = 0$  ( $U_1, \dots, U_k$  — линейно независимы)
2. Любой  $u$  единственным образом представим в виде  $u = u_1 + \dots + u_k$ , где  $u_i \in U_i$
3. Если  $e_i$  — базис в  $U_i$ , то  $e_1 \cup \dots \cup e_k$  — базис  $U_1 + \dots + U_k$
4.  $\dim(U_1 + \dots + U_k) = \dim U_1 + \dots + \dim U_k$
5.  $U_i \cap (U_1 + \dots + U_{i-1} + U_{i+1} + \dots + U_k) = \{0\}$

**Доказательство.**

(1  $\Rightarrow$  2) Пусть  $u_1 + \dots + u_k = u'_1 + \dots + u'_k$ , где  $u_i, u'_i \in U_i$ . Тогда

$$\begin{aligned} \underbrace{(u_1 - u'_1)}_{\in U_1} + \dots + \underbrace{(u_k - u'_k)}_{\in U_k} &= \vec{0} \Rightarrow \\ \Rightarrow (u_1 - u'_1) = \dots = (u_k - u'_k) &= \vec{0} \Rightarrow \\ \Rightarrow u_1 = u'_1, \dots, u_k &= u'_k. \end{aligned}$$

(2  $\Rightarrow$  3) Пусть  $u \in U_1 + \dots + U_k$ . Тогда  $u$  единственно представим в виде  $u = u_1 + \dots + u_k$ , где  $u_i \in U_i$ .

Каждый  $u$  единственным образом представим в виде линейной комбинации векторов из  $e_1 \cup \dots \cup e_k$  (так как каждый  $u_i$  представляется в базисе  $e_i$ )  $\Rightarrow e_1 \cup \dots \cup e_k$  — базис.

(3  $\Rightarrow$  4) Пусть  $e_1 \cup \dots \cup e_k$  — базис  $U_1 + \dots + U_k$  и пусть наш базис — мультимножество (т.е. одинаковые векторы могут учитываться по несколько раз). Тогда

$$\begin{aligned} \dim(U_1 + \dots + U_k) &= |e_1^1 + \dots + e_{s_1}^1 + \dots + e_1^k + \dots + e_{s_k}^k| = \\ &= |e_1^1 + \dots + e_{s_1}^1| + \dots + |e_1^k + \dots + e_{s_k}^k| = \dim U_1 + \dots + \dim U_k. \end{aligned}$$

(4  $\Rightarrow$  5) Пусть для краткости  $\overline{U_i} = U_1 + \dots + U_{i-1} + U_{i+1} + \dots + U_k$ . Тогда

$$\begin{aligned} \dim(U_i \cap \overline{U_i}) &= \dim U_i + \dim \overline{U_i} - \dim \underbrace{(U_i + \overline{U_i})}_{U_1 + \dots + U_k} \leq \\ &\leq \dim U_i + \dim U_1 + \dots + \dim U_{i-1} + \dim U_{i+1} + \dots + \dim U_k - \dim U_1 - \dots - \dim U_k. \end{aligned}$$

Итак,  $\dim(U_i \cap \overline{U_i}) \leq 0 \implies \dim(U_i \cap \overline{U_i}) = 0 \implies U_i \cap \overline{U_i} = \{\vec{0}\}$ .

(5  $\implies$  1) Пусть  $\vec{0} = u_1 + \dots + u_k$ , где  $u_i \in U_i$ . Тогда для любого  $i$  имеем

$$\begin{aligned} u_i &= -u_1 - \dots - u_{i-1} - u_{i+1} - \dots - u_k \Rightarrow \\ &\Rightarrow u_i \in U_i \cap \overline{U_i} = \{\vec{0}\} \Rightarrow u_i = \vec{0}. \end{aligned}$$

### 3. Описание всех базисов $n$ -мерного векторного пространства в терминах одного базиса и матриц координат. Формула преобразования координат вектора при замене базиса векторного пространства

Пусть  $V$  — векторное пространство,  $\dim V = n$ ,  $e_1, \dots, e_n$  — базис. То есть

$$\forall v \in V : \exists! v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

где  $x_1, \dots, x_n \in F$  — координаты вектора  $v$  в базисе  $(e_1, \dots, e_n)$ . Пусть также есть базис  $e'_1, \dots, e'_n$ :

$$\begin{aligned} e'_1 &= c_{11}e_1 + c_{21}e_2 + \dots + c_{n1}e_n \\ e'_2 &= c_{12}e_1 + c_{22}e_2 + \dots + c_{n2}e_n \\ &\vdots \\ e'_n &= c_{1n}e_1 + c_{2n}e_2 + \dots + c_{nn}e_n \end{aligned}$$

Обозначим матрицу  $C = (c_{ij})$ . Тогда можно переписать  $(e'_1, \dots, e'_n)$  как  $(e_1, \dots, e_n) \cdot C$ .

**Предложение.**  $e'_1, \dots, e'_n$  образуют базис тогда и только тогда, когда  $\det C \neq 0$ .

**Доказательство.**

( $\Rightarrow$ )  $e'_1, \dots, e'_n$  — базис, а значит  $\exists C' \in M_n$ :

$$\begin{aligned} (e_1, \dots, e_n) &= (e'_1, \dots, e'_n)C' = (e_1, \dots, e_n)CC' \\ E &= CC' \\ C' &= C^{-1} \iff \exists C^{-1} \iff \det C \neq 0 \end{aligned}$$

( $\Leftarrow$ )  $\det C \neq 0 \implies \exists C^{-1}$ . Покажем, что  $e'_1, \dots, e'_n$  в таком случае линейно независимы.

Пусть  $\lambda_1 e'_1 + \dots + \lambda_n e'_n = 0$ . Тогда можно записать

$$(e'_1, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = 0 \iff (e_1, \dots, e_n)C \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = 0$$

Так как  $(e_1, \dots, e_n)$  — базис, то  $C \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = 0$ . Умножая слева на обратную матрицу

получаем  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ .

**Предложение.** Формула преобразований координат вектора при переходе к новому базису:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C (x'_1 \dots x'_n).$$

**Доказательство.**

$C$  одной стороны:  $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = (e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ .

$$C \text{ другой стороны: } v = x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n = (e'_1, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (e_1, \dots, e_n) C \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Так как } e_1, \dots, e_n \text{ — линейно независимы, то } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

#### 4. Докажите, что отношение изоморфности на множестве всех векторных пространств является отношением эквивалентности

**Теорема.** "Изоморфность" — отношение эквивалентности на множестве всех векторных пространств над фиксированным полем  $F$ .

**Доказательство.**

I. *Рефлексивность.*  $\varphi : V \rightarrow V$  — изоморфизм.

$$\text{Id} : V \simeq V$$

II. *Симметричность.*  $\varphi : V \rightarrow W$  — изоморфизм  $\implies \varphi^{-1} : W \rightarrow V$  — тоже изоморфизм.

Т.к. отображение  $\varphi^{-1}$  также биективно, то осталось проверить, что оно линейно.

Пусть  $w_1, w_2 \in W$ . Тогда  $\exists v_1, v_2 \in V$ , такие что

$$w_1 = \varphi(v_1), w_2 = \varphi(v_2) \Rightarrow v_1 = \varphi^{-1}(w_1), v_2 = \varphi^{-1}(w_2).$$

Теперь  $\varphi^{-1}(w_1 + w_2) = \varphi^{-1}(\varphi(v_1) + \varphi(v_2)) = \varphi^{-1}(\varphi(v_1 + v_2)) = v_1 + v_2 = \varphi^{-1}(w_1) + \varphi^{-1}(w_2)$ .

$$\varphi^{-1}(\alpha w) = \varphi^{-1}(\alpha \varphi(v)) = \varphi^{-1}(\varphi(\alpha v)) = \alpha v = \alpha \varphi^{-1}(w).$$

III. *Транзитивность.*  $\psi \circ \varphi : U \xrightarrow{\varphi} V \xrightarrow{\psi} W$ . Если  $\varphi$  и  $\psi$  — изоморфизм, то  $\psi \circ \varphi$  — тоже изоморфизм.

Докажем, что если  $\varphi$  и  $\psi$  — линейны, то  $\psi \circ \varphi$  — тоже линейна.

$$(\psi \circ \varphi)(v_1 + v_2) = \psi(\varphi(v_1 + v_2)) = \psi(\varphi(v_1) + \varphi(v_2)) =$$

$$= \psi(\varphi(v_1)) + \psi(\varphi(v_2)) = (\psi \circ \varphi)(v_1) + (\psi \circ \varphi)(v_2).$$

$$(\psi \circ \varphi)(\alpha v) = \psi(\varphi(\alpha v)) = \psi(\alpha \varphi(v)) =$$

$$= \alpha \psi(\varphi(v)) = \alpha (\psi \circ \varphi)(v).$$

Тогда очевидно, что транзитивность следует из линейности, так как композиция двух биективных отображений также биективна.

#### 5. Критерий изоморфности двух конечномерных векторных пространств

**Теорема.**  $V, W$  — конечномерные векторные пространства  $\implies V \simeq W \iff \dim V = \dim W$ . Докажем две леммы.

**Лемма 1.**  $\dim V = n \implies V \simeq F^n$ .

**Доказательство.** Рассмотрим отображение  $\varphi : V \rightarrow F^n$ . Выберем базис  $(e_1, \dots, e_n)$  в  $V$ . Тогда

$$x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad x_i \in F.$$

Отображение является изоморфизмом (т.к. линейно и биективно), а следовательно  $V \simeq F^n$ .

**Лемма 2.** Пусть  $\varphi : V \simeq W$  — изоморфизм.  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $V$ . Тогда  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$  — базис  $W$ .

**Доказательство.** Пусть  $w \in W$ , тогда существует  $v \in V : w = \varphi(v)$ . Положим  $v = \varphi^{-1}(w)$ . Тогда

$$\begin{aligned} \Rightarrow v &= x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \quad x_i \in F \\ \Rightarrow w &= \varphi(v) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n) \\ \Rightarrow W &= \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle \end{aligned}$$

Теперь покажем, что  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$  — линейно независимы.

Пусть  $\alpha_1 \varphi(e_1) + \dots + \alpha_n \varphi(e_n) = 0$ , где  $\alpha_i \in F$ . Тогда  $\varphi(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = 0$ . Применим  $\varphi^{-1}$ :  $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = \varphi^{-1}(0) = 0$ . Так как  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $V$ , то  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ .

**Доказательство теоремы.**

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\dim V = \dim W = n$ . Тогда  $V \simeq F^n$ ,  $W \simeq F^n$  (по лемме 1), а следовательно  $V \simeq W$ .

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $V \simeq W$  и  $\dim V = n$ . Пусть  $\varphi : V \simeq W$  — изоморфизм.  $(e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ .

Тогда  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$  — базис  $W$  (по лемме 2), а следовательно  $\dim W = n = \dim V$ .

## 6. Существование и единственность линейного отображения с заданными образами базисных векторов. Связь между координатами вектора и его образа при линейном отображении. Формула изменения матрицы линейного отображения при замене базисов.

Пусть  $V, W$  — векторные пространства.  $(e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ .  $\varphi : V \rightarrow W$  — линейное отображение.

**Предложение 1.**  $\varphi$  однозначно определено векторами  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ .

**Доказательство.**  $v \in V \Rightarrow v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ , где  $x_i \in F$ .

Тогда  $\varphi(v) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n)$ .

**Предложение 2.** Для любого набора  $w_1, \dots, w_n \in W$  существует единственное линейное отображение  $\varphi : V \rightarrow W$ , такое что  $\varphi(e_1) = w_1, \dots, \varphi(e_n) = w_n$ .

**Доказательство.**  $v \in V$ ,  $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ .

Положим  $\varphi(v) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 w_1 + \dots + x_n w_n$ . Тогда легко убедиться, что  $\varphi$  линейно (прямая проверка), а единственность следует из пункта 1.

**Предложение 3.** Если  $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$  и  $\varphi(v) = y_1 w_1 + \dots + y_n w_n$ , то

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

**Доказательство.**

С одной стороны:

$$\begin{aligned} \varphi(v) &= \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n) = \\ &= (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (w_1, \dots, w_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

С другой стороны:

$$\varphi(v) = (w_1, \dots, w_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Так как } w_1, \dots, w_n \text{ — линейно независимы, то } A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

**Предложение.** Пусть  $V$  и  $W$  — векторные пространства,  $e = (e_1, \dots, e_n)$  и  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  — базисы  $V$ ,  $f = (f_1, \dots, f_m)$  и  $f' = (f'_1, \dots, f'_m)$  — базисы  $W$ ,  $A$  — матрица линейного отображения  $\varphi : V \rightarrow W$  по отношению к  $e$  и  $f$ ,  $A'$  — матрица линейного отображения по отношению к базисам  $e'$  и  $f'$ .  $e' = eC$ ,  $f' = fD$ . Тогда

$$A' = D^{-1}AC \quad (A = DA'C^{-1})$$

**Доказательство.**

$$\begin{aligned} (e'_1, \dots, e'_n) &= (e_1, \dots, e_n)C \Rightarrow \underbrace{(\varphi(e'_1), \dots, \varphi(e'_n))}_{(f'_1, \dots, f'_m)A' = (f_1, \dots, f_m)DA^{-1}} = \\ &= \underbrace{(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))}_{(f_1, \dots, f_m)A} C = (f_1, \dots, f_m)AC \Rightarrow \\ &\Rightarrow DA' = AC \Rightarrow A' = D^{-1}AC. \end{aligned}$$

## 7. Установите изоморфизм между пространствами $\text{Hom}(V, W)$ и $\text{Mat}_{m \times n}$ , где $V$ и $W$ — векторные пространства размерностей $n$ и $m$ соответственно

**Теорема.** При фиксированных базисах  $e$  и  $f$  отображение  $\text{Hom}(V, W) \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(F) : \varphi \rightarrow A(\varphi, e, f)$  является изоморфизмом векторных пространств  $V$  и  $W$ .

Рассмотрим две вещи:

**Утверждение.**  $\text{Hom}(V, W) \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(F) : \varphi \mapsto A(\varphi, e, f)$  является биекцией.

**Вывод.** Задать линейное отображение  $V \rightarrow W$  — то же самое, что выбрать базис  $e$  в  $V$ , базис  $f$  в  $W$  и задать матрицу  $(m \times n)$ , где  $n = \dim V$ ,  $m = \dim W$ .

**Наглядный пример.**  $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x, y)$ .

$e = (e_1, e_2, e_3)$ ,  $f = (f_1, f_2)$ . Тогда  $\varphi(e_1) = e_1$

$$\varphi(e_2) = e_2$$

$$\varphi(e_3) = 0$$

$$\text{Следовательно, } A(\varphi, e, f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Предложение.** Положим  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$

$f = (f_1, \dots, f_m)$  — базис  $W$

$$A_\varphi = A(\varphi, e, f)$$

$$A_\psi = A(\psi, e, f)$$

$$A_{\varphi+\psi} = A(\varphi + \psi, e, f)$$

$$A_{\lambda\varphi} = A(\lambda\varphi, e, f)$$

1.  $A_{\varphi+\psi} = A_\varphi + A_\psi$ :

С одной стороны:  $((\varphi + \psi)e_1, \dots, (\varphi + \psi)e_n) = (f_1, \dots, f_m)A_{\varphi+\psi}$ .

С другой стороны:

$$\begin{aligned}
((\varphi + \psi)e_1, \dots, (\varphi + \psi)e_n) &= (\varphi(e_1) + \psi(e_1), \dots, \varphi(e_n) + \psi(e_n)) = \\
&= (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) + (\psi(e_1), \dots, \psi(e_n)) = \\
&= (f_1, \dots, f_m)A_\varphi + (f_1, \dots, f_m)A_\psi = (f_1, \dots, f_m)(A_\varphi + A_\psi) \Rightarrow \\
&\Rightarrow A_{\varphi+\psi} = A_\varphi + A_\psi.
\end{aligned}$$

2.  $A_{\lambda\varphi} = \lambda A_\varphi$

С одной стороны:  $((\lambda\varphi)e_1, \dots, (\lambda\varphi)e_n) = (f_1, \dots, f_m)A_{\lambda\varphi}$ .

С другой стороны:

$$\begin{aligned}
((\lambda\varphi)e_1, \dots, (\lambda\varphi)e_n) &= (\lambda\varphi(e_1), \dots, \lambda\varphi(e_n)) = \lambda(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = \\
&= \lambda(f_1, \dots, f_m)A_\varphi = (f_1, \dots, f_m)\lambda A_\varphi \Rightarrow \\
&\Rightarrow A_{\lambda\varphi} = \lambda A_\varphi.
\end{aligned}$$

Таким образом, очевидно, что так как отображение биективно и линейно, то оно является изоморфизмом.

## 8. Докажите, что ядро и образ линейного отображения являются подпространствами в соответствующих векторных пространствах. Сформулируйте и докажите критерий инъективности линейного отображения в терминах его ядра

**Предложение 1.**  $\text{Ker}\varphi$  — подпространство в  $V$ .

**Доказательство.** Проверим по определению.

1.  $0_v \in \text{Ker}\varphi$ , так как  $\varphi(0_v) = 0_w$ .
2.  $v_1, v_2 \in \text{Ker}\varphi \Rightarrow \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = 0_w + 0_w = 0_w \Rightarrow v_1 + v_2 \in \text{Ker}\varphi$ .
3.  $v \in \text{Ker}\varphi, \lambda \in F \Rightarrow \varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v) = \lambda 0 = 0 \Rightarrow \lambda v \in \text{Ker}\varphi$ .

**Предложение 2.**  $\text{Im}\varphi$  — подпространство в  $W$ .

**Доказательство.** Проверим по определению.

1.  $0_w = \varphi(0_v) \Rightarrow 0_w \in \text{Im}\varphi$ .
2.  $w_1, w_2 \in \text{Im}\varphi \Rightarrow \exists v_1, v_2 \in V : w_1 = \varphi(v_1), w_2 = \varphi(v_2) \Rightarrow w_1 + w_2 = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = \varphi(v_1 + v_2) \Rightarrow w_1 + w_2 \in \text{Im}\varphi$ .
3.  $w \in \text{Im}\varphi, \lambda \in F \Rightarrow \exists v \in V : \varphi(v) = w \Rightarrow \lambda w = \lambda\varphi(v) = \varphi(\lambda v) \Rightarrow \lambda w \in \text{Im}\varphi$ .

Таким образом, все условия подпространства выполнены.

**Предложение.** Отображение  $\varphi$  инъективно тогда и только тогда, когда  $\text{Ker}\varphi = \{0\}$ .

**Доказательство.**

$(\Rightarrow)$  Очевидно, так как если  $\text{Ker}\varphi = \{0\}$ , то это значит, что все векторы переходят в  $W$ .

$(\Leftarrow)$  Пусть  $v_1, v_2 \in V$  таковы, что  $\varphi(v_1) = \varphi(v_2)$ .

Тогда  $\varphi(v_1 - v_2) = 0 \Rightarrow v_1 - v_2 \in \text{Ker}\varphi \Rightarrow v_1 - v_2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = v_2$ .

## 9. Связь между рангом матрицы линейного отображения и размерностью его образа

Для начала докажем одну лемму.

**Лемма.**  $U \subseteq V$  — подпространство и  $(e_1, \dots, e_k)$  — его базис. Тогда  $\varphi(U) = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k) \rangle$  — подпространство. В частности,  $\dim \varphi(U) \leq \dim U$ .

**Доказательство.**  $u \in U \implies u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k \implies \varphi(u) = \varphi(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k) = \lambda_1 \varphi(e_1) + \dots + \lambda_k \varphi(e_k) \in \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k) \rangle$ .

Пусть  $V, W$  — векторные пространства,  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ ,  $f = (f_1, \dots, f_m)$  — базис  $W$ ,  $A = A(\varphi, e, f)$  — матрица линейного отображения  $\varphi$  по отношению к  $e$  и  $f$ .

**Теорема.**  $\dim \operatorname{Im} \varphi = \operatorname{rk} A$

**Доказательство.** Воспользуемся леммой, доказанной выше:  $\operatorname{Im} \varphi = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle$ .

Координаты вектора  $\varphi(e_i)$  находятся в столбце  $A^{(i)} \implies \lambda_1 \varphi(e_1) + \dots + \lambda_n \varphi(e_n) = 0 \iff \lambda_1 A^{(1)} + \dots + \lambda_n A^{(n)} = 0 \implies \operatorname{rk} \{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)\} = \operatorname{rk} A$ .

$\dim \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k) \rangle = \dim \operatorname{Im} \varphi$ .

## 10. Оценки на ранг произведения двух матриц

**Теорема.** Пусть  $A \in \operatorname{Mat}_{k \times m}$ ,  $B \in \operatorname{Mat}_{m \times n}$ . Тогда  $\operatorname{rk} AB \leq \min(\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} B)$ .

**Доказательство.** Реализуем  $A$  и  $B$  как матрицы линейных отображений, то есть  $\varphi_A : F^m \rightarrow F^k$ ,  $\varphi_B : F^n \rightarrow F^m$ . Тогда  $AB$  будет матрицей отображения  $\varphi_A \circ \varphi_B$ .

$$\operatorname{rk}(AB) = \operatorname{rk}(\varphi_A \circ \varphi_B) = \begin{cases} \leq \operatorname{Im} \varphi_A = \operatorname{rk} A \\ \leq \operatorname{Im} \varphi_B = \operatorname{rk} B \end{cases}$$

Первое неравенство следует из того, что  $\operatorname{Im}(\varphi_A \circ \varphi_B) \subset \operatorname{Im} \varphi_A$ , откуда, в свою очередь следует, что  $\dim \operatorname{Im}(\varphi_A \circ \varphi_B) \leq \dim \operatorname{Im} \varphi_A$ .

Рассматривая второе неравенство, получим:

$$\operatorname{Im}(\varphi_A \circ \varphi_B) = \varphi_A(\operatorname{Im} \varphi_B) \implies \dim \operatorname{Im}(\varphi_A \circ \varphi_B) = \dim(\varphi_A(\operatorname{Im} \varphi_B)) \leq \dim \operatorname{Im} \varphi_B.$$

## 11. Теорема о связи размерностей ядра и образа линейного отображения

Для начала докажем предложение.

**Предложение.** Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$  такой, что  $(e_1, \dots, e_k)$  — базис  $\operatorname{Ker} \varphi$ , а  $(\varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n))$  — базис  $\operatorname{Im} \varphi$ .

*Замечание.* Базис с указанным свойством существует всегда, так как его можно получить путём дополнения базиса  $\operatorname{Ker} \varphi$  до базиса всего пространства  $V$ .

**Доказательство.** Дополним базис  $(e_1, \dots, e_k)$  до базиса  $V$  векторами  $e_{k+1}, \dots, e_n$ . Тогда:

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \varphi &= \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k), \dots, \varphi(e_n) \rangle = \\ &= \langle 0, \dots, 0, \varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n) \rangle = \\ &= \langle \varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n) \rangle. \end{aligned}$$

$\varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n)$  — линейно независимы. Тогда пусть  $\alpha_{k+1} \varphi(e_{k+1}) + \dots + \alpha_n \varphi(e_n) = 0$ , где  $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n \in F$ . Тогда:

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n) &= 0 \implies \\ \implies \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n &\in \operatorname{Ker} \varphi \implies \\ \implies \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n &= \beta_{k+1} e_{k+1} + \dots + \beta_n e_n, \text{ где } \beta_{k+1}, \dots, \beta_n \in F. \end{aligned}$$

Но так как  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $V$ , то  $\alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = \beta_{k+1} = \dots = \beta_n = 0$ . То есть векторы  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$  — линейно независимы, а значит они образуют базис  $\operatorname{Im} \varphi$ .

**Теорема.**  $\dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V - \dim \operatorname{Ker} \varphi$ .

**Доказательство.** Выберем базис в  $V$  такой же, как в предположении.

Тогда  $\dim \operatorname{Im} \varphi = n - k = \dim V - \dim \operatorname{Ker} \varphi$ .



## 12. Приведение матрицы линейного отображения к диагональному виду с единицами и нулями на диагонали

Пусть  $\varphi : V \rightarrow W$  — линейное отображение.  $e$  — базис  $V$ ,  $f$  — базис  $W$ .

$A = A(\varphi, e, f) \in \text{Mat}_{m \times n}$ ,  $\text{rk} A = r$ .

**Утверждение.** Существуют базис  $e'$  в  $V$  и базис  $f'$  в  $W$  такие, что  $A(\varphi, e', f')$  имеет вид:

$$A' = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right), \text{rk} A' = r$$

**Эквивалентное утверждение.** Существуют невырожденные матрицы  $C \in M_n$ ,  $D \in M_m$ , такие что  $A' = D^{-1}AC \iff A = DA'C^{-1}$ .

**Доказательство.** Реализуем  $A$  как матрицу линейного отображения  $\varphi : F^n \rightarrow F^m$  в стандартных базисах.

Тогда существует базис  $e = (e_1, \dots, e_n)$  такой, что  $(e_{r+1}, \dots, e_n)$  — базис  $\text{Ker} \varphi$ , а  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r)$  — базис  $\text{Im} \varphi$ .

Пусть  $f$  — базис  $F^m$ , дополняющий систему  $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r)$ . Тогда  $A(\varphi, e, f) = A'$ .

Результат следует из теоремы о замене базисов.

## 13. Докажите, что всякий базис сопряженного пространства двойственен к некоторому базису исходного векторного пространства

**Предложение.** Любой базис  $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  пространства  $V^*$  двойственен к некоторому базису пространства  $V$ .

**Доказательство.** Возьмём произвольный базис  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  пространства  $V$ .

Пусть  $\varepsilon' = (\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n)$  двойственный к  $e'$  базис в  $V^*$ .

Тогда  $\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \varepsilon'_1 \\ \vdots \\ \varepsilon'_n \end{pmatrix}$  для некоторой невырожденной матрицы  $C \in M_n$ .

Положим  $e = (e_1, \dots, e_n) = (e'_1, \dots, e'_n)C^{-1}$  — некий (искомый) базис в  $V$ .

Зная, что  $\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} (e_1, \dots, e_n) = E$ , имеем  $\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} (e_1, \dots, e_n) = C \begin{pmatrix} \varepsilon'_1 \\ \vdots \\ \varepsilon'_n \end{pmatrix} (e'_1, \dots, e'_n)C^{-1} = CEC^{-1} = E$ .

## 14. Докажите, что всякое подпространство в $F^n$ является множеством решений некоторой однородной системы линейных уравнений

**Теорема.** Всякое подпространство  $F^n$  есть множество решений некоторой ОСЛУ.

**Доказательство.** Пусть  $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$ .

$$(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \text{ — значение линейной функции } \alpha = (a_1, \dots, a_n) \text{ на векторе } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Пусть дано подпространство  $U \subseteq F^n$ . Выберем в нём базис  $(v_1, \dots, v_k)$ .

Рассмотрим в  $(F^n)^*$  подмножество  $S := \{\alpha \in (F^n)^* \mid \alpha(v_1) = 0, \dots, \alpha(v_k) = 0\}$ .  $S$  — подпространство в  $(F^n)^*$ .

$$S \text{ — множество решений ОСЛУ } \begin{cases} \alpha(v_1) = 0, \\ \vdots \\ \alpha(v_k) = 0 \end{cases} \text{ на коэффициенты } \alpha.$$

Так как  $v_1, \dots, v_k$  линейно независимы, то ранг матрицы коэффициентов равен  $k \implies \dim S = n - k$ .

$$\text{Выберем в } S \text{ базис } \alpha_1, \dots, \alpha_{n-k} \text{ и рассмотрим ОСЛУ } \begin{cases} \alpha_1(x) = 0, \\ \vdots \\ \alpha_{n-k}(x) = 0 \end{cases} \text{ относительно неиз-}$$

вестного вектора  $x \in F^n$ .

Пусть  $U' \subseteq F^n$  — подпространство решений этой ОСЛУ.

Ранг матрицы коэффициентов равен  $n - k$ , так как  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-k}$  линейно независимы  $\implies \dim U' = n - (n - k) = k$ . Но  $U \subseteq U'$  по построению.

$$\text{Так как } \dim U = k = \dim U', \text{ то } U = U' \implies \begin{cases} \alpha_1(x) = 0, \\ \vdots \\ \alpha_{n-k}(x) = 0 \end{cases} \text{ — искомая ОСЛУ.}$$

## 15. Формула для вычисления значений билинейной формы в координатах. Существование и единственность билинейной формы с заданной матрицей. Формула изменения матрицы билинейной формы при переходе к другому базису

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$  ( $\dim V = n < \infty$ ).

**Определение.** Матрица  $B = B(\beta, e)$ , где  $b_{ij} = \beta(e_i, e_j)$ , называется матрицей билинейной функции  $\beta$  в базисе  $e$ .

Пусть  $B = B(\beta, e)$ ,  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ ,  $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V$ ,  $y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n \in V$ .

$$\begin{aligned} \beta(x, y) &= \beta\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \beta(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j) = \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j \cdot \underbrace{\beta(e_i, e_j)}_{b_{ij}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i b_{ij} y_j = \\ &= (x_1, \dots, x_n) B \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad (*) \end{aligned}$$

(\*) — формула для вычисления значений б.ф. в координатах.

Пусть  $e$  — произвольный базис  $V$ . Тогда:

**Предложение 1.** Любая билинейная функция однозначно определяется своей матрицей в базисе  $e$ .

**Доказательство 1.** Следует из (\*).

**Предложение 2.** Для любой матрицы  $V \in M_n(F)$  существует единственная билинейная функция  $\beta$  на  $V$ , такая что  $B(\beta, e) = V$ .

**Доказательство 2.** Единственность следует из 1.

*Существование:* зададим  $\beta$  по формуле (\*). Тогда  $\beta$  — билинейная функция на  $V$  и её матрицей является  $B$ .

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  и  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  — два базиса  $V$ .  $\beta$  — билинейная функция на  $V$ .  $e' = eC$  — матрица перехода.  $B = B(\beta, e)$  и  $B' = B(\beta, e')$ .

**Предложение.**  $B' = C^T B C$ .

**Доказательство.** Рассмотрим  $x$  в обоих базисах.

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n$$

$$y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n = y'_1 e'_1 + \dots + y'_n e'_n$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

$$(x'_1, \dots, x'_n) B' \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} = \beta(x, y) = (x_1, \dots, x_n) B \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\beta(x, y) = (x'_1, \dots, x'_n) C^T B C \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

Отсюда следует, что  $B' = C^T B C$ , так как для любого  $p \in \text{Mat}_n$  верно

$$p_{ij} = (0 \dots i \dots 0) p \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

## 16. Соответствие между симметричными билинейными формами и квадратичными формами

Пусть в поле  $F$  выполняется условие  $1 + 1 \neq 0$  (т.е.  $2 \neq 0$ ).

Тогда отображение  $\beta \mapsto Q_\beta$  является биекцией между симметричными билинейными функциями на  $V$  и квадратичными функциями на  $V$ .

**Доказательство.**

*Сюръективность.* Пусть  $\beta$  — билинейная функция. Рассмотрим ассоциированную с ней квадратичную функцию  $Q_\beta(x) = \beta(x, x)$ . Пусть  $\sigma(x, y) = \frac{1}{2}(\beta(x, y) + \beta(y, x))$  — симметричная билинейная функция на  $V$ . Тогда:

$$Q_\sigma(x) = \sigma(x, x) = \frac{1}{2}(\beta(x, x) + \beta(x, x)) = \beta(x, x) = Q_\beta(x)$$

*Инъективность.* Пусть  $\beta(x, y)$  — симметричная билинейная функция,  $Q_\beta(x) = \beta(x, x)$  — соответствующая ей квадратичная функция.

$$\begin{aligned} Q_\beta(x+y) &= \beta(x+y, x+y) = \beta(x, x) + \beta(x, y) + \beta(y, x) + \beta(y, y) = \\ &= Q_\beta(x) + Q_\beta(y) + \underbrace{2\beta(x, y)}_{\beta(x, y) = \beta(y, x)} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \beta(x, y) = \frac{1}{2}(Q_\beta(x+y) - Q_\beta(x) - Q_\beta(y)).$$

## 17. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду

Пусть  $V$  — векторное пространство,  $\dim V = n$ ,  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис  $V$ ,  $Q : V \rightarrow F$  — квадратичная функция на  $V$ .

**Теорема** (метод Лагранжа). Пусть в  $F : 1 + 1 \neq 0$ . Тогда для всякой квадратичной функции  $Q$  существует такой базис, в котором  $Q$  имеет канонический вид.

**Доказательство.**

Оформим *индукцию* по  $n$ .

$n = 1$ : тогда  $Q(x) = b_{11}x_1^2$  — канонический вид, очевидно.

Предположим, что для всех  $< n$ , докажем для  $n$ . Пусть в исходном базисе  $e$ :

$$Q(x) = Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii}x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2b_{ij}x_i x_j,$$

где  $B = (b_{ij})$  — матрица квадратичной функции  $Q$ .

Случай 0:  $b_{ij} = 0$  для всех  $i, j$ . Тогда очевидно.

Случай 1: существует такое  $i$ , что  $b_{ii} \neq 0$ . Перенумеруем переменные так, что  $b_{11} \neq 0$ :

$$\begin{aligned} Q(x_1, \dots, x_n) &= b_{11}x_1^2 + 2b_{12}x_1x_2 + \dots + 2b_{1n}x_1x_n + Q_1(x_2, \dots, x_n) = \\ &= \frac{1}{b_{11}}(b_{11}^2x_1^2 + 2b_{11}b_{12}x_1x_2 + \dots + 2b_{11}b_{1n}x_1x_n) + Q_1(x_2, \dots, x_n) = \\ &= \frac{1}{b_{11}}(b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n)^2 - \underbrace{\frac{1}{b_{11}}(b_{12}x_2 + \dots + b_{1n}x_n)^2}_{Q_2(x_2, \dots, x_n)} + Q_1(x_2, \dots, x_n) = \\ &= \frac{1}{b_{11}}(b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n)^2 + Q_2(x_2, \dots, x_n) = \\ &= \frac{1}{b_{11}}x_1'^2 + Q_2(x_2', \dots, x_n'), \end{aligned}$$

$$\text{где } \begin{cases} x_1' = b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n, \\ x_2' = x_2, \\ \vdots \\ x_n' = x_n \end{cases}, \text{ то есть замена координат } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{b_{11}}(x_1' - b_{12}x_2' - \dots - b_{1n}x_n'), \\ x_2 = x_2', \\ \vdots \\ x_n = x_n' \end{cases}.$$

Далее применяем предположение индукции к  $Q_2(x_2', \dots, x_n')$ .

Случай 2:  $b_{ii} = 0$  для всех  $i$ , но существует  $b_{ij} \neq 0$  при  $i < j$ .

Б.о.о. считаем, что  $b_{12} \neq 0$ . Делаем замену:

$$\begin{cases} x_1 = x_1' - x_2', \\ x_2 = x_1' + x_2', \\ x_3 = x_3', \\ \vdots \\ x_n = x_n' \end{cases} \quad \text{Тогда } Q(x') = \underbrace{2b_{12}x_1'^2 - 2b_{12}x_2'^2}_{2b_{12}x_1x_2} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2b_{ij}x_i'x_j', \text{ что есть 1-й случай.}$$

## 18. Метод Якоби приведения квадратичной формы к каноническому виду

Вначале докажем леммочку.

$$\text{Пусть } \mathfrak{e}' \text{ — базис } V, \text{ имеющий вид } \begin{cases} e'_1 = e_1, \\ e'_2 \in e_2 + \langle e_1 \rangle, \\ e'_3 \in e_3 + \langle e_1, e_2 \rangle, \\ \vdots \\ e'_n \in e_n + \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle \end{cases} \quad (*),$$

$$\begin{aligned} B' &= B(Q, \mathfrak{e}') \\ B'_k &= B_k(Q, \mathfrak{e}') \\ \delta'_k &= \delta_k(Q, \mathfrak{e}') \end{aligned}$$

**Лемма.**  $\forall k = 1, \dots, n : \delta_k = \delta'_k$ .

**Доказательство.** При любом  $k$  имеем  $B'_k = C_k^T B_k C_k \Rightarrow \delta'_k = \det B'_k = \det(C_k^T B_k C_k) = (\det C_k^T)(\det B_k)(\det C_k) = \det B_k = \delta_k$ .

**Теорема** (метод Якоби). Положим, что  $\delta_k = 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ . Тогда единственно существует базис  $\mathfrak{e}' = (e'_1, \dots, e'_n)$  в  $V$  такой, что

1.  $\mathfrak{e}'$  имеет вид  $(*)$

2. В этом базисе  $Q$  имеет канонический вид  $Q(x) = \frac{\delta_1}{\delta_0} x_1'^2 + \frac{\delta_2}{\delta_1} x_2'^2 + \dots + \frac{\delta_n}{\delta_{n-1}} x_n'^2$

(то есть  $B(Q, \mathfrak{e}') = \text{diag}(\frac{\delta_1}{\delta_0}, \frac{\delta_2}{\delta_1}, \dots, \frac{\delta_n}{\delta_{n-1}})$ ).

**Доказательство.**

Оформим *индукцию* по  $n$ .

$n = 1$ :  $Q(x) = \delta_1 x_1'^2$  — очевидно, верно.

Докажем для  $n - 1$ . Пусть векторы  $e'_1, \dots, e'_{n-1}$  уже построены:

$$B(Q, (e'_1, \dots, e'_{n-1}, e_n)) = \begin{pmatrix} \delta_1 & & & * \\ & \frac{\delta_2}{\delta_1} & & * \\ & & \ddots & * \\ & 0 & & \frac{\delta_{n-1}}{\delta_{n-2}} & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Ищем  $e'_n$  в виде  $e_n + \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle = e_n + \langle e'_1, \dots, e'_{n-1} \rangle$ ,

т.е. в виде  $e'_n = e_n + \lambda_1 e'_1 + \dots + \lambda_{n-1} e'_{n-1}$ .

Пусть  $\beta : V \times V \rightarrow F$  — симметричная билинейная функция, соответствующая  $Q$

$$\beta(e'_n, e'_k) = \beta(e'_n, e_n) + \lambda_k \beta(e'_k, e'_k) = \beta(e'_n, e_n) + \lambda_k \frac{\delta_k}{\delta_{k-1}}.$$

Значит  $\beta(e'_n, e'_k) = 0 \iff \lambda_k = -\beta(e_n, e'_n) \frac{\delta_k}{\delta_{k-1}}$  — единственное значение.

В итоге построен базис  $\mathfrak{e}' = (e'_1, \dots, e'_n)$  такой, что

$$B(Q, (e'_1, \dots, e'_{n-1}, e_n)) = \begin{pmatrix} \delta_1 & & & \\ & \frac{\delta_2}{\delta_1} & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & \frac{\delta_{n-1}}{\delta_{n-2}} & ? \end{pmatrix}$$

Но в силу доказанной выше леммы  $\delta_n = \delta'_n = \delta_1 \cdot \frac{\delta_2}{\delta_1} \cdot \dots \cdot \frac{\delta_{n-1}}{\delta_{n-2}} \cdot ? = \delta_{n-1} \cdot ? \implies ? = \frac{\delta_n}{\delta_{n-1}}$ .

## 19. Существование нормального вида для квадратичной формы над $\mathbb{R}$ . Закон инерции

**Предложение.** Для любой квадратичной формы  $Q$  над  $\mathbb{R}$  существует базис, в котором  $Q$  принимает нормальный вид.

**Доказательство.** Знаем, что существует базис, в котором  $Q$  имеет канонический вид.  
 $Q(x) = b_1x_1^2 + \dots + b_nx_n^2$ .

Делаем невырожденную замену  $x_i = \begin{cases} \frac{x'_i}{\sqrt{|b_i|}}, & \text{если } b_i \neq 0, \\ x'_i, & \text{если } b_i = 0 \end{cases}$

Тогда в новых координатах (= новом базисе)  $Q$  имеет вид  $Q(x') = \varepsilon_1x_1'^2 + \dots + \varepsilon_nx_n'^2$ ,

где  $\varepsilon_i = \operatorname{sgn} b_i = \begin{cases} 1, & b_i > 0, \\ 0, & b_i = 0, \\ -1, & b_i < 0 \end{cases}$ . Всё доказали.

Пусть  $Q$  — квадратичная функция над  $R$ , которая в базисе  $e$  имеет нормальный вид:

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_{s+t}^2,$$

где  $s$  — количество положительных слагаемых,  $t$  — количество отрицательных слагаемых. Тогда

$i_+ := s$  — **положительный индекс инерции** квадратичной формы  $Q$

$i_- := t$  — **отрицательный индекс инерции** квадратичной формы  $Q$

**Теорема** (закон инерции). Числа  $i_+ = s$  и  $i_- = t$  не зависят от базиса, в котором  $Q$  принимает нормальный вид.

**Доказательство.**  $s + t = \operatorname{rk} Q$  — инвариантная величина  $\Rightarrow$  достаточно доказать инвариантность  $s$ .

Пусть базис  $e = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$  таков, что в нём  $Q(x) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_{s+t}^2$

Пусть базис  $e' = \langle e'_1, \dots, e'_n \rangle$  таков, что в нём  $Q(x) = x_1'^2 + \dots + x_s'^2 - x_{s+1}'^2 - \dots - x_{s+t}'^2$

Предположим, что  $s \neq s'$ . Можем считать, что  $s > s'$ .

Рассмотрим в  $V$  подпространства  $\begin{cases} L = \langle e_1, \dots, e_s \rangle, \dim L = s, \\ L' = \langle e'_{s+1}, \dots, e'_{s+t} \rangle, \dim L' = s'. \end{cases}$

$L + L' \subseteq V \Rightarrow \dim(L + L') \leq \dim V = n$ .

Тогда  $\dim(L \cap L') = \dim L + \dim L' - \dim(L + L') \geq s + n - s' - n = s - s' > 0$ .

Тогда  $\exists v \in L \cap L', v \neq 0$ .

Т.к.  $v \in L$ , то  $Q(v) > 0$ .

Т.к.  $v \in L'$ , то  $Q(v) \leq 0$ .

Противоречие!

## 20. Следствие метода Якоби о нахождении индексов инерции квадратичной формы над $\mathbb{R}$ . Критерий Сильвестра положительной определённости квадратичной формы. Критерий отрицательной определённости квадратичной формы

$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$  — квадратичная форма

$e = (e_1, \dots, e_n)$  — базис

$B = B(Q, e)$

$B_k = B_k(Q, e)$

$\delta_k = \det B_k$  —  $k$ -й угловой минор

**Следствие** (метода Якоби). Пусть  $\delta_k \neq 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ .

Тогда  $i_-$  равен числу перемен знака в последовательности  $1, \delta_1, \dots, \delta_n$ .

**Доказательство.** Метод Якоби: существует базис, в котором  $Q$  принимает вид

$$Q(x) = \frac{\delta}{1}x_1^2 + \frac{\delta_2}{\delta_1} + \dots + \frac{\delta_n}{\delta_{n+1}}.$$

Получаем, что если для некоторого  $i$  выполняется  $\frac{\delta_i}{\delta_{i-1}} < 0$ , значит  $\operatorname{sgn} \delta_i \neq \operatorname{sgn} \delta_{i-1}$ , что и означает, что отрицательный индекс  $i_-$  равен числу перемен знака.

**Теорема** (Критерий Сильвестра).  $Q > 0$  тогда и только тогда, когда  $\delta_k > 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ .

**Доказательство.**

$\Leftarrow$  Следует из следствия метода Якоби:  $i_- = 0 \implies i_+ = n \implies Q > 0$ .

$\Rightarrow$   $Q > 0 \implies$  существует матрица  $C \in M_n(\mathbb{R})$ ,  $\det C \neq 0$ , такая что  $C^T B C = E$ . Тогда  $\det C^T \cdot \det B \cdot \det C = 1 \implies \delta_n = \det B = \frac{1}{(\det C)^2} > 0$ .

$\forall k$   $B_k$  есть матрица ограничения квадратной функции  $Q$  на подпространство  $\langle e_1, \dots, e_k \rangle$ . На этом подпространстве будет также положительная определенность  $\implies \delta_k = \det B_k > 0$ .

**Теорема** (критерий отрицательной определенности).

$$Q < 0 \iff \begin{cases} \delta_i < 0, & i \not\equiv 2 \\ \delta_i > 0, & i \equiv 2 \end{cases}$$

**Доказательство.**  $Q < 0 \iff -Q > 0$ . Далее применяем критерий Сильвестра.