

● 多类情况 2


采用每对划分，即 ω_i / ω_j 两分法，
此时一个判别界面只能分开两种类别，
但不能把它与其余所有的界面分开。
其判别函数为：

$$d_{ij}(x) = w_{ij}^T x$$

若 $d_{ij}(x) > 0, \forall j \neq i$ ，则 $x \in \omega_i$

重要性质： $d_{ij} = -d_{ji}$

图例：对一个三类情况， $d_{12}(x)=0$ 仅能
分开 ω_1 和 ω_2 类，不能分开 ω_1
和 ω_3 类。



要分开 M 类模式，共需 $M(M-1)/2$ 个判别函数。

不确定区域：若所有 $d_{ij}(x)$ ，找不到 $\forall j \neq i, d_{ij}(x) > 0$ 的情况。

例：设有一个三类问题，其判别函数为：

$$d_{12}(x) = -x_1 - x_2 + 5, \quad d_{13}(x) = -x_1 + 3, \quad d_{23}(x) = -x_1 + x_2$$

若 $x = (4, 3)^T$ ，则： $d_{12}(x) = -2, d_{13}(x) = -1, d_{23}(x) = -1$

$$\text{有：} \begin{cases} d_{12}(x) < 0 \\ d_{13}(x) < 0 \end{cases}, \begin{cases} d_{21}(x) = -d_{12}(x) > 0 \\ d_{23}(x) < 0 \end{cases}, \begin{cases} d_{31}(x) = -d_{13}(x) > 0 \\ d_{32}(x) = -d_{23}(x) > 0 \end{cases}$$

从而 $x \in \omega_3$

若 $x = (2.8, 2.5)^T$ ，则： $d_{12}(x) = -0.3, d_{13}(x) = 0.2, d_{23}(x) = -0.3$

$$\text{有：} \begin{cases} d_{12}(x) < 0 \\ d_{13}(x) > 0 \end{cases}, \begin{cases} d_{21}(x) > 0 \\ d_{23}(x) < 0 \end{cases}, \begin{cases} d_{31}(x) < 0 \\ d_{32}(x) > 0 \end{cases}$$

分类失败。