Plano de treino detalhado – Hipertrofia natural, 5x por semana

Preparado para Raul · outubro de 2026 · PPL + Upper/Lower · Academia comercial, 1 hora por sessão à noite

A. Resumo do perfil

Homem de 27 anos, 178 cm, 75,6 kg e 14% de gordura corporal. Atleta natural avançado, com objetivo de ganhar massa muscular. Treina 5x por semana, 1 hora após o trabalho, em academia comercial. Não tem lesões nem exercícios que queira evitar. Quer cardio na bicicleta ou no simulador de remada e não quer aquecimento.

B. Visão geral do treino

Divisão: PPL + Upper/Lower. Ela dá frequência 2x por grupo muscular, que é o ideal para hipertrofia natural, e cabe em 1 hora por sessão. Os 5 dias seguidos permitem 2 dias de descanso no fim de semana, quando entra o cardio.

Dia	Sessão
Segunda	Push
Terça	Pull
Quarta	Pernas (ênfase em quadríceps)
Quinta	Upper
Sexta	Lower (ênfase em posterior e glúteos)
Sábado e domingo	Cardio leve (seção E)

Para caber em 1 hora, os isoladores são feitos em **bi-set (SS)**: você faz uma série de cada exercício, um logo depois do outro, e só então descansa. Os compostos ficam isolados, com descanso completo. Nos dias de fisioterapia, comece o treino por volta das 19h30.

C. Treino detalhado

Sem aquecimento geral, como você pediu. Mesmo assim, faça 1-2 séries leves de aproximação no primeiro exercício de cada dia (por exemplo, 50% e 70% da carga de trabalho com 5-8 repetições). Isso não conta como aquecimento e protege as articulações

quando a carga é alta.

Cool-down (3 min, opcional, vale para todos os dias): alongue de 20 a 30 segundos os grupos que mais trabalharam, com respiração lenta.

Segunda – Push

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
Supino inclinado com halteres	3 × 6-10 · 2-3 min	Peitoral superior, ombro anterior, tríceps	Banco a 30°, escápulas fixas, cotovelos a ~45-60° do tronco, desce até alongar o peito	Cotovelos abertos a 90°, ombros para a frente
Supino reto (barra ou máquina)	3 × 6-10 · 2-3 min	Peitoral, tríceps	Pés firmes, arco lombar leve, barra toca o meio do peito	Tirar o glúteo do banco, quicar a barra
Desenvolvimento com halteres sentado	3 × 8-12 · 2 min	Deltoides, tríceps	Tronco neutro, antebraços verticais, sobe sem travar o cotovelo	Arquear a lombar para empurrar
SS: Elevação lateral	4 × 12-20 · 60-90 s	Deltoide lateral	Leve inclinação à frente, cotovelo ligeiramente dobrado, sobe até a altura do ombro	Balançar o tronco, subir o trapézio
SS: Tríceps na corda	3 × 10-15	Tríceps	Cotovelos colados ao tronco, abre a corda no final	Afastar os cotovelos, usar o corpo
Tríceps francês ou testa	3 × 8-12 · 1,5 min	Tríceps (cabeça longa)	Cotovelos apontando para o teto, desce até alongar	Cotovelos abrindo, usar carga demais

Terça – Pull

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
Barra fixa ou puxada	3 × 6-10 · 2-3 min	Dorsais, bíceps	Puxe os cotovelos para baixo e para trás, peito para a barra	Usar impulso, amplitude curta
Remada curvada ou cavalinho	3 × 8-10 · 2 min	Dorsais, trapézio, romboides	Tronco a ~45°, coluna neutra, puxa até o abdômen	Arredondar a lombar, balançar o corpo
Remada no cabo ou unilateral	3 × 10-12 · 1,5-2 min	Dorsais, romboides	Escápulas se aproximam no final, volta controlando	Encolher os ombros, tronco indo e vindo
SS: Face pull	3 × 12-20 · 60-90 s	Deltoide posterior, manguito	Corda à altura do rosto, cotovelos altos	Carga excessiva, puxar com a lombar
SS: Rosca inclinada	3 × 8-12	Bíceps (cabeça longa)	Banco inclinado, braços pendentes, cotovelos fixos	Balançar os ombros, não estender totalmente
Rosca martelo	2 × 10-12 · 1 min	Braquial, braquiorradial	Pegada neutra, cotovelos fixos	Usar o tronco para subir

Quarta – Pernas (quadríceps)

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
Agachamento	3 × 5-8 · 3 min	Quadríceps, glúteos, eretores	Pés na largura dos ombros, coluna neutra, desce até pelo menos o paralelo	Joelhos para dentro, arredondar a lombar

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
Stiff (carga moderada, 3 RIR)	3 × 8-10 · 2 min	Posterior, glúteos	Joelhos levemente flexionados, quadril vai para trás, barra rente à perna	Arredondar a coluna, agachar em vez de dobrar o quadril
Leg press	3 × 8-12 · 2-3 min	Quadríceps, glúteos	Pés na largura dos ombros, desce até ~90°, não trava os joelhos	Tirar o quadril do banco, amplitude curta
Cadeira extensora	3 × 10-15 · 1,5 min	Quadríceps	Segura 1 s no topo, desce em 2-3 s	Jogar a carga com impulso
Panturrilha em pé ou no leg press	4 × 8-15 · 1-1,5 min	Gastrocnêmio, sóleo	Amplitude total, pausa no alongamento	Quicar, amplitude curta

Quinta – Upper

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
Supino (variação diferente da de segunda)	3 × 8-12 · 2 min	Peitoral, tríceps	Mesmos pontos do supino de segunda	Mesmos erros
Remada com peito apoiado	3 × 8-12 · 2 min	Dorsais, romboides	Peito colado no apoio, escápulas fixas	Levantar o peito do apoio
Puxada pegada neutra	2 × 10-12 · 1,5 min	Dorsais, bíceps	Peito para fora, puxa até a clavícula	Inclinar demais o tronco
SS: Crucifixo ou cross-over	2 × 12-15	Peitoral	Cotovelos levemente dobrados, abraça o ar	Transformar em supino, carga alta

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
SS: Elevação lateral	3 × 15-20	Deltoide lateral	Igual a segunda	Igual a segunda
SS: Rosca	2 × 10-15	Bíceps	Cotovelos fixos ao tronco	Balançar o corpo
SS: Tríceps (qualquer variação)	2 × 10-15	Tríceps	Cotovelos fixos, estende totalmente	Compensar com o ombro

Sexta – Lower (posterior e glúteos)

Exercício	Séries × reps · descanso	Músculos	Execução	Erro comum
Stiff ou levantamento romeno (dia pesado)	3 × 6-10 · 2-3 min	Posterior, glúteos, eretores	Quadril para trás, coluna neutra, desce até sentir alongar	Arredondar a coluna, barra longe do corpo
Hack squat ou afundo búlgaro	3 × 8-12 · 2 min	Quadríceps, glúteos	Controle na descida, joelho alinhado ao pé	Joelho para dentro, tronco jogado
Mesa flexora	3 × 10-15 · 1,5 min	Posterior de coxa	Quadril colado no banco, volta em 2-3 s	Levantar o quadril
Hip thrust	3 × 8-12 · 2 min	Glúteos	Queixo para o peito, extensão completa e pausa 1 s	Hiperestender a lombar
SS: Panturrilha	4 × 10-20	Gastrocnêmio, sóleo	Amplitude total	Quicar
SS: Abdômen (infra ou prancha)	3 × 10-15	Reto abdominal	Lombar colada, movimento controlado	Puxar o pescoço

D. Progressão

1. **Dupla progressão:** comece cada exercício no limite inferior das repetições, com 1-3 RIR (repetições de reserva).
2. A cada treino, tente +1 repetição por série. Quando fizer o topo da faixa em todas as séries, aumente a carga em 2-5% e volte ao limite inferior.
3. **Registre tudo:** carga, repetições e RIR. Sem isso, a progressão não acontece de forma consistente.
4. **Blocos de 12 semanas:** semanas 1-4 com 2-3 RIR, semanas 5-8 com 1-2 RIR e +1 série nos pontos fracos, semanas 9-11 com 0-1 RIR nos isoladores, semana 12 de deload (50% do volume).
5. Se um exercício ficar 3 semanas sem progredir, troque a variação ou revise sono e calorias.

E. Cardio

Item	Recomendação
Frequência	2x por semana, sábado e domingo
Duração	30-40 minutos
Tipo	Bicicleta ou simulador de remada, alternando entre as sessões
Intensidade	Zona 2: ritmo em que dá para conversar, esforço 5-6 em 10, cerca de 115-135 bpm
Opcional	10-15 min leves na bicicleta ao fim do Upper ou do Lower, se quiser mais volume

O cardio é para saúde cardiovascular e recuperação, não para queimar gordura. Cada sessão gasta cerca de 250-350 kcal, então some isso ao seu superávit alimentar. Evite remo intenso em dias de Pull ou Lower para não prejudicar a recuperação da lombar.

F. Estilo de vida

- **Treino à noite:** termine pelo menos 2-3 horas antes de dormir. Cafeína e pré-treino só até o início da tarde, para não atrapalhar o sono.
- **Alimentação:** uma refeição completa com carboidrato e proteína 1,5-2 h antes do treino. Jantar logo depois, com 30-50 g de proteína e carboidrato.

- **Meta diária:** superávit de 200-300 kcal sobre a manutenção, proteína de 135-165 g (1,8-2,2 g/kg) e ganho de 0,15-0,25 kg por semana.
- **Hidratação:** 2,5-3 litros por dia, mais nos dias de cardio.
- **Sono:** 7-9 horas. É o que mais influencia a recuperação e o ganho de massa muscular.
- **Estresse:** semanas muito estressantes no trabalho justificam reduzir 1 série por exercício, sem cortar a frequência.

G. Avisos importantes

Este plano é uma recomendação baseada em evidências, mas não substitui orientação médica nem acompanhamento presencial de um profissional de educação física. Consulte um médico antes de iniciar qualquer programa novo, especialmente se tiver alguma condição de saúde. Pare o exercício diante de dor aguda, tontura ou desconforto no peito, e priorize sempre a técnica antes da carga.