

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total parcelas analizadas	10
Impacto total estimado (EUR)	12196.83
Impacto promedio (EUR/ha)	1219.68
Impacto maximo (EUR/ha)	3755.25
Porcentaje de perdida medio	19.3 %

2. DISTRIBUCION DE RIESGO POR PERDIDA

Nivel de Riesgo	N. Parcelas	% del Total	Umbral (pct_perdida)
BAJO	3	30.0 %	< 5 %
MEDIO	1	10.0 %	5 % - 15 %
ALTO	3	30.0 %	15 % - 30 %
MUY ALTO	3	30.0 %	> 30 %

3. TOP 10 PARCELAS MAS AFECTADAS

Parcela	Perdida (%)	Impacto (EUR/ha)	Nivel de Riesgo
TEST_10	48.6 %	3755.25	MUY ALTO
TEST_07	26.3 %	2499.74	ALTO
TEST_08	35.0 %	1508.64	MUY ALTO
TEST_05	17.6 %	1350.11	ALTO
TEST_09	30.1 %	1137.88	MUY ALTO
TEST_06	23.5 %	1040.00	ALTO
TEST_04	11.3 %	866.57	MEDIO
TEST_03	0.9 %	38.66	BAJO
TEST_02	0.0 %	0.00	BAJO
TEST_01	0.0 %	0.00	BAJO

4. ANALISIS DETALLADO POR PARCELA (IA Agronomica)

Parcela: TEST_10 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 48.6% | Impacto: 3755.25 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, ubicada en Granada, presenta un sistema de manejo intensivo con una variedad de olivar Picual. El suelo es arcilloso y tiene un drenaje malo, lo que puede agravar los efectos de la lluvia extrema. Con un estado fenológico de cuajado, la planta está en una fase crítica para el desarrollo del fruto. La humedad del suelo es alta (76.9%), lo que indica que el suelo ya está saturado antes del evento de lluvia, lo que puede contribuir a problemas de encharcamiento.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados en esta parcela son:

- ****Encharcamiento****: La lluvia acumulada (260 mm en 72 horas) superó la capacidad de drenaje del suelo, lo que resultó en un encharcamiento prolongado (5.17 días).

- **Erosión**: La pendiente del 1% es relativamente baja, pero el mal drenaje y la alta cantidad de lluvia pueden provocar erosión superficial.
- **Estrés radicular**: El encharcamiento puede causar estrés en las raíces, afectando la absorción de nutrientes y agua.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada de rendimiento es del 48.65%. Este porcentaje indica un impacto significativo en la producción, lo que sugiere que las condiciones de encharcamiento han afectado gravemente la salud de las plantas y su capacidad para producir aceitunas. Esta pérdida es considerable, especialmente en un cultivo intensivo donde se espera un rendimiento alto.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 3755.25 €/ha. Este valor refleja la pérdida de ingresos potenciales debido a la reducción en la producción de aceitunas. Dado el precio de mercado de 0.83 €/kg y el rendimiento esperado de 9300 kg/ha, la pérdida económica es considerable y puede afectar la viabilidad financiera de la explotación.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Mejorar el drenaje**: Implementar sistemas de drenaje para reducir el encharcamiento, como zanjas de drenaje o la mejora de la estructura del suelo.
- **Manejo del riego**: Ajustar el riego para evitar la saturación del suelo, especialmente antes de eventos de lluvia pronosticados.
- **Control de enfermedades**: Monitorear y aplicar tratamientos preventivos contra el repilo, dado el riesgo elevado por el exceso de humedad.
- **Incorporar materia orgánica**: Aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo para mejorar la estructura y la capacidad de retención de agua.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar un sistema de drenaje adecuado para mitigar el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_07 | Riesgo: ALTO | Perdida: 26.3% | Impacto: 2499.74 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, ubicada en Málaga, presenta un sistema de cultivo superintensivo con variedad Arbequina en estado de floración. El suelo es franco y tiene un drenaje moderado, lo que puede influir en la retención de agua tras el evento de lluvia. Con una pendiente del 1.5%, la escorrentía puede ser moderada, pero la cantidad de lluvia acumulada (155 mm en 72 horas) es significativa, lo que puede generar problemas de encharcamiento y afectar el desarrollo de las raíces.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- **Encharcamiento**: La duración del encharcamiento es de 3.64 días, lo que puede provocar estrés radicular y afectar la absorción de nutrientes.
- **Erosión**: Aunque la pendiente es baja, la cantidad de lluvia puede generar escorrentía superficial, especialmente en suelos con poca cobertura vegetal.
- **Estrés radicular**: Debido al encharcamiento, las raíces pueden sufrir falta de oxígeno, lo que afecta el crecimiento de la planta.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 26.3% indica un impacto considerable en la producción. Esto sugiere que, a pesar de que el olivar está en un estado fenológico favorable (floración), las condiciones adversas provocadas por el exceso de agua pueden comprometer la formación de frutos y, por ende, el rendimiento final.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 2499.74 €/ha es significativo. Esto representa una pérdida considerable en términos de ingresos, dado que el precio de mercado es de 0.88 €/kg y el rendimiento esperado es de 10,800 kg/ha. La combinación de la pérdida de

rendimiento y el costo variable de producción resalta la vulnerabilidad económica de la parcela ante eventos climáticos extremos.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar un sistema de drenaje adecuado para reducir el tiempo de encharcamiento.
- Evaluar la posibilidad de modificar el manejo del nitrógeno para evitar el exceso que puede agravar problemas de enfermedades como el repilo.
- Considerar la siembra de cubiertas vegetales que ayuden a mejorar la estructura del suelo y reducir la erosión.
- Monitorear la humedad del suelo para ajustar el riego y evitar situaciones de estrés hídrico.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje para mitigar el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_08 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 35.0% | Impacto: 1508.64 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, ubicada en Córdoba, presenta un tipo de suelo arcilloso con drenaje malo, lo que puede contribuir a problemas de encharcamiento tras eventos de lluvia intensa. En el momento del evento, el olivar se encontraba en estado de cuajado, lo que significa que los frutos estaban en desarrollo y eran susceptibles a daños por exceso de agua. La combinación de una lluvia de 210 mm en 72 horas y una humedad del suelo del 76.7% indica que el suelo ya estaba saturado, lo que aumenta el riesgo de escorrentía y erosión.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados en esta parcela son:

- Encharcamiento: La lluvia intensa y el drenaje malo del suelo han llevado a un encharcamiento significativo, con una duración estimada de 5.03 días.
- Erosión: La escorrentía generada por la lluvia puede causar erosión del suelo, especialmente en pendientes suaves como la de 1.8%.
- Estrés radicular: El encharcamiento puede provocar estrés en las raíces de las plantas, afectando su desarrollo y producción.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada de rendimiento es del 35.04%. Este porcentaje indica un impacto significativo en la producción, lo que puede ser crítico para la viabilidad económica del cultivo. La alta pérdida se debe a la combinación de encharcamiento y el estado fenológico del olivar, que lo hace más vulnerable a daños.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 1508.64 €/ha. Este valor refleja la pérdida de ingresos que el agricultor podría experimentar debido a la reducción en la producción de aceitunas. Dado el precio de mercado de 0.82 €/kg y el rendimiento esperado de 5250 kg/ha, la reducción en la producción puede tener consecuencias financieras severas para el agricultor.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar un sistema de drenaje adecuado para mejorar la evacuación del agua y reducir el encharcamiento.
- Realizar un análisis del suelo para ajustar el manejo del nitrógeno y evitar el exceso que puede agravar enfermedades como el repilo.
- Considerar la siembra de cubiertas vegetales que ayuden a mejorar la estructura del suelo y reducir la erosión.
- Monitorear la salud de las plantas y aplicar tratamientos preventivos para el repilo, dado el riesgo elevado por las condiciones actuales.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje para mitigar el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_05 | Riesgo: ALTO | Perdida: 17.6% | Impacto: 1350.11 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, ubicada en Sevilla, presenta un tipo de suelo limoso con un drenaje moderado y una pendiente del 3.2%. En el momento del evento, el olivar se encontraba en estado de floración, lo que lo hace vulnerable a condiciones adversas. La humedad del suelo es alta (68.7%), lo que, combinado con las lluvias intensas (128 mm en 72 horas y 235 mm en 7 días), puede provocar problemas de encharcamiento y estrés en las raíces.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- **Encharcamiento**: La duración del encharcamiento es de 3.65 días, lo que puede afectar la aireación del suelo y el desarrollo radicular.
- **Erosión**: Aunque la pendiente es moderada, las lluvias intensas pueden generar escorrentía superficial, especialmente en suelos con alta humedad.
- **Estrés radicular**: El exceso de agua puede provocar condiciones anaeróbicas, afectando la salud de las raíces y, por ende, el crecimiento del olivar.
- **Repilo**: La combinación de exceso de humedad y condiciones de manejo (exceso de abono nitrogenado) puede favorecer el desarrollo de enfermedades como el repilo.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada es del 17.62%. Este porcentaje indica un impacto significativo en la producción, especialmente considerando que el olivar se encuentra en estado de floración, donde la polinización y el cuajado de frutos son críticos. La pérdida puede atribuirse a la combinación de encharcamiento y el riesgo de enfermedades, que pueden afectar tanto la cantidad como la calidad de la cosecha.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 1350.11 €/ha. Este valor refleja la pérdida de ingresos que podría sufrir el productor debido a la reducción en la producción esperada. Dado el precio de mercado de 0.77 €/kg y el rendimiento esperado de 9950 kg/ha, la pérdida económica es considerable y debe ser atendida para minimizar el daño financiero.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Mejorar el drenaje**: Implementar sistemas de drenaje para reducir el tiempo de encharcamiento y mejorar la aireación del suelo.
- **Manejo del nitrógeno**: Ajustar las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados para evitar el exceso que puede favorecer enfermedades.
- **Monitoreo de enfermedades**: Realizar un seguimiento constante de la aparición de repilo y otras enfermedades, aplicando tratamientos preventivos si es necesario.
- **Cubiertas vegetales**: Considerar el uso de cubiertas vegetales para mejorar la estructura del suelo y reducir la erosión.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar un sistema de drenaje adecuado para reducir el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_09 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 30.1% | Impacto: 1137.88 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, ubicada en Sevilla, presenta un sistema de riego de secano y un tipo de suelo limoso con drenaje malo. En el momento del evento, el olivar se encontraba en estado de cuajado, lo que lo hace vulnerable a condiciones adversas. La lluvia

acumulada en 72 horas fue de 165 mm, y en 7 días alcanzó los 340 mm, lo que indica un evento de lluvia extrema. La humedad del suelo estaba al 75%, lo que sugiere que el suelo ya estaba bastante saturado antes de la lluvia, aumentando el riesgo de encharcamiento.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados en esta parcela son:

- **Encharcamiento**: La lluvia intensa y el drenaje malo del suelo han llevado a un encharcamiento significativo, con una duración estimada de 4.65 días.
- **Erosión**: La pendiente del 1.3%, aunque baja, combinada con el tipo de suelo y el exceso de agua, puede favorecer la erosión superficial.
- **Estrés radicular**: El encharcamiento prolongado puede causar estrés en las raíces, afectando la absorción de nutrientes y agua.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada de rendimiento es del 30.08%. Este porcentaje indica que, debido al evento de lluvia extrema, se espera que una parte significativa de la producción se vea comprometida. Esto es especialmente crítico en el estado fenológico de cuajado, donde el desarrollo del fruto es esencial para el rendimiento final.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 1137.88 €/ha. Este valor refleja la pérdida de ingresos que el agricultor podría experimentar debido a la reducción en la producción de aceitunas. Dado el precio de mercado de 0.78 €/kg y el rendimiento esperado de 4850 kg/ha, la pérdida económica es considerable y podría afectar la viabilidad financiera de la explotación.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Para mitigar el impacto del evento de lluvia extrema, se recomiendan las siguientes acciones:

- **Mejorar el drenaje del suelo**: Implementar sistemas de drenaje para reducir el encharcamiento y mejorar la aireación del suelo.
- **Manejo del nitrógeno**: Ajustar la aplicación de fertilizantes nitrogenados para evitar el exceso que puede agravar problemas de enfermedades como el repilo.
- **Monitoreo de la salud del olivar**: Realizar un seguimiento de la aparición de enfermedades y estrés en las plantas, aplicando tratamientos fitosanitarios si es necesario.
- **Implementar prácticas de conservación**: Considerar la siembra de cubiertas vegetales o la implementación de terrazas para reducir la erosión y mejorar la retención de agua.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar un sistema de drenaje adecuado para reducir el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_06 | Riesgo: ALTO | Perdida: 23.5% | Impacto: 1040.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, de 13.8 ha, presenta un tipo de suelo franco-arcilloso con un drenaje moderado y una pendiente del 2.8%. En el momento del evento de lluvia, el olivar se encontraba en estado de cuajado, lo que es crítico para el desarrollo del fruto. La humedad del suelo estaba en un 68.5%, lo que indica que el suelo ya estaba relativamente húmedo antes de las lluvias. La lluvia acumulada en 72 horas fue de 145 mm, lo que puede haber llevado a un encharcamiento significativo, dado el drenaje moderado del suelo.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- **Encharcamiento**: La duración del encharcamiento fue de 3.97 días, lo que puede afectar negativamente a las raíces del olivar, causando estrés radicular.
- **Erosión**: Con una lluvia intensa y un suelo húmedo, existe el riesgo de erosión superficial, especialmente en pendientes suaves.
- **Estrés radicular**: El exceso de agua puede provocar falta de oxígeno en el suelo, afectando la salud de las raíces.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada de rendimiento es del 23.49%. Esto indica que, debido a las condiciones adversas provocadas por la lluvia extrema, se espera que una parte significativa de la producción se vea afectada. Este porcentaje es considerable, especialmente en un cultivo como el olivar, donde cada año de producción es crucial para la rentabilidad.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 1039.99 €/ha. Esto representa una pérdida considerable en términos de ingresos, dado que el precio de mercado del aceite de oliva es de 0.82 €/kg y el rendimiento esperado es de 5400 kg/ha. La combinación de la pérdida de rendimiento y el precio del producto resalta la vulnerabilidad económica del cultivo ante eventos climáticos extremos.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar un sistema de drenaje adicional para mejorar la evacuación del agua en caso de lluvias intensas.
- Evaluar y ajustar el manejo del nitrógeno para evitar el exceso que puede agravar problemas de enfermedades como el repilo.
- Realizar prácticas de conservación de suelos, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir la erosión y mejorar la estructura del suelo.
- Monitorear la salud del olivar tras el evento para detectar y tratar enfermedades oportunistas de manera temprana.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje adicional para mitigar el encharcamiento en futuras lluvias extremas.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_04 | Riesgo: MEDIO | Perdida: 11.3% | Impacto: 866.57 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, con una superficie de 20.5 ha y un tipo de suelo franco-arcilloso, presenta un estado fenológico de cuajado. La humedad del suelo es alta (74.1%), lo que, combinado con un drenaje malo y una lluvia acumulada de 118 mm en 72 horas, sugiere un riesgo significativo de encharcamiento. La pendiente del 3% es moderada, lo que puede contribuir a la escorrentía, pero no es excesivamente pronunciada.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- Encharcamiento: Debido a la lluvia intensa y el drenaje malo, se estima una duración de encharcamiento de 3.7 días.
- Erosión: La escorrentía puede ser un problema, aunque la pendiente moderada ayuda a mitigar este riesgo.
- Estrés radicular: El encharcamiento puede provocar falta de oxígeno en las raíces, afectando el crecimiento y desarrollo del olivar.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada de rendimiento es del 11.28%. Esto indica que, aunque no es un porcentaje extremadamente alto, es significativo y puede afectar la producción total, especialmente en un cultivo como el olivar que tiene un rendimiento esperado de 9600 kg/ha.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 866.57 €/ha. Esto representa una pérdida considerable que puede afectar la rentabilidad del cultivo. Dado el precio de mercado de 0.8 €/kg, esta pérdida se traduce en una reducción de aproximadamente 1083 kg de aceitunas por hectárea, lo que puede tener un efecto negativo en la viabilidad económica de la parcela.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Mejorar el drenaje del suelo mediante la implementación de zanjas de drenaje o sistemas de drenaje subterráneo.
- Realizar un análisis de suelo para ajustar el manejo del nitrógeno y evitar el exceso que puede agravar problemas como el repilo.
- Implementar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir la erosión y mejorar la estructura del suelo.

- Monitorear la salud de las plantas y aplicar tratamientos preventivos para el repilo, dado el riesgo identificado.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar un sistema de drenaje adecuado para reducir el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

medio

Parcela: TEST_03 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.9% | Impacto: 38.66 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar se encuentra en un estado de floración, lo que es crítico para el desarrollo del fruto. La textura del suelo es franco y presenta un buen drenaje, lo que es favorable para la retención de humedad y el crecimiento de las raíces. Sin embargo, la pendiente del 11% puede aumentar la escorrentía durante eventos de lluvia intensa, como el registrado (105 mm en 72 horas), lo que podría afectar la estabilidad del suelo y la salud de las plantas.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son el encharcamiento, dado que la lluvia acumulada puede saturar el suelo y afectar el sistema radicular, y la erosión, que puede ser exacerbada por la pendiente y la intensidad de la lluvia. Además, el exceso de abono nitrogenado y la falta de aireación pueden agravar el riesgo de enfermedades como el repilo.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada es del 0.0092%, lo que indica un impacto muy bajo en la producción. Esto sugiere que, a pesar del evento de lluvia extrema, la parcela ha mantenido su capacidad productiva, posiblemente gracias al buen drenaje del suelo y a la resistencia de la variedad Picual.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 38.66 €/ha. Este valor es relativamente bajo, lo que indica que, aunque ha habido una pérdida, esta no representa una amenaza significativa para la viabilidad económica de la parcela. La producción esperada sigue siendo favorable, y el precio de mercado puede compensar la ligera pérdida.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Para mitigar el impacto de eventos de lluvia extrema en el futuro, se recomienda:

- Implementar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir la erosión.
- Monitorear y ajustar la aplicación de fertilizantes nitrogenados para evitar el exceso que puede favorecer enfermedades.
- Realizar un análisis de la estructura del suelo para mejorar la aireación y la capacidad de retención de agua.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar un programa de monitoreo del estado del suelo y de las plantas para anticipar y mitigar los efectos de la lluvia extrema.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_02 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar, ubicada en Cádiz, presenta un sistema de manejo intensivo con una variedad de Manzanilla en estado fenológico de engorde. El tipo de suelo es arenoso, lo que favorece un buen drenaje, y la pendiente del 18% puede facilitar la escorrentía. La humedad del suelo es del 27.1%, lo que indica una buena retención de agua, y el drenaje se clasifica como bueno, lo que sugiere que la parcela está en condiciones adecuadas para soportar el evento de lluvia reciente.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos asociados a este evento de lluvia extrema incluyen:

- Encharcamiento: Aunque la duración del encharcamiento fue de solo 0.13 días, la cantidad de lluvia (85 mm en 72 horas) podría haber generado condiciones temporales de encharcamiento.
- Erosión: La pendiente del 18% puede aumentar el riesgo de erosión superficial, especialmente en suelos arenosos, aunque el buen drenaje puede mitigar este riesgo.
- Estrés radicular: La saturación temporal del suelo podría haber afectado la aireación, pero el drenaje adecuado sugiere que el impacto fue mínimo.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada es del 0.0%, lo que indica que no se anticipa un impacto negativo en la producción debido al evento de lluvia. Esto sugiere que las condiciones de manejo y el estado del suelo han sido suficientes para evitar daños significativos en la cosecha.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 0.0 €/ha, lo que significa que no se prevén pérdidas financieras asociadas a este evento de lluvia. Esto es positivo, ya que la producción esperada de 6100 kg/ha a un precio de 0.77 €/kg no se verá afectada, manteniendo la rentabilidad de la parcela.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Mantener un monitoreo regular de la humedad del suelo y la salud de las plantas para detectar cualquier signo de estrés.
- Implementar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir el riesgo de erosión en pendientes.
- Evaluar el uso de abonos nitrogenados, dado que el exceso puede agravar problemas como el repilo, especialmente en condiciones de alta humedad.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Realizar un monitoreo continuo de la salud del olivar y la humedad del suelo para anticipar y mitigar cualquier efecto adverso en futuros eventos de lluvia.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_01 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar se encuentra en un estado fenológico de brotación, lo que indica que las plantas están comenzando su ciclo vegetativo. El tipo de suelo es franco, lo que favorece una buena retención de humedad y drenaje, y la pendiente del 9% es moderada, lo que puede ayudar a la escorrentía sin provocar erosión significativa. La humedad del suelo está en un 28.1%, lo que es adecuado para el desarrollo de las plantas en esta fase. La combinación de estos factores sugiere que la parcela está en condiciones relativamente favorables para el cultivo.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos detectados en la parcela incluyen:

- **Encharcamiento**: Aunque la duración del encharcamiento es de 0 días, la lluvia acumulada (22 mm en 7 días) podría haber generado condiciones de saturación temporal, aunque el drenaje es bueno.
- **Erosión**: La pendiente del 9% puede facilitar la escorrentía, pero el tipo de suelo y el manejo adecuado pueden mitigar este riesgo.
- **Estrés radicular**: No se ha reportado encharcamiento, lo que sugiere que el riesgo de estrés radicular es bajo.
- **Repilo**: El exceso de abono nitrogenado y la falta de aireación pueden agravar el riesgo de enfermedades como el repilo.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada es del 0.0%, lo que indica que no se anticipa un impacto negativo en la producción debido al evento de lluvia. Esto sugiere que las condiciones de la parcela, incluyendo el drenaje y el estado del suelo, han sido suficientes para manejar el agua de lluvia sin causar daños significativos a las plantas.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 0.0 €/ha, lo que significa que no se espera ninguna pérdida financiera derivada del evento de lluvia. Esto es positivo, ya que la producción esperada de 5000 kg/ha a un precio de 0.82 €/kg no se verá afectada, manteniendo la viabilidad económica de la parcela.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Monitorear la humedad del suelo y ajustar el manejo del riego para evitar el exceso de agua en el futuro.
- Implementar prácticas de manejo que mejoren la aireación del suelo y reduzcan el riesgo de enfermedades, como el repilo.
- Considerar la rotación de cultivos o la diversificación de variedades para aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Realizar un monitoreo regular de la salud del suelo y de las plantas para detectar signos tempranos de estrés o enfermedades.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo