

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total parcelas analizadas	10
Impacto total estimado (EUR)	12196.85
Impacto promedio (EUR/ha)	1219.68
Impacto maximo (EUR/ha)	3755.25
Porcentaje de perdida medio	19.3 %

2. DISTRIBUCION DE RIESGO POR PERDIDA

Nivel de Riesgo	N. Parcelas	% del Total	Umbral (pct_perdida)
BAJO	3	30.0 %	< 5 %
MEDIO	1	10.0 %	5 % - 15 %
ALTO	3	30.0 %	15 % - 30 %
MUY ALTO	3	30.0 %	> 30 %

3. TOP 10 PARCELAS MAS AFECTADAS

Parcela	Perdida (%)	Impacto (EUR/ha)	Nivel de Riesgo
TEST_10	48.6 %	3755.25	MUY ALTO
TEST_07	26.3 %	2499.74	ALTO
TEST_08	35.0 %	1508.64	MUY ALTO
TEST_05	17.6 %	1350.11	ALTO
TEST_09	30.1 %	1137.88	MUY ALTO
TEST_06	23.5 %	1040.00	ALTO
TEST_04	11.3 %	866.57	MEDIO
TEST_03	0.9 %	38.66	BAJO
TEST_02	0.0 %	0.00	BAJO
TEST_01	0.0 %	0.00	BAJO

4. ANALISIS DETALLADO POR PARCELA (IA Agronomica)

Parcela: TEST_10 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 48.6% | Impacto: 3755.25 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_10" se encuentra en un estado crítico debido a las condiciones climáticas recientes. Con una lluvia acumulada de 260 mm en 72 horas y 380 mm en 7 días, el suelo arcilloso y con drenaje malo ha llevado a un encharcamiento significativo, afectando el estado fenológico de cuajado de la variedad Picual.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- Encharcamiento: La duración del encharcamiento es de 5.17 días, lo que puede causar estrés radicular y afectar el desarrollo de los árboles.
- Erosión: La escorrentía generada por la lluvia intensa puede provocar erosión del suelo, especialmente en suelos arcillosos con

mala capacidad de drenaje.

- Estrés radicular: La saturación del suelo puede limitar la disponibilidad de oxígeno para las raíces, afectando la salud de las plantas.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 48.65% indica un impacto severo en la producción esperada. Esto sugiere que casi la mitad de la producción potencial se verá comprometida, lo que puede ser resultado de la combinación de encharcamiento y estrés en las plantas.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 3755.25 €/ha refleja la gravedad de la situación. Dado el rendimiento esperado de 9300 kg/ha y el precio de mercado de 0.83 €/kg, la pérdida económica se traduce en una reducción significativa de ingresos, lo que puede afectar la viabilidad económica de la explotación.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar sistemas de drenaje para mejorar la evacuación del agua en la parcela.
- Realizar un análisis del suelo para evaluar la posibilidad de enmiendas que mejoren la estructura del suelo y su capacidad de drenaje.
- Considerar la siembra de cubiertas vegetales que ayuden a reducir la erosión y mejorar la retención de humedad en el suelo.
- Monitorear el estado de las plantas y aplicar tratamientos fitosanitarios si se detectan signos de estrés.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje adecuado para mitigar el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_07 | Riesgo: ALTO | Perdida: 26.3% | Impacto: 2499.74 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_07" se encuentra en estado de floración, lo que es crítico para el desarrollo del fruto. El tipo de suelo es franco, lo que permite una buena retención de humedad, pero el drenaje es moderado, lo que puede ser problemático en eventos de lluvia extrema. La pendiente del 1.5% es relativamente baja, lo que podría ayudar a reducir la escorrentía, aunque la cantidad de lluvia registrada en 72 horas (155 mm) es considerable.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos en esta parcela incluyen:

- Encharcamiento: La duración del encharcamiento es de 3.64 días, lo que puede afectar negativamente a las raíces y la salud general de las plantas.
- Erosión: Aunque la pendiente es baja, la cantidad de lluvia puede provocar erosión superficial, especialmente en áreas con menor cobertura vegetal.
- Estrés radicular: El encharcamiento prolongado puede causar asfixia radicular, afectando el crecimiento y la producción del olivar.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 0.263% indica que, aunque es un porcentaje relativamente bajo, en términos absolutos puede representar una cantidad significativa de producción, dado el rendimiento esperado de 10,800 kg/ha. Esto sugiere que, aunque la parcela no está en una situación crítica, el evento de lluvia ha tenido un impacto negativo que debe ser monitoreado.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 2499.74 €/ha es considerable, dado que representa una pérdida potencial significativa en ingresos. Esto se traduce en una reducción en la rentabilidad del cultivo, lo que puede afectar la viabilidad económica de la explotación, especialmente en un contexto de precios de mercado de 0.88 €/kg.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar sistemas de drenaje mejorados para reducir el tiempo de encharcamiento.
- Realizar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para minimizar la erosión.
- Monitorear la humedad del suelo y ajustar el riego para evitar el estrés hídrico en las plantas.
- Evaluar la posibilidad de aplicar enmiendas orgánicas para mejorar la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje adecuado para reducir el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

medio

Parcela: TEST_08 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 35.0% | Impacto: 1508.64 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_08" presenta un estado fenológico de cuajado, lo que indica que los frutos están en desarrollo. Sin embargo, las condiciones de drenaje son malas y el suelo es arcilloso, lo que puede dificultar la infiltración del agua. La alta humedad del suelo (76.7%) y la lluvia acumulada en 72 horas (210 mm) han generado un riesgo significativo de encharcamiento.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- Encharcamiento: La duración del encharcamiento es de 5.03 días, lo que puede afectar la salud de las raíces y el desarrollo del olivar.
- Erosión: La pendiente del 1.8% y el tipo de suelo arcilloso pueden contribuir a la erosión superficial, especialmente con lluvias intensas.
- Estrés radicular: El encharcamiento prolongado puede provocar estrés en las raíces, afectando la absorción de nutrientes y agua.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 0.3504% indica que, a pesar de las condiciones adversas, el impacto en la producción no es extremadamente alto. Sin embargo, esta cifra refleja una vulnerabilidad considerable, especialmente en un sistema de riego de secano donde la disponibilidad de agua es crítica para el rendimiento.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 1508.64 €/ha es significativo, dado que representa una pérdida considerable en el ingreso potencial de la parcela. Esto se traduce en una reducción en el rendimiento esperado, que podría afectar la viabilidad económica del cultivo a corto plazo.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar sistemas de drenaje para mejorar la evacuación del agua y reducir el encharcamiento.
- Realizar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para minimizar la erosión.
- Monitorear la humedad del suelo y ajustar las prácticas de manejo del riego para evitar el estrés radicular.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje adecuado para mitigar el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_05 | Riesgo: ALTO | Perdida: 17.6% | Impacto: 1350.11 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_05" se encuentra en estado de floración, lo que es crítico para el desarrollo del fruto. La combinación de un suelo limoso con un drenaje moderado y una pendiente del 3.2% puede facilitar la retención de agua, pero también puede generar

problemas de encharcamiento tras eventos de lluvia extrema. La humedad del suelo es alta (68.7%), lo que indica que el suelo ya está saturado antes del evento de lluvia.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- Encharcamiento: La lluvia acumulada de 128 mm en 72 horas, junto con una duración de encharcamiento de 3.65 días, sugiere que el suelo no puede drenar adecuadamente el exceso de agua.
- Erosión: Aunque el tipo de suelo es limoso, la pendiente moderada puede contribuir a la erosión superficial, especialmente si la lluvia es intensa y rápida.
- Estrés radicular: El encharcamiento prolongado puede afectar la oxigenación del suelo, causando estrés a las raíces de las plantas.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 0.1762% indica que, aunque el evento de lluvia ha tenido un impacto, este es relativamente bajo en comparación con otros eventos extremos. Sin embargo, es importante considerar que esta cifra puede ser un indicativo de un problema potencial si se repiten eventos similares, ya que la acumulación de pérdidas puede afectar el rendimiento a largo plazo.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 1350.11 €/ha es significativo, dado que representa una pérdida en el rendimiento esperado de la producción de aceitunas. Esto puede afectar la rentabilidad de la parcela, especialmente considerando el coste variable de 1690 €/ha. La relación entre el precio de mercado (0.77 €/kg) y el rendimiento esperado (9950 kg/ha) sugiere que cualquier pérdida en producción tiene un efecto directo en los ingresos.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar sistemas de drenaje mejorados para reducir el encharcamiento.
- Realizar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para minimizar la erosión.
- Monitorear la humedad del suelo y ajustar el riego para evitar saturaciones.
- Evaluar la posibilidad de realizar un análisis de la estructura del suelo para mejorar su capacidad de drenaje.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar sistemas de drenaje para mitigar el encharcamiento en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

medio

Parcela: TEST_09 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 30.1% | Impacto: 1137.88 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_09" presenta un estado fenológico de cuajado, lo que indica que los frutos están en desarrollo. Sin embargo, la combinación de un suelo limoso con un drenaje malo y una alta humedad del suelo (75%) tras un evento de lluvia extrema de 165 mm en 72 horas, sugiere que la parcela está en riesgo de encharcamiento y erosión.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- Encharcamiento: La duración del encharcamiento es de 4.65 días, lo que puede afectar negativamente el desarrollo de las raíces y la salud general de los árboles.
- Erosión: La pendiente del 1.3% y el tipo de suelo limoso pueden facilitar la erosión superficial, especialmente con la escorrentía generada por la lluvia intensa.
- Estrés radicular: El encharcamiento prolongado puede causar estrés en las raíces, afectando la absorción de nutrientes y agua.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 30.08% indica un impacto significativo en la producción esperada. Esto sugiere que, debido a las condiciones adversas, se espera que más de un cuarto de la producción potencial se vea comprometida, lo que puede llevar a una reducción en el rendimiento y en la calidad de la aceituna.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 1137.88 €/ha refleja la pérdida de ingresos que podría resultar de la reducción en la producción de aceitunas. Dado el rendimiento esperado de 4850 kg/ha y el precio de mercado de 0.78 €/kg, esta pérdida representa una disminución considerable en los ingresos potenciales de la parcela.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar sistemas de drenaje para mejorar la evacuación del agua y reducir el encharcamiento.
- Realizar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para disminuir la erosión.
- Monitorear la humedad del suelo y ajustar el manejo del riego para evitar el estrés hídrico en los árboles.
- Evaluar la posibilidad de aplicar enmiendas orgánicas para mejorar la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje adecuado para mitigar el encharcamiento y mejorar la salud del suelo.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_06 | Riesgo: ALTO | Perdida: 23.5% | Impacto: 1040.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_06" presenta un estado fenológico de cuajado, lo que indica que los frutos están en desarrollo. La combinación de un suelo franco-arcilloso y un drenaje moderado sugiere que la retención de agua es adecuada, pero el evento de lluvia extrema de 145 mm en 72 horas ha generado un riesgo significativo de encharcamiento, especialmente considerando la humedad del suelo del 68.5%.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos identificados son:

- Encharcamiento: La duración del encharcamiento se estima en 3.97 días, lo que puede afectar negativamente el desarrollo radicular y la salud general del olivar.
- Erosión: La pendiente del 2.8% y el tipo de suelo pueden facilitar la erosión superficial, especialmente con lluvias intensas.
- Estrés radicular: El encharcamiento prolongado puede provocar estrés en las raíces, afectando la absorción de nutrientes y agua.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 0.2349% indica que, a pesar de las condiciones adversas, el impacto en la producción no es catastrófico. Sin embargo, esta cifra refleja una vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, lo que podría llevar a pérdidas más significativas en el futuro si las condiciones se repiten.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 1040.0 €/ha es considerable, dado que representa una pérdida significativa en el rendimiento esperado de 5400 kg/ha. Esto se traduce en una reducción de ingresos potenciales, considerando el precio de mercado de 0.82 €/kg, lo que podría afectar la viabilidad económica de la explotación.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar prácticas de conservación de suelos, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir la erosión.
- Mejorar el drenaje de la parcela, posiblemente mediante la instalación de zanjas de drenaje o la modificación de la topografía para facilitar la evacuación del agua.
- Monitorear la salud del suelo y las raíces tras el evento de lluvia, aplicando tratamientos si se detectan signos de estrés radicular.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar un sistema de drenaje adecuado para mitigar el encharcamiento y mejorar la salud del olivar.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_04 | Riesgo: MEDIO | Perdida: 11.3% | Impacto: 866.57 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA
- La parcela de olivar "TEST_04" presenta un estado fenológico de cuajado, lo que indica que los frutos están en desarrollo. La combinación de un suelo franco-arcilloso y un drenaje malo, junto con una alta humedad del suelo (74.1%), sugiere que la parcela es susceptible a problemas de encharcamiento, especialmente tras un evento de lluvia extrema como el registrado (118 mm en 72 horas).
2. RIESGOS DETECTADOS
- Los principales riesgos en esta parcela incluyen:
- Encharcamiento: La duración del encharcamiento es de 3.7 días, lo que puede afectar negativamente a las raíces.

- Erosión: La pendiente del 3% y el tipo de suelo pueden facilitar la erosión superficial, especialmente en condiciones de escorrentía.

- Estrés radicular: El encharcamiento puede provocar falta de oxígeno en el suelo, afectando el desarrollo radicular.
3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA
- La pérdida estimada del 0.1128% indica que, aunque es relativamente baja, puede tener un impacto significativo en el rendimiento, especialmente en un cultivo intensivo como el olivar. Esto sugiere que, aunque la parcela ha soportado el evento de lluvia, la combinación de factores como el drenaje malo y el estado fenológico puede llevar a pérdidas adicionales si no se gestionan adecuadamente.
4. IMPACTO ECONÓMICO
- El impacto económico estimado de 866.57 €/ha refleja la pérdida potencial de ingresos debido a la reducción en el rendimiento y la calidad de la producción. Dado el rendimiento esperado de 9600 kg/ha y el precio de mercado de 0.8 €/kg, esta pérdida puede traducirse en una reducción significativa en los ingresos totales de la parcela.
5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS
- Mejorar el drenaje de la parcela mediante la implementación de zanjas de drenaje o sistemas de drenaje subterráneo.

- Realizar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir la erosión.

- Monitorear la humedad del suelo y ajustar el riego para evitar encharcamientos en períodos de lluvia intensa.
6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA
- Implementar un sistema de drenaje adecuado para reducir el riesgo de encharcamiento.
7. NIVEL DE RIESGO
- medio

Parcela: TEST_03 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.9% | Impacto: 38.66 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA
- La parcela de olivar "TEST_03" se encuentra en estado de floración, lo que es crítico para el desarrollo del fruto. La combinación de un suelo franco con buen drenaje y una pendiente del 11% sugiere que la parcela tiene un potencial adecuado para el cultivo. Sin embargo, el evento de lluvia extrema de 105 mm en 72 horas puede haber generado condiciones de estrés, especialmente considerando que el riego es de seco.
2. RIESGOS DETECTADOS
- Los principales riesgos identificados son:
- Encharcamiento: La duración del encharcamiento fue de 1 día, lo que puede afectar el desarrollo radicular.

- Erosión: La lluvia intensa puede haber causado escorrentía superficial, especialmente en la pendiente del 11%.

- Estrés radicular: La saturación del suelo puede haber limitado la disponibilidad de oxígeno para las raíces.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada del 0.0092% indica que, aunque hubo un impacto, este es relativamente bajo. Esto sugiere que la parcela ha manejado adecuadamente la escorrentía y el encharcamiento, minimizando el daño a los cultivos.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado de 38.66 €/ha es una cifra que refleja la pérdida potencial en ingresos debido al evento de lluvia. Dado el rendimiento esperado de 5050 kg/ha y el precio de mercado de 0.83 €/kg, esta pérdida representa una fracción pequeña del ingreso total esperado, lo que indica que el evento no ha tenido un impacto devastador en términos económicos.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir la erosión.
- Evaluar la posibilidad de mejorar el drenaje superficial para mitigar el encharcamiento en eventos de lluvia intensa.
- Monitorear la humedad del suelo y el estado de las raíces para prevenir el estrés radicular en futuras lluvias.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Instalar sistemas de drenaje adicional para mejorar la gestión del agua en la parcela.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_02 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_02" se encuentra en un estado fenológico de engorde, lo que indica que los frutos están en desarrollo. La variedad Manzanilla es adecuada para el clima mediterráneo de Cádiz, y el tipo de suelo arenoso, junto con un buen drenaje, favorecen la retención de humedad y el crecimiento de las plantas. Sin embargo, el evento de lluvia reciente ha sido significativo, con 85 mm en 72 horas y 140 mm en 7 días, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la gestión del agua en la parcela.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos detectados en esta parcela son:

- Encharcamiento: La duración del encharcamiento es de 0.13 días, lo que indica que hubo un breve periodo de saturación del suelo, aunque el buen drenaje puede haber mitigado este riesgo.
- Erosión: La pendiente del 18% puede aumentar el riesgo de erosión superficial, especialmente en suelos arenosos, aunque no se reporta pérdida de suelo en este caso.
- Estrés radicular: Aunque la humedad del suelo es del 27.1%, el encharcamiento temporal puede haber afectado temporalmente la disponibilidad de oxígeno para las raíces.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada es del 0.0%, lo que indica que, a pesar del evento de lluvia extrema, no se ha observado un impacto negativo en la producción de la parcela. Esto puede deberse a la capacidad de drenaje del suelo y a la adecuada gestión del agua en la parcela.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 0.0 €/ha, lo que significa que no se prevén pérdidas económicas como resultado del evento de lluvia. Esto sugiere que la producción de aceitunas no se ha visto afectada y que el rendimiento esperado de 6100 kg/ha se mantiene intacto.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Para mitigar cualquier posible impacto en el futuro, se recomienda:

- Implementar prácticas de conservación del suelo, como la siembra de cubiertas vegetales, para reducir el riesgo de erosión.
- Monitorear la humedad del suelo de manera regular para ajustar el riego y evitar el estrés hídrico.
- Evaluar la posibilidad de realizar un análisis de la estructura del suelo para asegurar que se mantenga la capacidad de drenaje.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Monitorear la humedad del suelo y la erosión en la parcela de manera regular, especialmente después de eventos de lluvia extrema.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_01 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

La parcela de olivar "TEST_01" presenta un estado fenológico de brotación, lo que indica que los árboles están en una fase activa de crecimiento. La combinación de un suelo franco con buen drenaje y una pendiente del 9% sugiere que la parcela tiene un potencial adecuado para manejar la escorrentía. La humedad del suelo es del 28.1%, lo que indica que el suelo tiene una capacidad de retención de agua suficiente para soportar el evento de lluvia reciente.

2. RIESGOS DETECTADOS

Los principales riesgos detectados en esta parcela son mínimos, dado que no se reporta encharcamiento (duración encharcamiento días = 0.0) y la escorrentía no parece ser problemática debido al buen drenaje del suelo. Sin embargo, es importante considerar que la erosión podría ser un riesgo potencial en pendientes, aunque en este caso no se ha reportado pérdida de suelo.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada es del 0.0%, lo que indica que el evento de lluvia no ha tenido un impacto negativo en la parcela. Esto sugiere que las condiciones del suelo y el manejo agronómico han sido adecuados para absorber la lluvia sin causar daños.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es de 0.0 €/ha, lo que significa que no se prevén pérdidas económicas debido al evento de lluvia. Esto es positivo para el agricultor, ya que el rendimiento esperado de 5000 kg/ha y el precio de mercado de 0.82 €/kg no se ven afectados.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Aunque no se han detectado problemas significativos, se recomienda mantener prácticas de manejo que promuevan la salud del suelo, como la incorporación de materia orgánica y la implementación de cubiertas vegetales para mejorar la retención de agua y prevenir la erosión en el futuro.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Monitorear la humedad del suelo y la salud de los árboles para asegurar que continúen en condiciones óptimas durante el ciclo de crecimiento.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo