


Análisis de los eventos de lluvias extremas ocurridos en Andalucía en 2026



1. Introducción

2. Metodología para el análisis de eventos extremos

3. Análisis de lluvias en Andalucía

4. Comparativa con el periodo 1991-2020

5. Conclusiones



Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Fondos Europeos

**Junta
de Andalucía**

Análisis de los eventos de lluvias extremas ocurridos en Andalucía en 2026/ Lorite IJ, Alza J, Cabezas JM - Córdoba. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 2026. 1-19 p. Formato digital (e-book) - (Recursos Naturales y Forestales)

Red de Información Agroclimática de Andalucía - AEMET - eventos extremos - frecuencia de lluvias



Este documento está bajo Licencia Creative Commons.
Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es>

Análisis de los eventos de lluvias extremas ocurridos en Andalucía en 2026

© Edita JUNTA DE ANDALUCÍA. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Córdoba, Febrero de 2026.

Autoría:

Ignacio Jesús Lorite Torres¹
José Alza Aramburu¹
José Manuel Cabezas Luque¹

Agradecimientos:

PR.AVA23.INV202301.039 GEST-AGUA: Avanzando en la mejora de la gestión del agua en situaciones de sequía y restricciones en el suministro, cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027

¹ IFAPA, Centro Alameda del Obispo

1.- Introducción

La sucesión de borrascas que ha afectado a Andalucía durante los meses de enero y febrero de 2026, ha provocado importantes daños en el sector agrario. Las consecuencias se han traducido tanto en **pérdidas directas de producción** como en un deterioro de la **calidad de las cosechas** debido a retrasos o incluso a la imposibilidad de realizar las labores de recolección y tratamientos en el momento óptimo.

En este análisis preliminar se han considerado los datos de **92 estaciones meteorológicas pertenecientes a la Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA)**. Entre el 1 de septiembre de 2025 y mediados de febrero de 2026, la precipitación media acumulada en las zonas agrícolas monitorizadas por la RIA alcanzó los **486 mm**, con valores que oscilaron entre los 155 mm y los 968 mm según la localización.

Es importante señalar que la RIA está orientada exclusivamente al seguimiento de las **áreas agrícolas andaluzas**. Por tanto, los datos presentados se circunscriben a estas zonas y no incluyen registros de otras áreas donde las precipitaciones han sido incluso superiores. Es el caso, por ejemplo, del entorno de Grazalema, donde se han producido acumulados notablemente más elevados y que no se incluyen en este estudio.

La integración de los datos de la RIA con los registros de la **Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)** ha permitido dimensionar con mayor precisión la magnitud de los episodios de precipitación registrados en Andalucía durante este periodo.

El objetivo de este trabajo ha sido **contextualizar la intensidad y el alcance de los eventos de enero y febrero de 2026**, proporcionando una base técnica que sirva de punto de partida para la posterior estimación de daños y la definición de posibles medidas de actuación diferenciadas por cultivo.

2.- Metodología para el análisis de eventos extremos

Para el cálculo de la **precipitación acumulada entre el 1 de septiembre de 2025 y mediados de febrero de 2026** se utilizaron los registros de 92 estaciones meteorológicas pertenecientes a la Red de Información Agroclimática (RIA) (Figura 1).

La Red de Información Agroclimática de Andalucía está ubicada mayoritariamente en zonas agrícolas, lo que la convierte en una herramienta especialmente adecuada para cuantificar las precipitaciones registradas específicamente en el **ámbito agrario andaluz**. Esta orientación permite disponer de información directamente vinculada a la realidad productiva del territorio.

Toda la información meteorológica generada por la red puede consultarse en:
<https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/riaweb/web/>




Figura 1. Red de estaciones meteorológicas de la Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA) considerada en este estudio

2.- Metodología para el análisis de eventos extremos

Para el cálculo de los **valores medios de precipitación acumulada** entre el 1 de septiembre y mediados de febrero se utilizaron datos procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tomando como **periodo de referencia 1991-2020** (30 años), que constituye el intervalo climatológico estándar.

Durante este periodo, se dispone únicamente de información completa y homogénea en ocho estaciones: Huelva - Ronda Este, Jerez de la Frontera Aeropuerto, Sevilla Aeropuerto, Córdoba Aeropuerto, Málaga Aeropuerto, Jaén, Granada Aeropuerto y Almería Aeropuerto. Esta limitada densidad de puntos de observación implica que las **interpolaciones espaciales realizadas a partir de estos datos deben interpretarse con cautela**, especialmente en áreas con elevada variabilidad orográfica o pluviométrica (Figura 2).




Figura 2. Precipitación acumulada entre el 1 de septiembre y mediados de febrero en el periodo 1991-2020 empleando información procedente de la AEMET

3.- Análisis de lluvias en Andalucía




Figura 3. Isolíneas con la precipitación acumulada registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026

3.- Análisis de llluvias en Andalucía

3.1.- Provincia de Huelva

La provincia de Huelva, en sus zonas agrícolas, ha registrado precipitaciones muy elevadas en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. **La precipitación media provincial se situó en 611 mm**, con valores que oscilaron entre los 519 mm y los 745 mm (Figura 4).

Destaca especialmente la **zona centro y norte de la provincia**, donde se alcanzaron los mayores acumulados. En la estación meteorológica de la RIA de El Campillo se registraron hasta 745 mm durante el periodo analizado (Figura 4).

La zona sur también presentó precipitaciones significativas, aunque ligeramente inferiores a las del centro y norte, con acumulados en torno a los 500 mm (Figura 4).




Figura 4. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Huelva

3.- Análisis de lluvias en Andalucía

3.2.- Provincia de Sevilla

La provincia de Sevilla ha registrado, en sus zonas agrícolas, una **precipitación media acumulada de 511 mm** entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Los valores oscilaron entre los 432 mm y los 701 mm según la localización (Figura 5).

En la mayor parte del territorio provincial los acumulados se situaron en el intervalo de 500-600 mm, como reflejan, por ejemplo, los registros de la estación meteorológica de Guillena. Sin embargo, en los **extremos este, oeste y sur de la provincia se observaron valores más elevados**, alcanzando los máximos del periodo analizado (Figura 5).




Figura 5. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Sevilla

3.- Análisis de luvias en Andalucía

3.3.- Provincia de Córdoba

La provincia de Córdoba, en sus áreas agrícolas, ha registrado una **precipitación media acumulada de 566 mm** entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Los valores oscilaron entre los 380 mm y los 703 mm según la localización (Figura 6).

Los **mayores acumulados se concentraron en el Valle del Guadalquivir**, donde se registraron 634 mm en la estación de la Red de Información Agroclimática de Córdoba (Figura 6).

Por el contrario, las zonas norte y sur de la provincia registraron precipitaciones sensiblemente inferiores, con valores en torno a los 450 mm durante el periodo analizado (Figura 6).




Figura 6. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Córdoba

3.- Análisis de lluvias en Andalucía

3.4.- Provincia de Jaén

La provincia de Jaén, en sus zonas agrícolas, ha registrado una **precipitación media acumulada de 445 mm** entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Los valores oscilaron entre los 303 mm y los 623 mm según la localización (Figura 7).

Los **mayores acumulados se concentraron en el extremo oeste de la provincia**, donde se superaron los 550 mm. En contraste, los valores más bajos se registraron en el cuadrante sureste, con acumulados en torno a los 400 mm durante el periodo analizado (Figura 7).




Figura 7. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Jaén

3.- Análisis de llluvias en Andalucía

3.5.- Provincia de Almería

La provincia de Almería ha sido la menos afectada por el episodio de precipitaciones. En sus zonas agrícolas, la **precipitación media acumulada entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026 se situó en torno a 260 mm**, con valores comprendidos entre los 155 mm y los 412 mm (Figura 8).

La distribución espacial de la precipitación acumulada fue relativamente homogénea, con la mayor parte del territorio registrando valores próximos a los 200 mm. Los acumulados más elevados se localizaron en el extremo suroccidental de la provincia (Figura 8).




Figura 8. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Almería

3.- Análisis de llluvias en Andalucía

3.6.- Provincia de Granada

La provincia de Granada ha registrado, en sus zonas agrícolas, **una precipitación media acumulada de 421 mm** entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Los valores oscilaron entre los 178 mm y los 662 mm según la localización (Figura 9).

Los mayores acumulados se concentraron en el **sector occidental de la provincia**, donde la estación meteorológica de la RIA de Iznalloz alcanzó los 654 mm durante el periodo analizado (Figura 9). Por el contrario, las precipitaciones más bajas se registraron en las zonas orientales, especialmente en áreas próximas al límite con la provincia de Almería (Figura 9).




Figura 9. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Granada

3.- Análisis de llluvias en Andalucía

3.7.- Provincia de Málaga

La provincia de Málaga ha registrado, en sus zonas agrícolas, una **precipitación media acumulada en torno a 437 mm** entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Los valores oscilaron entre los 197 mm y los 968 mm, lo que refleja una notable amplitud espacial (Figura 10).

Se observa una elevada variabilidad dentro de la provincia. Los **mayores acumulados se concentraron en el sector occidental**, destacando los 968 mm registrados en la estación meteorológica de Estepona. En contraste, las zonas orientales presentaron valores sensiblemente inferiores, con acumulados inferiores a 400 mm durante el periodo analizado (Figura 10).




Figura 10. Isótopas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Málaga

3.- Análisis de llluvias en Andalucía

3.8.- Provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz ha registrado, en sus zonas agrícolas, una **precipitación media acumulada en torno a 645 mm** entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Los valores oscilaron entre los 346 mm y los 914 mm según la localización (Figura 11).

Se aprecia un marcado gradiente pluviométrico de sur a norte. Destacan los elevados acumulados registrados en localidades como Jimena de la Frontera, donde se alcanzaron 868 mm durante el periodo analizado. En contraste, en el sector noroeste de la provincia los valores se situaron por debajo de los 500 mm (Figura 11).




Figura 11. Isolíneas con la precipitación registrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 en la provincia de Cádiz

3.- Análisis de lluvias en Andalucía

3.9.- Eventos de lluvia

Un aspecto especialmente relevante durante este periodo ha sido el **elevado número de días consecutivos con precipitación**. Este indicador resulta determinante para evaluar las condiciones reales de acceso a las explotaciones agrícolas y la viabilidad de realizar labores como la recolección, el abonado o la aplicación de tratamientos fitosanitarios.

Según los registros de la estación de la RIA ubicada en Córdoba, entre el 20 de enero y el 14 de febrero de 2026 se contabilizaron **21 días con precipitaciones significativas**, frente a tan solo 3 días sin lluvia (Figura 12a). En ese intervalo se **acumularon más de 303 mm**, lo que ilustra la persistencia e intensidad del episodio (Figura 12b). Numerosas zonas andaluzas presentan similares eventos a los observados en Córdoba.




Figura 12. (a) Eventos de precipitación en la estación de la RIA ubicada en Córdoba desde el 1 de septiembre de 2025, y (b) Lluvia acumulada en el mismo periodo

4.- Comparativa con el periodo 1991-2020

La comparación entre la precipitación acumulada registrada entre el 1 de septiembre y mediados de febrero en el **periodo climatológico 1991-2020** y los **valores observados en 2025-2026** permite extraer conclusiones relevantes sobre la magnitud del episodio.

En las estaciones ubicadas en **Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada**, los acumulados observados en 2025-2026 fueron entre un **70 % y un 80 % superiores a la media climatológica** (Tabla 1). En Jerez de la Frontera el incremento fue del orden del 50 %, mientras que en Almería se situó en torno al 30 %. En el caso de Málaga, el aumento fue más moderado, con valores aproximadamente un 10 % superiores a la media de referencia (Tabla 1).

Estación AEMET	Sept-MedFeb 1991-2020 (mm)	Estación RIA	Sept-MedFeb 2026 (mm)	Media 1991- 2020 vs. 2026 (%)
Huelva, Ronda Este	334	Gibraleón	594	177.7
Jerez de la Frontera Aeropuerto	374	Puerto Sta María	556	148.6
Sevilla Aeropuerto	338	La Rinconada	602	178.3
Córdoba Aeropuerto	369	Córdoba	634	171.7
Málaga Aeropuerto	341	Málaga	391	114.8
Jaén	284	Jaén	490	172.4
Granada Aeropuerto	232	Camino Purchil	427	184.3
Almería Aeropuerto	131	Almería	168	128.6

Tabla 1. Comparativa entre los valores medios registrados en el periodo 1991-2020 entre el 1 de septiembre y mediados de febrero y los observados en 2025-26.

5.- Conclusiones

A partir del análisis realizado, puede concluirse que la sucesión de borrascas registradas entre septiembre de 2025 y mediados de febrero de 2026 ha tenido un **carácter extraordinario en buena parte de Andalucía**, tanto por los acumulados de precipitación como por la persistencia temporal de los episodios. En numerosas zonas agrícolas andaluzas los valores observados han superado ampliamente la media climatológica 1991-2020, con incrementos que en muchos casos se situaron entre el **70 % y el 80 %**, lo que evidencia la magnitud anómala del periodo analizado.

El análisis espacial pone de manifiesto una **elevada heterogeneidad territorial**. Mientras provincias como Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y sectores occidentales de Málaga registraron acumulados muy elevados, otras como Almería presentaron valores más moderados, aunque igualmente significativos en términos de impacto agronómico. Además, dentro de cada provincia se observaron gradientes pluviométricos acusados, asociados en muchos casos a factores orográficos y a la dinámica de los frentes atlánticos.

Más allá del volumen total acumulado, uno de los factores más determinantes ha sido la **elevada frecuencia de días con precipitación**. La persistencia de jornadas lluviosas consecutivas ha limitado de forma notable la operatividad en campo, dificultando el acceso a las explotaciones y la ejecución de labores clave como la recolección, la fertilización o los tratamientos fitosanitarios. Este elemento resulta especialmente crítico desde el punto de vista productivo, ya que amplifica los efectos del exceso hídrico más allá del mero balance pluviométrico.

5.- Conclusiones

La integración de los datos de la Red de Información Agroclimática de Andalucía con los registros históricos de referencia ha permitido contextualizar técnicamente la **excepcionalidad del episodio en las zonas agrícolas**. No obstante, debe considerarse que la cobertura espacial condiciona la resolución de los análisis y que, en determinadas áreas fuera de la red, los acumulados fueron muy superiores.

En conjunto, los resultados evidencian que el **periodo septiembre 2025-febrero 2026 constituye un episodio pluviométrico de alta intensidad y persistencia**, con implicaciones directas sobre el sector agrario andaluz. Estas conclusiones proporcionan una base objetiva para la posterior evaluación detallada de daños por cultivo y la definición de medidas de adaptación y apoyo específicas.

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera

Avenida de Grecia s/n
41012 Sevilla (Sevilla) España
Teléfonos: 954 994 595 Fax: 955 519 107
e-mail: webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa



www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa

Este trabajo ha sido cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020



Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Fondos Europeos

 Junta
de Andalucía