

TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN

Phần I

Giải tích

1 Dãy số và hàm số

1.1 Tóm tắt lý thuyết

Định nghĩa 1.1. Dãy (a_n) đơn điệu tăng (tương ứng giảm) nếu $a_n \leq a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ (tương ứng \geq). Dãy tăng (hoặc giảm) gọi chung là đơn điệu.

Định nghĩa 1.2. Dãy (a_n) bị chặn trên (tương ứng dưới) nếu $\exists C$, $a_n \leq C$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ (tương ứng \geq).

Định lý 1.1. Dãy (a_n) tăng và bị chặn trên (tương ứng dưới) bởi C thì có giới hạn L và $a_n \leq L \leq C$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ (tương ứng \geq).

Định lý 1.2 (Nguyên lý kẹp). Cho các dãy (a_n) , (b_n) , (c_n) . Giả sử

$$a) \exists n_0, a_n \leq b_n \leq c_n, \forall n \geq n_0; \text{ và}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

$$\text{Khi đó } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$$

Định lý 1.3 (Nguyên lý Cauchy). Dãy (a_n) hội tụ \Leftrightarrow nó là dãy cơ bản (dãy Cauchy):

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n, m > n_0, |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Định lý 1.4 (Stolz). Cho hai dãy (a_n) , (b_n) . Giả sử

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty; \text{ và}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$$

$$\text{Khi đó } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

Hệ quả 1.1. Cho dãy số dương (a_n) . Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.

HD. Áp dụng định lý Stolz với hai dãy $(\ln a_n)$ và (n) . □

Định lý 1.5 (Đ/l trung bình Cesàro). $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = L$

Chú ý 1.1. Cho dãy $a_{n+1} = f(a_n)$. Xét hàm $f(x)$.

$$a) \text{ Giả sử } \alpha < f(x) < \beta, \forall x \in (\alpha, \beta). \text{ Khi đó } a_{n_0} \in (\alpha, \beta) \Rightarrow a_n \in (\alpha, \beta), \forall n \geq n_0.$$

b) $f'(x) > 0, \forall x \in (\alpha, \beta) \Rightarrow$ dãy $(a_n)_{n \geq n_0}$ tăng (tương ứng giảm) nếu $a_{n_0} \leq a_{n_0+1}$ (tương ứng \geq).

c) $f'(x) < 0, \forall x \in (\alpha, \beta) \Rightarrow$ dãy chẵn (x_{2n}) đơn điệu và dãy lẻ (x_{2n-1}) cũng đơn điệu.

Gợi ý. (Quy nạp)

b) $a_{n+1} \geq a_n \Rightarrow a_{n+2} = f(a_{n+1}) \geq f(a_n) = a_{n+1}$

c) $g(x) = f[f(x)] \Rightarrow g'(x) = f'[f(x)]f'(x) > 0$, và $x_{n+2} = f(x_{n+1}) = f[f(x_n)] = g(x_n)$.

□

Chú ý 1.2. Cho $f(x)$ liên tục tại a . Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Chú ý 1.3. Cho dãy (a_n) , xác định bởi $a_{n+1} = f(a_n)$ trong đó f là hàm liên tục. Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Rightarrow L = f(L)$.

Định lý 1.6 (Nguyên lý ánh xạ co). Cho dãy (a_n) xác định bởi $a_{n+1} = f(a_n)$, $\alpha \leq a_0 \leq \beta$. Giả sử

a) $\alpha \leq f(x) \leq \beta, \forall x \in [\alpha, \beta]$

b) $\exists q \leq (0, 1), |f(x) - f(y)| \leq q|x - y|, \forall x, y \in [\alpha, \beta]$.

Khi đó

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in [\alpha, \beta]$ và $L = f(L)$

b) Với $n \geq 1$

$$|a_n - L| \leq \frac{q^n}{1 - q} |a_1 - a_0|$$

$$|a_n - L| \leq \frac{q}{1 - q} |a_n - a_{n-1}|$$

Chứng minh. a) $|a_{n+k} - a_n| = \left| \sum_{i=n+1}^{n+k} (a_i - a_{i-1}) \right| \leq \sum_{i=n+1}^{n+k} |a_i - a_{i-1}|$

$$|a_i - a_{i-1}| = |f(a_{i-1}) - f(a_{i-2})| \leq q|a_{i-1} - a_{i-2}| \leq q^2|a_{i-2} - a_{i-3}| \leq \dots \leq q^{i-1}|a_1 - a_0|$$

$$|a_{n+k} - a_n| \leq \sum_{i=n+1}^{n+k} q^{i-1}|a_1 - a_0| = q^n \frac{1 - q^k}{1 - q} |a_1 - a_0| \leq \frac{q^n}{1 - q} |a_1 - a_0| \xrightarrow{n \rightarrow \infty, k > 0} 0 \Rightarrow (a_n) \text{ là dãy}$$

Cauchy.

□

Chú ý 1.4. Điều kiện (b) trong **Định lý 1.6** thỏa mãn nếu $|f'(x)| \leq q < 1, \forall x \in [\alpha, \beta]$. Thật vậy theo định lý Lagrange, $\exists c \in (x, y), f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$, suy ra

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)| \times |x - y| \leq q|x - y|$$

Các dạng sau gồm **Định lý 1.7**, **Mệnh đề 1.1** thì ít gặp hơn

Định lý 1.7 (Phương pháp Newton trong giải tích số). Cho dãy (a_n) xác định bởi $a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}, a_0 \in [\alpha, \beta]$ trong đó

- a) f', f'' không đổi dấu trên $[\alpha, \beta]$; và $c) f(a_0) f'' > 0$
- b) $f(\alpha) f(\beta) < 0$; và

Khi đó

- a) Dãy (a_n) tăng (tương ứng giảm) nếu $f' f'' < 0$ (tương ứng $>$)
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, và L là nghiệm duy nhất của f trên $[\alpha, \beta]$
- c)

$$|a_n - L| \leq \frac{M}{2m} |a_n - a_{n-1}|^2, \forall n \geq 1$$

$$|a_n - L| \leq \frac{|f(a_n)|}{m}, \forall n$$

trong đó $M \geq |f''(x)|, 0 < m \leq |f'(x)|, \forall x \in [a, b]$

Chú ý 1.5 (Phương pháp Newton cải biên). Nếu $a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$, thì các các mục trong Định lý 1.7 vẫn đúng trừ kết luận (c).

Mệnh đề 1.1 (Phương pháp dây cung trong giải tích số). Cho dãy (x_n) xác định bởi $a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f(a_n) - f(r)} (a_n - r)$, trong đó

- a) f', f'' không đổi dấu trên $[x_0, r]$; và $c) f' f'' > 0$ ứng với $x_0 < r$, và ngược lại
- b) $f(x_0) f(r) < 0$; và

Khi đó

- a) Dãy (a_n) tăng (tương ứng giảm) nếu $f' f'' > 0$ (tương ứng $<$)
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, và L là nghiệm duy nhất của f trên $[x_0, r]$
- c)

$$|a_n - L| \leq \left(\frac{M}{m} - 1 \right) |a_n - a_{n-1}|^2, \forall n \geq 1$$

$$|a_n - L| \leq \frac{|f(a_n)|}{m}, \forall n$$

trong đó $0 < m \leq |f'(x)| \leq M, \forall x \in [a_0, r]$

1.2 Kiến thức bổ sung

1.2.1 Nguyên lý quy nạp

Xét khẳng định $S(n), n \geq n_0$.

Dạng đơn giản Giả sử

- a) Khẳng định đúng tại $n = n_0$.
- b) Nếu khẳng định đúng **tại** n , $n \geq n_0$, thì cũng đúng tại $n + 1$.

Khi đó, khẳng định $S(n)$ đúng $\forall n \geq n_0$.

Dạng tổng quát Giả sử

- a) Khẳng định đúng với $n = n_0, n_0 + 1, \dots, n_1$.
- b) Nếu khẳng định đúng **từ** n_0 **đến** n , $n \geq n_1$, thì cũng đúng tại $n + 1$.

Khi đó, khẳng định $S(n)$ đúng $\forall n \geq n_0$.

Chú ý 1.6. Khi chứng minh $S(n)$, chỉ cần giả thiết của $S(n)$, $S(n - 1), \dots$, và xa nhất là $S(n - k)$, $k \geq 0$, thì $n_1 = n_0 + k$.

1.2.2 Khai triển Taylor, Maclaurin

1.3 Đề thi chính thức các năm

Ví dụ 1.1 (2022). Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} = \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}$, $n \geq 1$.

- a) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $u_n > \frac{3}{2}$.
- b) Chứng minh (u_n) hội tụ.
- c) (A) Chứng minh giới hạn của dãy số là một số vô tỷ.

HD. c) (Phương pháp phản chứng)

Giả sử $e = \frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{Z}^+$ là số hữu tỷ. Xét $x = b! \left(e - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!} \right)$

$$1. \quad x = b! \left(\frac{a}{b} - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!} \right) = a(b-1)! - \sum_{n=0}^b \frac{b!}{n!} \in \mathbb{Z}$$

$$2. \quad x = b! \left(\frac{a}{b} - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!} \right) = b! \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!} \right) = \sum_{n=b+1}^{\infty} \frac{b!}{n!} > 0$$

$$3. \quad n \geq b+1 \Rightarrow \frac{b!}{n!} = \frac{1}{(b+1)(b+2) \cdots n} \leq \frac{1}{(b+1)^{n-b}}, \text{ và nhỏ hơn thực sự nếu } n \geq b+2$$

$$\Rightarrow x = \sum_{n=b+1}^{\infty} \frac{b!}{n!} < \sum_{n=b+1}^{\infty} \frac{1}{(b+1)^{n-b}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(b+1)^k} = \frac{\frac{1}{b+1}}{1 - \frac{1}{b+1}} = \frac{1}{b} \leq 1$$

□

Ví dụ 1.2 (2019). Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = 2019$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n) - \frac{2x_n}{2 + x_n}$. Chứng minh

- Dãy (x_n) không âm.
- $\exists c \in (0, 1)$, $|x_{n+1} - x_n| \leq c |x_n - x_{n-1}|$, $\forall n \geq 2$.
- (x_n) có giới hạn hữu hạn. Tìm giới hạn đó.

Ví dụ 1.3 (2018). Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = 2019$, $x_{n+1} = \frac{1}{2018}x_n^2 + \frac{2017}{2018}x_n$.

- Chứng minh (x_n) tăng, không bị chặn trên.
- Chứng minh $\frac{x_n}{x_{n+1} - 1} = 2018 \left(\frac{1}{x_n - 1} - \frac{1}{x_{n+1} - 1} \right)$
- Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{x_{k+1} - 1}$

Chú ý 1.7. Tổng quát cho $x_1 = a > 0$, $x_{n+1} = bx_n^2 + (1 - b)x_n$ với $0 < b < 1$.

Ví dụ 1.4 (2017). Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_1 = 1$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n^2 - 1$.

Bảng A: Chứng minh (u_n) hội tụ, và tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

Bảng B: Chứng minh

- $-1 < u_n < 0$, $\forall n \geq 2$
- (u_n) có giới hạn, và giới hạn đó là $1 - \sqrt{3}$

Ví dụ 1.5 (2016). Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_1 = a$, $u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1$.

- Tìm a để (u_n) hội tụ
- Tìm giới hạn của (u_n) khi nó hội tụ

Chú ý 1.8. Tổng quát cho $u_{n+1} = u_n + (u_n - b)^2$.

Ví dụ 1.6 (2015). Cho dãy (a_n) xác định bởi $2a_{n+1} - 2a_n + a_n^2 = 0$, $n \geq 0$.

- Chứng minh (a_n) đơn điệu
- Cho $a_0 = 1$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
- Tìm tất cả giá trị của a_0 để (a_n) có giới hạn hữu hạn. Khi đó tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$

Ví dụ 1.7 (2014). Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_1 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + a^n}$, $a \geq 0$. Tìm a để (u_n) hội tụ, và tìm giới hạn đó.

HD. Bình phương hệ thức rồi khử \rightarrow tính u_n^2 theo a

□

Ví dụ 1.8 (2013). Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = a \in \mathbb{R}$, $(n+1)^2 x_{n+1} = n^2 x_n + 2n + 1$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Ví dụ 1.9 (2012). Cho dãy (a_n) xác định bởi $a_1 = \alpha$, $a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n - \frac{2}{n}$, $n \geq 1$. Tìm α để dãy (a_n) hội tụ.

Ví dụ 1.10 (2011). Cho hàm số $f(x) = \frac{e^x}{(x+1)^2}$. Chứng minh

a) Phương trình $f(x) = x$ có nghiệm duy nhất trong $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, và $f'(x)$ đồng biến.

b) Dãy (u_n) xác định bởi $u_1 = 1$, $u_{n+1} = f(u_n)$ thỏa mãn $u_n \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, $\forall n$.

Ví dụ 1.11 (2011). Cho hai dãy (x_n) , (y_n) thỏa mãn $x_{n+1} \geq \frac{x_n + y_n}{2}$, và $y_{n+1} \geq \sqrt{\frac{x_n^2 + y_n^2}{2}}$ với $n \in \mathbb{N}$.

a) Chứng minh các dãy $(x_n + y_n)$, $(x_n y_n)$ là những dãy đơn điệu tăng.

b) Giả sử (x_n) , (y_n) bị chặn. Chứng minh chúng cùng hội tụ về một điểm.

Ví dụ 1.12 (2011). Cho $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha+n} < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\beta+n}$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$. Tìm $\min |\alpha - \beta|$.

Ví dụ 1.13 (2010). Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = 1$, $x_{n+1} = x_n (1 + x_n^{2010})$, $n \geq 1$.

$$\text{Tính } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_1^{2010}}{x_2} + \frac{x_2^{2010}}{x_3} + \dots + \frac{x_n^{2010}}{x_{n+1}} \right).$$

Ví dụ 1.14 (2009). Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = x_2 = 1$, $x_n = (n-1)(x_{n-1} + x_{n-2})$, $n \geq 3$. Tính x_{2009} .

Ví dụ 1.15 (2009). Cho hai dãy (x_n) , (y_n) xác định bởi

$$x_1 = y_1 = \sqrt{3}, \quad x_{n+1} = x_n + \sqrt{1 + x_n^2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + \sqrt{1 + y_n^2}}, \quad n \geq 1$$

Chứng minh $x_n, y_n \in (2, 3)$ với $n \geq 2$, và $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.

Ví dụ 1.16 (2008). Cho dãy (a_n) xác định bởi $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}} + a_n$, $n \geq 1$. Tính a_{2008} .

Ví dụ 1.17 (2008). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{2008} + 2^{2008} + \dots + n^{2008}}{n^{2009}}$.

Ví dụ 1.18 (2007). Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_0 = 2007$, $x_n = -2007 \frac{x_0 + x_1 + \dots + x_{n-1}}{n}$, $n \geq 1$.

Tìm liên hệ giữa x_n, x_{n-1} với $n \geq 1$. Từ đó tính tổng $S = x_0 + 2x_1 + 4x_2 + \dots + 2^{2007} x_{2007}$.

Ví dụ 1.19 (2007). Cho $a, b, c, \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq c - b$. Dãy (u_n) , (v_n) xác định bởi

$$u_1 = a, \quad u_{n+1} = \frac{u_n^2 + bu_n}{c}, \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{u_{k+1} + b - c}, \quad n \geq 1$$

Biết $\lim u_n = \alpha$, tìm $\lim v_n$.

Ví dụ 1.20 (2006). Cho dãy (a_n) thỏa mãn $x_1 = 2$, $x_1 + x_2 + \dots + x_n = n^2 x_n$, $n \geq 2$. Tính x_{2006} .

Ví dụ 1.21 (2006). (Lời giải có vấn đề!) Xác định các dãy số (x_n) biết $x_{2n+1} = 3x_n + 2$, $n = 0, 1, 2, \dots$

1.4 Luyện tập

Ví dụ 1.22 (Olympic SV Bắc Mỹ). $x_n = \underbrace{\sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6 + \cdots + \sqrt[3]{6}}}}_{n \text{ lần}}$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} 6^n (2 - x_n)$.

HD. 1. $x_1 = \sqrt[3]{6}$, $x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n}$

$$2. f(x) = \sqrt[3]{6 + x}, f'(x) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{(6 + x)^2}}$$

$$3. \text{Dự đoán } L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2: L = f(L)$$

$$4. 0 < x_n < 2, \forall n$$

$$5. (x_n) \text{ tăng}$$

$$6. L = 2$$

$$7. 2 - x_n = f(2) - f(x_{n-1}) = f'(c)(2 - x_{n-1}) < \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{(6 + 0)^2}} (2 - x_{n-1})$$

$$8. \text{Đặt } q = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{36}} < \frac{1}{6} \Rightarrow 2 - x_n < q^{n-1} (2 - x_1) \Rightarrow 6^n (2 - x_n) = \frac{1 - x_1}{q} (6q)^n$$

□

Chú ý 1.9. Tương tự với $x_n = \underbrace{\sqrt{a + \sqrt{a + \cdots + \sqrt{a}}}}_n$ khi $a \in \{2, 6, 12, 20\}$, hoặc $x_n = \underbrace{\sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a + \cdots + \sqrt[3]{a}}}}_n$

khi $a \in \{24, 60, 120\}$. Riêng $x_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$

Ví dụ 1.23 (Olympic SV Bắc Mỹ). Cho $a_0 = a$, $x_1 = b$, $x_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x_{n-1} + \frac{1}{n}x_{n-2}$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

HD. 1. $x_n - x_{n-1}$

$$2. x_n$$

□

Ví dụ 1.24. Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$

HD. Dạng giống **Ví dụ 1.6** ý (c)

□

Ví dụ 1.25. Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_0 = 1$, $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{2002}$. Chứng minh $x_{2002} < \frac{1}{2}$.

Ví dụ 1.26. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{C_n^k} \right)^n$

2 Khai triển Taylor, Maclaurin

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n], \quad f \in C^n(a, b), \quad x_0 \in (a, b)$$

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n), \quad f \in C^n(a, b), \quad 0 \in (a, b)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad -1 < x < 1$$

Ví dụ 2.1. Chứng minh π là số vô tỷ.

HD.

□