

# Mục lục

<b>I</b>	<b>Cơ sở của Toán rời rạc</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Nguyên lý đếm cơ bản</b>	<b>2</b>
1.1	Quy tắc cộng, nhân	2
1.2	Biểu đồ cây	8
1.3	Hoán vị	9
1.4	Tổ hợp	13
1.5	Hoán vị lặp	20
1.6	Tổ hợp lặp	25
1.7	Sinh các hoán vị và tổ hợp	29
1.8	Số Catalan	32
1.9	Tóm tắt	32
<b>2</b>	<b>Nguyên lý cơ bản của logic</b>	<b>46</b>
2.1	Phép toán cơ bản và bảng chân lý	46
2.2	Tương đương logic: luật logic	51
2.3	Kéo theo logic: quy tắc suy luận	57
2.4	Lượng từ: tình huống sử dụng	62
2.5	Các lượng từ, định nghĩa, và chứng minh định lý	69
2.6	Tóm tắt	73
<b>3</b>	<b>Lý thuyết tập hợp</b>	<b>75</b>
3.1	Tập và tập con	75
3.2	Phép toán tập hợp và quy luật	83
3.3	Phép đếm và biểu đồ Venn	93
3.4	Tóm tắt	96
<b>4</b>	<b>Tính chất của số nguyên: quy nạp toán học</b>	<b>98</b>
4.1	Nguyên lý sắp tốt: quy nạp toán học	98
4.2	Định nghĩa đệ quy	108
4.3	Thuật toán chia: số nguyên tố	114

4.4 Ước chung lớn nhất: thuật toán Euclid . . . . .	119
4.5 Định lý cơ bản của số học . . . . .	126
4.6 Tóm tắt . . . . .	131
<b>5 Quan hệ: hàm . . . . .</b>	<b>135</b>
5.1 Tích Descartes và quan hệ . . . . .	135
5.2 Hàm: đơn ánh . . . . .	141
5.3 Toàn ánh: số Stirling loại II . . . . .	150
5.4 Hàm đặc biệt . . . . .	155
5.5 Nguyên lý chuồng bồ câu . . . . .	159
5.6 Hàm hợp và hàm ngược . . . . .	162
5.7 Độ phức tạp tính toán . . . . .	170
5.8 Phân tích thuật toán . . . . .	173
<b>6 Quan hệ: hướng tiếp cận thứ hai . . . . .</b>	<b>177</b>
6.1 Quan hệ: thuộc tính và phép toán . . . . .	177
6.2 Biểu diễn quan hệ . . . . .	184
6.3 Thứ tự bộ phận: biểu đồ Hasse . . . . .	190
6.4 Quan hệ tương đương và phân hoạch . . . . .	196
6.5 Bao đóng của quan hệ . . . . .	198
<b>II Các phép đếm nâng cao . . . . .</b>	<b>202</b>
<b>7 Nguyên lý bù trừ . . . . .</b>	<b>203</b>
7.1 Nguyên lý bù trừ . . . . .	203
7.2 Nguyên lý bù trừ tổng quát . . . . .	211
7.3 Sắp xếp: không vật nào đứng vị trí . . . . .	212
7.4 Đa thức rook . . . . .	212
7.5 Sắp xếp có vị trí bị cấm . . . . .	212
7.6 Tóm tắt . . . . .	212
7.7 Bài tập bổ sung . . . . .	212
<b>8 Hàm sinh . . . . .</b>	<b>213</b>
8.1 Ví dụ mở đầu . . . . .	214
8.2 Định nghĩa và ví dụ: kỹ thuật tính . . . . .	218
8.3 Phân hoạch số nguyên . . . . .	231
8.4 Hàm sinh mũ . . . . .	236
8.5 Toán tử tổng . . . . .	241

<b>9</b>	<b>Hệ thức đệ quy</b>	<b>246</b>
9.1	Hệ thức đệ quy tuyến tính cấp một	247
9.2	Hệ thức đệ quy tuyến tính thuần nhất cấp cao hệ số hằng	256
9.3	Hệ thức đệ quy không thuần nhất	265
9.4	Phương pháp hàm sinh	266
9.5	Hệ thức đệ quy phi tuyến đặc biệt	270
9.6	Thuật toán chia để trị	271
<b>III</b>	<b>Lý thuyết đồ thị và ứng dụng</b>	<b>277</b>
<b>10</b>	<b>Mở đầu về lý thuyết đồ thị</b>	<b>278</b>
10.1	Định nghĩa và ví dụ	278
10.2	Đồ thị con, phần bù và đẳng cấu đồ thị	279
10.3	Bậc của đỉnh: đường và chu trình Euler	280
10.4	Đồ thị phẳng	283
10.5	Đường và chu trình Hamilton	284
10.6	Tô màu đồ thị và đa thức sắc độ	285
<b>11</b>	<b>Cây</b>	<b>286</b>
11.1	Định nghĩa, tính chất, và ví dụ	286
11.2	Cây có gốc	287
11.3	Cây và sắp xếp	292
11.4	Cây có trọng số và mã tiền tố	292
11.5	Các thành phần liên thông và điểm nối	297
<b>12</b>	<b>Tối ưu và tìm kiếm</b>	<b>298</b>
12.1	Thuật toán đường đi ngắn nhất Dijkstra	298
12.2	Cây bao trùm nhỏ nhất: thuật toán Kruskal, Prim	298
12.3	Mạng vận tải: định lý Max-Flow Min-Cut	298
12.4	Lý thuyết tìm kiếm	298
<b>IV</b>	<b>Đại số hiện đại ứng dụng</b>	<b>299</b>
<b>13</b>	<b>Vành và số học đồng dư</b>	<b>300</b>
13.1	Cấu trúc vành: định nghĩa và ví dụ	300
13.2	Tính chất vành và vành con	306
13.3	Vành các số nguyên modulo $n$	308
13.4	Đồng cấu và đẳng cấu nhóm, vành	314
13.5	Định lý phần dư Trung Quốc	315

13.6 Mã hóa khóa công khai: Giới thiệu . . . . .	318
13.7 Mã hóa khóa công khai: Phương pháp Rabin . . . . .	320
13.8 Mã hóa khóa công khai: RSA . . . . .	325
<b>14 Nhóm, lý thuyết mã, và phương pháp liệt kê Polya</b>	<b>331</b>
14.1 Định nghĩa, ví dụ, và tính chất cơ bản . . . . .	331
14.2 Đồng cấu, đẳng cấu, và nhóm cyclic . . . . .	332
14.3 Lớp kề và định lý Lagrange . . . . .	333
14.4 Sơ lược về lý thuyết mã . . . . .	333
14.5 Khoảng cách Hamming . . . . .	333
14.6 Ma trận sinh và kiểm tra chẵn lẻ . . . . .	333
14.7 Nhóm các mã: giải mã với coset leaders . . . . .	334
14.8 Ma trận Hamming . . . . .	334
14.9 Phép đếm và sự tương đương: định lý Burnside . . . . .	334
14.10 Chỉ số chu trình . . . . .	337
14.11 Định lý liệt kê Polya . . . . .	337
<b>15 Trường hữu hạn và thiết kế tổ hợp</b>	<b>339</b>

# Chương 4

## Tính chất của số nguyên: quy nạp toán học

4.1	Nguyên lý sắp tốt: quy nạp toán học . . . . .	98
4.2	Định nghĩa đệ quy . . . . .	108
4.3	Thuật toán chia: số nguyên tố . . . . .	114
4.4	Ước chung lớn nhất: thuật toán Euclid . . . . .	119
4.5	Định lý cơ bản của số học . . . . .	126
4.6	Tóm tắt . . . . .	131

### 4.1 Nguyên lý sắp tốt: quy nạp toán học

**Nguyên lý sắp tốt:** Mọi tập con khác rỗng của  $\mathbb{Z}^+$  đều có phần tử nhỏ nhất.  $\mathbb{Z}^+$  gọi là được sắp tốt.

Các tập  $\mathbb{Q}^+, \mathbb{R}^+$  không có tính chất này. Chẳng hạn,  $\mathbb{Q}^+$  không có số nhỏ nhất. Thật vậy, giả sử ngược lại,  $\mathbb{Q}^+$  có số nhỏ nhất  $q$ . Khi đó  $q \in \mathbb{Q}^+$ , và  $q \leq x, \forall x \in \mathbb{Q}^+$ . Chọn  $x = \frac{q}{2} \in \mathbb{Q}^+$ , thì  $q \leq x \Leftrightarrow q \leq \frac{q}{2} \Leftrightarrow q \leq 0$ , mâu thuẫn với  $q \in \mathbb{Q}^+$ .

**Định lý 4.1** (Nguyên lý quy nạp toán học). Cho  $S(n)$  là khẳng định mở,  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Ta có suy luận:

$$\begin{array}{l} a) \quad S(1) \\ b) \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+, S(n) \Rightarrow S(n+1) \\ \hline \therefore \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+, S(n) \end{array}$$

*Tổng quát, với  $n_0, n_1 \in \mathbb{Z}, n_0 \leq n_1$*

$$a) S(n_0), S(n_0 + 1), \dots, S(n_1)$$

$$b) \forall n \geq n_1, S(n_0) \wedge S(n_0 + 1) \wedge \dots \wedge S(n) \Rightarrow S(n + 1)$$

$$\therefore \forall n \geq n_0, S(n)$$

*Chứng minh.* Ta chứng minh lập luận thứ nhất. Lập luận thứ hai được chứng minh tương tự.

Giả sử ngược lại,  $\neg \forall n \in \mathbb{Z}^+, S(n)$ , hay  $\exists n \in \mathbb{Z}^+, S(n)$  sai. Đặt  $F = \{n \in \mathbb{Z}^+ \mid S(n) \text{ sai}\}$ , thì  $F \neq \emptyset$ . Theo nguyên lý sắp tốt,  $F$  có số nhỏ nhất  $m$ . Vì  $S(1)$  đúng, nên  $1 \notin F$ , suy ra  $m \neq 1$ , vì thế  $m > 1$ , cho nên  $m - 1 \in \mathbb{Z}^+$ .

Mặt khác,  $m - 1 \notin F$ , nên  $S(m - 1)$  đúng. Theo giả thiết (b),  $S((m - 1) + 1) = S(m)$  đúng, mâu thuẫn với  $m \in F$ . Nguyên lý quy nạp được chứng minh.  $\square$

**Ví dụ 4.1.** Chứng minh  $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$

*Giải.* Xét khẳng định mở  $S(n) : \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

$$1) S(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2} \text{ đúng.}$$

2) Giả sử với  $n \in \mathbb{Z}^+$  cho trước,  $S(n)$  đúng. Ta chứng minh  $S(n + 1)$  đúng. Thật vậy


$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} i &= 1 + 2 + \dots + n + (n + 1) \\ &= (1 + 2 + \dots + n) + (n + 1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1), \quad \text{vì } S(n) \text{ đúng} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned} \quad (*)$$

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \in \mathbb{Z}^+.$

```
1 from sympy import *
2 n, i = symbols('n i')
3 Sum(i, (i, 1, n)).doit().simplify() # dự đoán  $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ 
4 (n*(n+1)/2 + (n+1)).factor() # phân tích đa thức (*)
```

$\square$

Các số  $t_n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , gọi là *số tam giác*.



**Ví dụ 4.2.** Đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 36 trên một đường tròn. Chứng minh có ba số liên tiếp trên đường tròn có tổng ít nhất là 55.

*Giải.* Giả sử ngược lại, bất kỳ ba số liên tiếp trên đường tròn đều có tổng nhỏ hơn 55. Gọi  $x_1, x_2, \dots, x_{36}$  là các số trên đường tròn. Khi đó  $\{x_1, x_2, \dots, x_{36}\} = \{1, 2, \dots, 36\}$ , và

$$x_1 + x_2 + x_3 < 55, x_2 + x_3 + x_4 < 55, \dots, x_{34} + x_{35} + x_{36} < 55,$$

$$x_{35} + x_{36} + x_1 < 55, x_{36} + x_1 + x_2 < 55.$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức, lưu ý mỗi  $x_i$ ,  $i = \overline{1, 36}$  xuất hiện đúng ba lần

$$3 \sum_{i=1}^{36} x_i < 36 \cdot 55 = 1980.$$

Mặt khác,  $\{x_1, x_2, \dots, x_{36}\} = \{1, 2, \dots, 36\}$ , suy ra  $\sum_{i=1}^{36} x_i < \sum_{i=1}^{36} i = \frac{36 \cdot 37}{2} = 666$ , nên  $3 \cdot 666 = 1998 < 1980$ , mâu thuẫn!

Vậy có ba số liên tiếp trên đường tròn có tổng ít nhất là 55. □

**Ví dụ 4.3.** Số tự nhiên gọi là *đối xứng*, nếu đọc các chữ số từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều như nhau. Tính tổng các số đối xứng có ba chữ số.

*Giải.* Số đối xứng có ba chữ số có dạng  $\overline{aba} = 100a + 10b + a = 101a + 10b$ , với  $1 \leq a \leq 9$  và  $0 \leq b \leq 9$ . Các số này có tổng bằng

$$\sum_{a=1}^9 \left( \sum_{b=0}^9 aba \right) = \sum_{a=1}^9 \sum_{b=0}^9 (101a + 10b) = \sum_{a=1}^9 \left( 10 \cdot 101a + 10 \sum_{b=0}^9 b \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{a=1}^9 \left( 1010a + 10 \sum_{b=1}^9 b \right) = \sum_{a=1}^9 \left( 1010a + 10 \frac{9 \cdot 10}{2} \right) \\
 &= \sum_{a=1}^9 (1010a + 450) = 1010 \sum_{a=1}^9 a + 9 \cdot 450 \\
 &= 1010 \frac{9 \cdot 10}{2} + 4050 = 49500.
 \end{aligned}$$

□

**Ví dụ 4.4.** Chứng minh  $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$

*Giải.* Xét khẳng định mở  $S(n) : \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$

1)  $S(1) : 1^2 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6}$  đúng.

2) Giả sử với  $n \in \mathbb{Z}^+$  cho trước,  $S(n)$  đúng. Ta sẽ chứng minh

$$S(n+1) : \sum_{i=1}^{n+1} i^2 = \frac{(n+1)[(n+1)+1][2(n+1)+1]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

đúng. Thật vậy

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{n+1} i^2 &= \sum_{i=1}^n i^2 + (n+1)^2 \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2, \quad \text{vì } S(n) \text{ đúng} \\
 &= \frac{n+1}{6} [n(2n+1) + 6(n+1)] = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.
 \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \in \mathbb{Z}^+.$

□

**Ví dụ 4.5.** a) Tính tổng của  $n$  số tự nhiên lẻ đầu tiên, với  $n = \overline{1, 5}$ , và cho biết quy luật của các tổng này.

b) Dự đoán kết quả tổng quát và chứng minh dự đoán này.



*Giải.* a)

$n$	Tổng	Quy luật
1	$1 = 1$	$1^2$
2	$1 + 3 = 4$	$2^2$
3	$1 + 3 + 5 = 9$	$3^2$
4	$1 + 3 + 5 + 7 = 16$	$4^2$
5	$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$	$5^2$

b) Dự đoán  $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$

Xét khẳng định mở  $S(n) : \sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2.$

1)  $S(1) : 1 = 1^2$  đúng.

2) Giả sử với  $n \in \mathbb{Z}^+$  cho trước,  $S(n)$  đúng. Ta sẽ chứng minh  $S(n+1)$  đúng. Thật vậy

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} (2i - 1) &= \sum_{i=1}^n (2i - 1) + [2(n+1) - 1] \\ &= n^2 + (2n + 1), \quad \text{vì } S(n) \text{ đúng} \\ &= (n+1)^2. \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \in \mathbb{Z}^+.$

□

**Ví dụ 4.6.** a) Tìm ba số nguyên dương  $n$  đầu tiên thỏa mãn  $4n < n^2 - 7.$

b) Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{Z}^+ (n \geq 6), 4n < n^2 - 7.$

*Giải.* a)

$n$	$4n$	$n^2 - 7$	$n$	$4n$	$n^2 - 7$
1	4	-6	5	20	18
2	8	-3	6	24	29
3	12	2	7	28	42
4	16	9	8	32	57

b) Xét khẳng định mở  $S(n) : 4n < n^2 - 7.$

1)  $S(6)$  đúng theo bảng ở ý (a).

2) Giả sử với  $n \geq 6$  cho trước,  $S(n)$  đúng. Ta chứng minh  $S(n+1)$  đúng. Thật vậy

$$4(n+1) = 4n+4 < (n^2-7)+4.$$

Lúc này ta cần  $(n^2-7)+4 \stackrel{?}{<} (n+1)^2-7$ . Biến đổi tương đương bất đẳng thức, được

$$4 < 2n+1,$$

và điều này đúng vì  $n \geq 6$ . Suy ra  $4(n+1) < (n+1)^2-7$ .

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \geq 6$ .

□

**Ví dụ 4.7.** Ký hiệu  $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ , với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , gọi là số điều hòa.

Chứng minh  $\sum_{i=1}^n H_i = (n+1)H_n - n$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ .

*Giải.* Xét khẳng định mở  $S(n)$  :  $\sum_{i=1}^n H_i = (n+1)H_n - n$ .

1)  $S(1)$  :  $1 = (1+1) \cdot 1 - 1$  đúng.

2) Giả sử với  $n \in \mathbb{Z}^+$  cho trước,  $S(n)$  đúng. Ta sẽ chứng minh  $S(n+1)$  đúng. Thật vậy

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} H_i &= \sum_{i=1}^n H_i + H_{n+1} \\ &= [(n+1)H_n - n] + H_{n+1}, \quad \text{vì } S(n) \text{ đúng} \\ &= \left[ (n+1) \left( H_{n+1} - \frac{1}{n+1} \right) - n \right] + H_{n+1} \\ &= (n+2)H_{n+1} - (n+1). \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ .

□

**Ví dụ 4.8.** Cho số nguyên dương  $n$ . Chứng minh số tổng riêng của  $n$  là  $2^{n-1}$ . [*Gợi ý: xét số hạng đầu của mỗi tổng riêng là 1 hoặc khác 1.*]

*Giải.* Xét khẳng định mở  $S(n)$  : số tổng riêng của  $n$  là  $2^{n-1}$ .

1)  $n = 1$  chỉ có một tổng riêng ( $= 2^{1-1}$ ) là 1, tức là  $S(1)$  đúng.

2) Giả sử với  $n$  cho trước,  $S(n)$  đúng. Ta sẽ chứng minh  $S(n+1)$  đúng.

Với mỗi tổng riêng  $x_1 + x_2 + \dots + x_k$  của  $n+1$ , xét hai khả năng

- i)  $x_1 = 1$ . Ta có tương ứng 1-1 giữa  $(1, x_2, x_3, \dots, x_k)$  với  $(x_2, x_3, \dots, x_k)$ , trong đó  $x_2 + x_3 + \dots + x_k = n$ , là một tổng riêng của  $n$ . Vì  $S(n)$  đúng, số tổng riêng loại này là  $2^{n-1}$ .
- ii)  $x_1 > 1$ . Ta lại có tương ứng 1-1 giữa  $(x_1, x_2, \dots, x_k)$  với  $(x_1 - 1, x_2, x_3, \dots, x_k)$ , trong đó  $(x_1 - 1) + x_2 + x_3 + \dots + x_k = n$  là một tổng riêng của  $n$ . Số tổng riêng loại này là  $2^{n-1}$ .

Theo quy tắc cộng, số tổng riêng của  $n+1$  là  $2^{n-1} + 2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$ .

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ . □

Theo ví dụ trên, ta có thể xây dựng các tổng riêng của  $n+1$  đệ quy theo tổng riêng của  $n$ , được mô tả trong bảng sau, với  $n = \overline{1, 4}$ .

$n = 1:$	1	$n = 4:$	(1') 1 + 1 + 1 + 1
			(1'') 1 + 1 + 2
$n = 2:$	1 + 1		(2') 1 + 2 + 1
	2		(2'') 1 + 3
$n = 3:$	(1) 1 + 1 + 1		(3') 2 + 1 + 1
	(2) 1 + 2		(3'') 2 + 2
	(3) 2 + 1		(4') 3 + 1
	(4) 3		(4'') 4

```

1 def compositions(n):
2     if n == 1:
3         return [[1]]
4     L = []
5     for x in compositions(n - 1):
6         y = x.copy()
7         x.append(1)
8         L.append(x)
9         y[-1] += 1
10        L.append(y)
11    return L

```

Các ví dụ sau sử dụng nguyên lý quy nạp tổng quát.

**Ví dụ 4.9.** Chứng minh mọi số nguyên từ 14 trở đi đều phân tích được thành tổng của các số 3 và/hoặc 8.

**Giải.** Xét mệnh đề mở  $S(n)$  :  $n$  viết được thành tổng các số 3 và/hoặc 8.

1)  $S(14)$  đúng, vì  $14 = 3 + 3 + 8$

$S(15)$  đúng, vì  $15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

$S(16)$  đúng, vì  $16 = 8 + 8$ .

2) Giả sử với  $n \geq 16$  cho trước,  $S(14), S(15), \dots, S(n)$  đúng. Ta sẽ chứng minh  $S(n+1)$  đúng. Trước hết, ta tách

$$n+1 = 3 + (n-2).$$

Vì  $n \geq 16$ , nên  $14 \leq n-2 \leq n$ . Vì thế  $S(n-2)$  đúng, tức là  $n-2$  viết được thành tổng các số 3 và/hoặc 8. Do đó  $n+1$  cũng vậy.

Theo giả thiết quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \geq 14$ . □

**Ví dụ 4.10.** Cho dãy  $(a_n)$  xác định bởi  $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3$  và  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 3$ . Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq 3^n$ .

**Giải.** Xét khẳng định mở  $S(n)$  :  $a_n \leq 3^n$ .

1)  $S(0)$  :  $1 \leq 1^0$ , đúng

$S(1)$  :  $2 \leq 3^1$ , đúng

$S(2)$  :  $3 \leq 3^2$ , đúng.

2) Giả sử với  $n \geq 2$  cho trước,  $S(0), S(1), \dots, S(n)$  đúng. Ta sẽ chứng minh  $S(n+1)$  đúng. Vì  $0 \leq n, n-1, n-2 \leq n$ , nên  $S(n), S(n-1), S(n-2)$  đúng. Suy ra

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} \leq 3^n + 3^{n-1} + 3^{n-2} \leq 3^n + 3^n + 3^n = 3 \cdot 3^n = 3^{n+1}.$$

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng  $\forall n \in \mathbb{N}$ . □



Cần kiểm tra các bước ban đầu nào nếu bước quy nạp cần sử dụng giả thiết quy nạp  $S(n - a_i)$  với  $a_i \geq 0, i = \overline{1, k}$ ? Ta cần  $n_0 \leq n - a_i \leq n$ , hay  $n \geq n_0 + a_i, i = \overline{1, k}$ . Do đó  $n_1 = n_0 + \max_{1 \leq i \leq k} a_i$ .

Ở [Trang 79](#), ta đã đưa ra hai cách đếm số tập con của một tập hữu hạn. Giờ ta nêu một cách đếm nữa, theo quan điểm đệ quy.

**Ví dụ 4.11.** Với số tự nhiên  $n$ , chứng minh số tập con của tập cỡ  $n$  là  $2^n$ .

**Giải.** Xét khẳng định mở  $S(n)$ : “số tập con của tập cỡ  $n$  là  $2^n$ ”.

- 1) Tập cỡ 0, tức là không có phần tử nào, là tập rỗng. Tập này chỉ có  $1 = 2^0$  tập con. Ta có  $S(0)$  đúng.
- 2) Giả sử với  $n \geq 0$ ,  $S(n)$  đúng. Xét tập  $A$  cỡ  $n + 1$ . Khi đó  $A = B \cup \{a\}$  trong đó  $B$  có cỡ  $n$ , và  $a \notin B$ . Mỗi tập con  $X$  của  $B$  ứng với hai tập con của  $A$  là  $X$  và  $X \cup \{a\}$ , và ngược lại. Vậy số tập con của  $A$  là  $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ , tức là  $S(n + 1)$  đúng.

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng,  $\forall n \in \mathbb{N}$ . □

### Bài tập 4.1

4.1. Chứng minh các khẳng định sau với mọi  $n \geq 1$  bằng phương pháp quy nạp.

a)  $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n - 1)^2 = \frac{n(2n - 1)(2n + 1)}{3}$

b)  $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \cdots + n(n + 2) = \frac{n(n + 1)(2n + 7)}{6}$

c)  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$

e)  $\sum_{i=1}^n 2^{i-1} = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1$

d)  $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\sum_{i=1}^n i\right)^2$

f)  $\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = 2 + (n - 1)2^{n+1}$

g)  $\sum_{i=1}^n i \cdot i! = (n + 1)! - 1$

4.2. Đặt ngẫu nhiên các số từ 1 tới 25 trên một vòng tròn. Chứng minh trên vòng tròn có ba số liên tiếp có tổng ít nhất là 39.

4.3. Cho đoạn chương trình (dạng giả mã)

```
1 for i := 1 to 123 do
2   for j := 1 to i do
3     print i*j
```

- a) Lệnh `print` ở dòng 3 được thực hiện bao nhiêu lần?
- b) Ở dòng 2, nếu thay  $i$  bởi  $i^2$  thì câu trả lời ở ý (a) là bao nhiêu?

- 4.4. a) Trong các số tự nhiên có bốn chữ số (từ 1000 tới 9999), có bao nhiêu số đối xứng? Tính tổng các số đó.
- b) Viết một chương trình để tính tổng ở ý (a).

4.5. Tìm số nguyên dương  $n$  để  $\sum_{i=1}^{2n} i = \sum_{i=1}^n i^2$ .

**4.6. Tính**

a)  $\sum_{i=11}^{33} i$

b)  $\sum_{i=11}^{33} i^2$

- 4.7.** a) Chứng minh  $(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$ , trong đó  $i \in \mathbb{C}$  và  $i^2 = -1$ .  
 b) Dùng phương pháp quy nạp, chứng minh công thức Moivre\*:  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ .  
 c) Kiểm tra  $1 + i = \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$ , và tính  $(1 + i)^{100}$ .

**4.8.** Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, n > 3 \Rightarrow 2^n < n!$

**4.9.** Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, n > 4 \Rightarrow n^2 < 2^n$ .

**4.10.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , xét  $H_n$  là số điều hòa thứ  $n$  (xem Ví dụ 4.7). Chứng minh

a)  $1 + \frac{n}{2} \leq H_{2^n}, \forall n \in \mathbb{N}$ .

b)  $\sum_{j=1}^n jH_j = \frac{n(n+1)}{2}(H_{n+1} - \frac{1}{2}), \forall n \in \mathbb{Z}^+.$

**4.11.** Xét bốn đẳng thức sau

$$\begin{array}{ll} 1) & 1 = 1 \\ 2) & 2 + 3 + 4 = 1 + 8 \\ 3) & 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 8 + 27 \\ 4) & 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 27 + 64 \end{array}$$

Dự đoán công thức tổng quát và chứng minh công thức đó.

- 4.12.** a) Cho  $n \in \mathbb{Z}^+ - \{1, 3\}$ . Chứng minh  $n$  có thể biểu diễn thành tổng của 2 và/hoặc 5.  
 b) Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ , nếu  $n \geq 24$  thì có thể viết  $n$  thành tổng của 5 và/hoặc 7.

**4.13.** Dãy số  $a_1, a_2, a_3, \dots$  xác định bởi  $a_1 = 1, a_2 = 2$ , và  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, n \geq 3$ .

- a) Tìm  $a_3, a_4, a_5, a_6$ , và  $a_7$ .  
 b) Chứng minh  $\forall n \geq 1, a_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$ .

**4.14.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Xét biến ngẫu nhiên  $X$  có phân bố đều trên  $\{1, 2, \dots, n\}$ , tức là  $P(X = x) = \frac{1}{n}, x = 1, 2, \dots, n$ . Xác định  $EX$  và  $VX$ .

**4.15.** Lập trình liệt kê các tập con của tập cỡ  $n$ .

\*Abraham de Moivre, 1667–1754, nhà toán học Pháp

## 4.2 Định nghĩa đệ quy

Cho dãy số  $(a_n)$ . Đẳng thức chỉ ra sự phụ thuộc của một phần tử của dãy vào các phần tử đứng trước nó gọi là hệ thức đệ quy.

### Ví dụ 4.12.

$$a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3, \text{ và}$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, \quad n = 3, 4, \dots$$

**Ví dụ 4.13.** Các dãy số như số nguyên chẵn, số giai thừa, số điều hòa có thể viết dưới dạng hệ thức đệ quy

a) 1)  $e_0 = 0$ , và

2)  $e_{n+1} = e_n + 2$ , với  $n \geq 0$ .

b) 1)  $0! = 1$ , và

2)  $(n+1)! = (n+1)(n!)$ , với  $n \geq 0$ .

c) 1)  $H_1 = 1$ , và

2)  $H_{n+1} = H_n + \frac{1}{n+1}$ , với  $n \geq 1$ .

**Ví dụ 4.14.** Dãy số Fibonacci\*  $F_n$  định nghĩa đệ quy bởi

1)  $F_0 = 0, F_1 = 1$ , và

2)  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ,  $n \geq 2$ .

Hãy

a) Tìm  $F_n$ , với  $2 \leq n \leq 10$ .

b) Chứng minh  $\sum_{i=0}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

*Giải.* a)

$n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F_n$	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

b) Ký hiệu khẳng định mở  $S(n)$  :  $\sum_{i=0}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}$ .

1)  $S(0)$  :  $F_0^2 = F_0 F_1$ , hay  $0^2 = 0 \cdot 1$ , là khẳng định đúng.

\*Fibonacci, 1170–1250, nhà toán học Ý

2) Giả sử, với  $n \in \mathbb{N}$  cố định,  $S(n)$  đúng. Khi đó

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} F_i^2 &= \sum_{i=0}^n F_i^2 + F_{n+1}^2 \\ &= F_n F_{n+1} + F_{n+1}^2, \quad \text{vì } S(n) \text{ đúng} \\ &= F_{n+1} (F_n + F_{n+1}) \\ &= F_{n+1} F_{n+2} \end{aligned}$$

nên  $S(n+1)$  đúng.

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

□

**Ví dụ 4.15.** Số Lucas<sup>†</sup>  $L_n$  có định nghĩa đệ quy

$$1) L_0 = 2, L_1 = 1, \quad \text{và} \quad 2) L_n = L_{n-1} + L_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

Hãy

- Tìm  $L_n$  với  $2 \leq n \leq 7$ .
- Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ .

*Giải.* a)

$n$	0	1	2	3	4	5	6	7
$L_n$	2	1	3	4	7	11	18	29

b) Ký hiệu khẳng định mở  $S(n)$  :  $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ .

1)  $S(1)$  :  $L_1 = F_0 + F_2$ , hay  $1 = 0 + 1$ , là khẳng định đúng.

$S(2)$  :  $L_2 = F_1 + F_3$ , hay  $3 = 1 + 2$ , đúng.

2) Giả sử, với  $n \geq 2$  cố định,  $S(1), S(2), \dots, S(n)$  đúng. Khi đó

$$\begin{aligned} L_{n+1} &= L_n + L_{n-1} \\ &= (F_{n-1} + F_{n+1}) + (F_{n-2} + F_n), \quad S(n), S(n-1) \text{ đúng vì } 1 \leq n, n-1 \leq n \\ &= (F_{n-1} + F_{n-2}) + (F_n + F_{n+1}) \\ &= F_n + F_{n+2} \end{aligned}$$

nên  $S(n+1)$  đúng.

<sup>†</sup>François Édouard Anatole Lucas, 1842–1891, nhà toán học Pháp



Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ .

□

**Ví dụ 4.16.** Số Euler<sup>†</sup>  $a_{mk}$ , với  $m, k \in \mathbb{N}$ , định nghĩa đệ quy bởi

1)  $a_{mk} = (m - k)a_{m-1, k-1} + (k + 1)a_{m-1, k}$ , với  $0 \leq k \leq m - 1$ , trong đó

2)  $a_{00} = 1$ ,  $a_{mk} = 0$  với  $k \geq m$  (ngoại trừ  $a_{00} = 1$ ) hoặc  $k < 0$ .

Hãy

a) Tìm các số  $a_{mk}$  với  $0 \leq k < m \leq 5$ .

b) Chứng minh  $\sum_{k=0}^{m-1} a_{mk} = m!$ ,  $\forall m \in \mathbb{Z}^+$ .

*Giải.* a)

$m$	$k = \overline{0, m-1}$				
1	1				
2	1	1			
3	1	4	1		
4	1	11	11	1	
5	1	26	66	26	1

b) Ký hiệu khẳng định mở  $S(n)$  :  $\sum_{k=0}^{m-1} a_{mk} = m!$ .

1)  $S(1)$  :  $a_{10} = 1 = 1!$ , là khẳng định đúng.

2) Giả sử với  $m \in \mathbb{Z}^+$  cố định,  $S(m)$  đúng. Khi đó

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^m a_{m+1, k} &= \sum_{k=0}^m [(m+1-k)a_{m, k-1} + (k+1)a_{m, k}] \\
 &= \sum_{k=0}^m (m+1)a_{m, k-1} - \sum_{k=0}^m k a_{m, k-1} + \sum_{k=0}^m (k+1)a_{m, k} \\
 &= (m+1) \sum_{k=-1}^{m-1} a_{mk} - \sum_{k=-1}^m (k+1)a_{mk} + \sum_{k=0}^m (k+1)a_{mk} \\
 &= (m+1) \sum_{k=0}^{m-1} a_{mk} - \sum_{k=0}^m (k+1)a_{mk} + \sum_{k=0}^m (k+1)a_{mk}
 \end{aligned}$$

<sup>†</sup>Leonhard Euler, 1707–1783, nhà toán học, vật lý, thiên văn học, nhà lý luận và kỹ sư Thụy Sĩ

$$\begin{aligned}
 &= (m+1) \sum_{k=0}^{m-1} a_{mk} \\
 &= (m+1) \cdot m! = (m+1)!
 \end{aligned}$$

nên  $S(n+1)$  đúng.

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ .

□

**Ví dụ 4.17.** Dùng hệ thức đệ quy

$$1) \binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1} \text{ với } n \geq r \geq 0, \text{ trong đó}$$

$$2) \binom{0}{0} = 1, \binom{n}{r} = 0 \text{ với } r > n \text{ hoặc } r < 0.$$

để chứng minh  $\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = 2^n, \forall n \in \mathbb{N}$ .

*Giải.* Ký hiệu khẳng định mở  $S(n) : \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = 2^n$ .

$$1) S(0) : \binom{0}{0} = 2^0, \text{ là khẳng định đúng.}$$

2) Giả sử với  $n \in \mathbb{N}$  cố định,  $S(n)$  đúng. Khi đó

$$\begin{aligned}
 \sum_{r=0}^{n+1} \binom{n+1}{r} &= \sum_{r=0}^{n+1} \left[ \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1} \right] \\
 &= \sum_{r=0}^{n+1} \binom{n}{r} + \sum_{r=0}^{n+1} \binom{n}{r-1} \\
 &= \sum_{r=0}^{n+1} \binom{n}{r} + \sum_{r=-1}^n \binom{n}{r} \\
 &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} + \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \\
 &= 2^n + 2^n = 2^{n+1}
 \end{aligned}$$

nên  $S(n+1)$  đúng.

Theo nguyên lý quy nạp,  $S(n)$  đúng,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

□

Một tập hợp được định nghĩa đệ quy bởi

- 1) các phần tử ban đầu, và
- 2) các quy tắc thành tìm phần tử mới theo phần tử đã có.

Tập  $A$  gọi là tập “nhỏ nhất” thỏa mãn định nghĩa đệ quy trên, nếu  $B$  là tập bất kỳ cũng thỏa mãn định nghĩa đệ quy, thì  $A \subseteq B$ .

**Ví dụ 4.18.** Cho  $A$  là tập nhỏ nhất thỏa mãn định nghĩa đệ quy

- 1)  $1 \in A$ .
- 2)  $\forall a \in A, a + 2 \in A$ .

Chứng minh  $A$  là tập các số tự nhiên lẻ.

*Giải.* Ký hiệu tập các số tự nhiên lẻ là  $B = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Ta sẽ chứng minh  $A = B$ .

a) Để chứng minh  $A \subseteq B$ , ta chỉ ra  $B$  cũng thỏa mãn định nghĩa đệ quy. Thật vậy

- 1) Với  $n = 0 \in \mathbb{N}$ , ta có  $2 \cdot 0 + 1 = 1 \in B$ .
- 2) Giả sử  $a \in B$ , tức là  $\exists n \in \mathbb{N}, a = 2n + 1$ . Khi đó  $a + 2 = (2n + 1) + 2 = 2(n + 1) + 1 \in B$ , vì  $n + 1 \in \mathbb{N}$ .

b) Tiếp theo, ta chứng minh  $B \subseteq A$ , tức là  $2n + 1 \in A, \forall n \in \mathbb{N}$ , bằng phương pháp quy nạp. Xét khẳng định mở

$$S(n) : 2n + 1 \in A,$$

với  $n \in \mathbb{N}$ .

- 1)  $S(0)$  đúng, vì  $2 \cdot 0 + 1 = 1 \in A$ .
- 2) Giả sử với  $n \in \mathbb{N}$  nào đó,  $S(n)$  đúng, hay  $2n + 1 \in A$ . Khi đó  $2(n + 1) + 1 = (2n + 1) + 2 \in A$ , tức là  $S(n + 1)$  đúng.

Theo phương pháp quy nạp, ta có  $B \subseteq A$ .

Vì  $A \subseteq B$ , và  $B \subseteq A$ , nên  $A = B$ . □

Với các phép toán hai ngôi có tính chất kết hợp, ta có thể “định nghĩa tốt” phép toán đó cho nhiều ngôi bằng cách đệ quy theo phép toán với ít ngôi hơn. Chẳng hạn, phép  $\vee, \wedge$  đối với mệnh đề, hay  $\cup, \cap$  đối với tập hợp.

**Ví dụ 4.19.** Chứng minh với mọi  $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 3$ , với các mệnh đề  $p_1, p_2, \dots, p_n$  ta có

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_r) \wedge (p_{r+1} \wedge \dots \wedge p_n) \Leftrightarrow p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n, \forall 1 \leq r < n.$$

Trường hợp đặc biệt, với  $r = n - 1$

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_{n-1} \wedge p_n \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_{n-1}) \wedge p_n.$$

Tương tự, cho các tập  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,  $n \geq 3$ , ta cũng có các định nghĩa đệ quy

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n &= (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_r) \cup (A_{r+1} \cup \cdots \cup A_n), \quad \forall 1 \leq r < n \\ &= (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_{n-1}) \cup A_n. \end{aligned}$$

## Bài tập 4.2

**4.16.** Dãy số nguyên  $a_1, a_2, a_3, \dots$  có công thức hiện  $a_n = 5n$  với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , có thể định nghĩa đệ quy bởi

- 1)  $a_1 = 5$ , và 2)  $a_{n+1} = a_n + 5$ , với  $n \geq 1$ .

Còn dãy số nguyên  $b_1, b_2, b_3, \dots$  trong đó  $b_n = n(n+2)$  với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , cũng có dạng đệ quy

- 1)  $b_1 = 3$ , và 2)  $b_{n+1} = b_n + 2n + 3$ , với  $n \geq 1$ .

Tìm một định nghĩa đệ quy cho dãy số nguyên  $c_1, c_2, c_3, \dots$ , trong đó với  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,

- a)  $c_n = 7n$  c)  $c_n = 3n + 7$  e)  $c_n = n^2$   
 b)  $c_n = 7^n$  d)  $c_n = 7$  f)  $c_n = 2 - (-1)^n$

**4.17.** Cho  $n \geq 2$  và các tập bất kỳ  $A_2, A_3, \dots, A_n \subseteq \mathcal{U}$ . Chứng minh

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n.$$

**4.18.** Chứng minh rằng nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $n \geq 2$ , và  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ , thì

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|.$$

**4.19.** Cho định nghĩa đệ quy của dãy  $a_0, a_1, a_2, \dots$

- 1)  $a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 1$ ; và 2) Với  $n \geq 3$ ,  $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}$ .

Chứng minh  $a_{n+2} \geq (\sqrt{2})^n$ ,  $\forall n \geq 0$ .

**4.20.** Với  $n \geq 0$ , ký hiệu  $F_n$  là số Fibonacci thứ  $n$ . Chứng minh

$$F_0 + F_1 + F_2 + \cdots + F_n = \sum_{i=0}^n F_i = F_{n+2} - 1.$$



**Ví dụ 4.21.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}$  sao cho  $17 \mid (2a + 3b)$ . Chứng minh  $17 \mid (9a + 5b)$ .

*Giải.* Ta có  $4(2a + 3b) + (9a + 5b) = 17(a + b)$ . Vì  $17 \mid (2a + 3b)$  nên  $17 \mid 4(2a + 3b)$ . Mặt khác,  $17 \mid 17(a + b)$ , nên  $17 \mid (9a + 5b)$ .  $\square$

**Định nghĩa 4.2.** Cho số nguyên  $n > 1$ .  $n$  gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Ngược lại,  $n$  gọi là hợp số.

**Bổ đề 4.1.** Mọi số nguyên lớn hơn 1 đều có ước nguyên tố.

**Định lý 4.3** (Euclid). \* Có vô hạn số nguyên tố.

**Định lý 4.4** (Thuật toán chia). Nếu  $a, b \in \mathbb{Z}$  với  $b > 0$ , thì tồn tại duy nhất  $q, r \in \mathbb{Z}$ ,  $0 \leq r < b$  sao cho  $a = qb + r$ .

Trong biểu thức chia  $a = qb + r$ ,  $a$  gọi là số bị chia,  $b$  là số chia, và  $q$  là thương,  $r$  là phần dư của phép chia  $a$  cho  $b$ , ký hiệu

$$q = a \operatorname{div} b, \quad r = a \operatorname{mod} b.$$

**Ví dụ 4.22.** a)  $170 = 15 \cdot 11 + 5$ , trong đó  $0 \leq 5 < 11$ , nên  $170 \operatorname{div} 11 = 15$ ,  $170 \operatorname{mod} 11 = 5$ .

b)  $98 = 14 \cdot 7$ , hay  $98 = 14 \cdot 7 + 0$ , nên  $98 \operatorname{div} 7 = 14$ ,  $98 \operatorname{mod} 7 = 0$ . Ở đây  $7 \mid 98$ .

c)  $-45 = (-6)8 + 3$ , trong đó  $0 \leq 3 < 8$ , nên  $-45 \operatorname{div} 8 = -6$ ,  $-45 \operatorname{mod} 8 = 3$ .

d) Với  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ,

1) Nếu  $a = qb$ , với  $q \in \mathbb{Z}^+$ , thì  $-a = (-q)b$ . Khi đó

$$-a \operatorname{div} b = -q, \quad -a \operatorname{mod} b = 0.$$

2) Nếu  $a = qb + r$ , với  $q \in \mathbb{Z}$  và  $0 < r < b$ , thì  $-a = (-q)b - r = (-q)b - b + b - r = (-q - 1)b + (b - r)$ , trong đó  $0 < b - r < b$ . Khi đó

$$-a \operatorname{div} b = -q - 1, \quad -a \operatorname{mod} b = b - r.$$

\*Euclid, khoảng 330–275 trước công nguyên, nhà toán học Hy Lạp

**Ví dụ 4.23.** Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$  là hợp số, thì có số nguyên tố  $p \leq \sqrt{n}$  sao cho  $p \mid n$ .

*Giải.* Vì  $n$  là hợp số, ta có thể viết  $n = n_1 n_2$ , trong đó  $n_1, n_2 > 1$  là các số nguyên.

Trước hết, ta chứng minh  $n_1 \leq \sqrt{n}$  hoặc  $n_2 \leq \sqrt{n}$ . Thật vậy, nếu ngược lại, tức là  $n_1, n_2 > \sqrt{n}$ , thì  $n_1 n_2 > \sqrt{n} \sqrt{n}$ , suy ra  $n > n$ , mâu thuẫn!

Không mất tổng quát, giả sử  $n_1 \leq \sqrt{n}$ . Vì  $n_1 > 1$ , theo **Bổ đề 4.1**, có số nguyên tố  $p$  là ước của  $n_1$ . Vì  $n_1 \mid n$  nên  $p \mid n$ . Mặt khác,  $p \leq n_1 \leq \sqrt{n}$ , nên  $p$  là số nguyên tố thỏa mãn bài toán.  $\square$

**Định lý 4.5** (Biểu diễn số nguyên). Cho  $b \in \mathbb{Z}^+, b > 1$ . Khi đó mọi số  $n \in \mathbb{Z}^+$  biểu diễn duy nhất dưới dạng:

$$n = r_k b^k + r_{k-1} b^{k-1} + \cdots + r_1 b + r_0$$

trong đó  $0 \leq r_i < b \forall i = \overline{0, k}, r_k \neq 0$ .

Ký hiệu  $n = (r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_b$  gọi là khai triển  $n$  theo cơ số  $b$ . Khai triển theo cơ số 2 gọi là khai triển nhị phân, hay xâu bit. Hệ cơ số 16, hay thập lục phân, gồm các chữ số 0, 1, 2, ..., 9 và các chữ A, B, C, D, E, F tương ứng với giá trị 10, 11, 12, 13, 14, 15.

**Ví dụ 4.24.**

$$245_8 = 2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 5 = 165$$

$$101\,011\,111_2 = 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = 351$$

Biến đổi

$$n = n_0 = b(r_k b^{k-1} + r_{k-1} b^{k-2} + \cdots + r_2 b + r_1) + r_0 = b n_1 + r_0$$

$$n_1 = b(r_k b^{k-2} + r_{k-1} b^{k-3} + \cdots + r_3 b + r_2) + r_1 = b n_2 + r_1$$

$$n_2 = b(r_k b^{k-3} + r_{k-1} b^{k-4} + \cdots + r_4 b + r_3) + r_2 = b n_3 + r_2, \dots$$

trong đó  $n_i = r_k b^{k-i} + r_{k-1} b^{k-i-1} + \cdots + r_{i+1} b + r_i$  với  $i = \overline{0, k}$ . Khi đó, ta có công thức Horner\*

1) Tìm giá trị  $n$  của biểu diễn  $(r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_b$ :

$$n_k = r_k, \text{ và}$$

$$n_i = b n_{i+1} + r_i, \forall i = \overline{k-1, 0}.$$

Ở đây  $n = n_0$ , và

\*William George Horner, 1786–1837, nhà toán học Anh

2) Tìm biểu diễn  $(r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_b$  của  $n$ :

$$a_i = n_i \bmod b, \quad n_{i+1} = n_i \operatorname{div} b.$$

trong đó  $n_0 = n$ , và quá trình thực hiện đến khi  $n_{k+1} = 0$ .

**Ví dụ 4.25.** a) Tính  $30071_8$ .

b) Tìm khai triển của  $6137$  theo cơ số  $8$ .

*Giải.* a)

$$n_4 = 3$$

$$n_3 = 8 \cdot 3 + 0 = 24$$

$$n_2 = 8 \cdot 24 + 0 = 192$$

$$n_1 = 8 \cdot 192 + 7 = 1543$$

$$n = n_0 = 8 \cdot 1543 + 1 = 12345$$

nên  $30071_8 = 12345$ .

```

1 a = [1, 7, 0, 0, 3]
2 b = 8
3 n = 0
4 for i in range(len(a) - 1, -1, -1):
5     n = n * b + a[i]
6 n

```

b) Quá trình tìm biểu diễn được viết trình bày theo cách liệt kê các phép chia, hoặc sơ đồ.


$$6137 = 767 \cdot 8 + 1$$

$$767 = 95 \cdot 8 + 7$$

$$95 = 11 \cdot 8 + 7$$

$$11 = 1 \cdot 8 + 3$$

$$1 = \boxed{0} \cdot 8 + 1$$



Ta được  $6137 = 13771_8$ .

```

1 n, b = 6137, 8
2 a = []

```



```

3 while n != 0:
4     a = [n % b] + a
5     n //= b
6 a

```



### Bài tập 4.3

4.25. Cho  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$ . Chứng minh

- a)  $a \mid b \wedge c \mid d \Rightarrow ac \mid bd$       b)  $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$ , và      c)  $ac \mid bc \Rightarrow a \mid b$ .

4.26. Nếu  $p, q$  nguyên tố, thì  $p \mid q$  khi và chỉ khi  $p = q$ .

4.27. Nếu  $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$  và  $a \mid bc$ , thì có suy ra được  $a \mid b$  hoặc  $a \mid c$  không?

4.28. Với  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , chứng minh nếu  $a \nmid bc$ , thì  $a \nmid b$  và  $a \nmid c$ .

4.29. Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $n \geq 2$ . Chứng minh nếu  $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{Z}^+$  và  $a_i \mid b_i, \forall i = \overline{1, n}$ , thì  $(a_1 a_2 \cdots a_n) \mid (b_1 b_2 \cdots b_n)$ .

4.30. a) Tìm một giá trị của các số nguyên dương  $a, b, c$  sao cho  $31 \mid (5a + 7b + 11c)$ .

b) Cho  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  và  $31 \mid (5a + 7b + 11c)$ , chứng minh  $31 \mid (21a + 17b + 9c)$ .

4.31. Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ . Nếu  $b \mid a$  và  $b \mid (a + 2)$ , chứng minh  $b = 1$  hoặc  $b = 2$ .

4.32. Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$ , và  $n$  lẻ, chứng minh  $8 \mid (n^2 - 1)$ .

4.33. Nếu  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ , và cùng lẻ, chứng minh  $2 \mid (a^2 + b^2)$  nhưng  $4 \nmid (a^2 + b^2)$ .

4.34. Tìm thương  $q$  và phần dư  $r$  của phép chia  $a$  cho  $b$ :

- a)  $a = 23, b = 7$       c)  $a = 0, b = 42$   
b)  $a = -115, b = 12$       d)  $a = 434, b = 31$

4.35. Chứng minh  $3 \mid (7^n - 4^n), \forall n \in \mathbb{N}$ .

4.36. Viết các số nguyên sau (cơ số 10) theo cơ số 2, 4, và 8.

- a) 137      b) 6243      c) 12345

**4.37.** Viết các số nguyên (cơ số 10) theo cơ số 2 và 16.

- a) 22                      b) 527                      c) 1234                      d) 6923

**4.38.** Chuyển các số trong hệ thập lục phân sau sang cơ số 2 và 10.

- a) A7                      b) 4C2                      c) 1C2B                      d) A2DFE

**4.39.** Chuyển các số nhị phân sau sang cơ số 10 và 16.

- a) 11 001 110                      b) 00 110 001                      c) 11 110 000                      d) 01 010 111

**4.40.** Trong cơ số nào ta có đẳng thức  $251 + 445 = 1026$ ?

**4.41.** Tìm tất cả  $n \in \mathbb{Z}^+$  để  $n$  chia đều  $5n + 18$ .

**4.42.** Thuật toán chia có thể tổng quát hóa như sau: Với  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \neq 0$ , tồn tại duy nhất  $q, r \in \mathbb{Z}$  sao cho  $a = qb + r$ ,  $0 \leq r < |b|$ . Dùng [Định lý 4.4](#), kiểm tra dạng tổng quát này của thuật toán với  $b < 0$ .

**4.43.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$ , viết chương trình máy tính (hoặc phát triển một thuật toán) liệt kê các ước dương của  $n$ .

**4.44.** Tập  $X \subseteq \mathbb{Z}^+$  là tập nhỏ nhất xác định bởi

- 1)  $3 \in X$ , và                      2) Nếu  $a, b \in X$ , thì  $a + b \in X$ .

Chứng minh  $X = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$ , là tập các số nguyên dương chia hết cho 3.

**4.45.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$  với  $n = r_k \cdot 10^k + \dots + r_2 \cdot 10^2 + r_1 \cdot 10 + r_0$  (biểu diễn cơ số 10 của  $n$ ). Chứng minh

- a)  $2 \mid n \Leftrightarrow 2 \mid r_0$                       b)  $4 \mid n \Leftrightarrow 4 \mid (r_1 \cdot 10 + r_0)$   
c)  $8 \mid n \Leftrightarrow 8 \mid (r_2 \cdot 10^2 + r_1 \cdot 10 + r_0)$

Phát biểu kết luận tổng quát từ các khẳng định trên.

## 4.4 Ước chung lớn nhất: thuật toán Euclid

**Định nghĩa 4.3.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Số nguyên dương  $c$  gọi là ước chung của  $a$  và  $b$  nếu  $c \mid a$  và  $c \mid b$ .

**Định nghĩa 4.4.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}$ , trong đó  $a \neq 0$  hoặc  $b \neq 0$ . Khi đó  $c \in \mathbb{Z}^+$  gọi là ước chung lớn nhất của  $a, b$  nếu

- 1)  $c$  là ước chung của  $a, b$ , và
- 2) nếu  $d$  cũng là ước chung của  $a$  và  $b$ , thì  $d \mid c$ .

**Định lý 4.6.** Cho hai số nguyên  $a, b$  không đồng thời bằng 0. Khi đó, có duy nhất một ước chung lớn nhất của  $a$  và  $b$ , ký hiệu  $\gcd(a, b)$ .

*Giải.* Đặt  $C = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\} \subseteq \mathbb{Z}^+$ . Vì  $C \neq \emptyset$ , theo nguyên lý sắp tốt, tồn tại  $c = \min C$ . Ta sẽ chứng minh  $c$  là một ước chung lớn nhất của  $a$  và  $b$ .

Vì  $c \in C$ , nên  $\exists x, y \in \mathbb{Z}, c = ax + by$ .

- a) Trước hết, ta chứng minh  $c \mid a$ . Giả sử ngược lại,  $c \nmid a$ . Theo thuật toán chia,  $a = qc + r$ , với  $q, r \in \mathbb{Z}$  và  $0 < r < c$ . Khi đó

$$r = a - qc = a - q(ax + by) = a(1 - qx) + b(-qy),$$

nên  $r \in C$ . Mặt khác,  $c = \min C$  nên  $c \leq r$ , mâu thuẫn! Do đó  $c \mid a$ . Lập luận tương tự, ta có  $c \mid b$ . Vậy  $c$  là một ước chung của  $a$  và  $b$ .

- b) Giả  $d \in \mathbb{Z}^+$  sao cho  $d \mid a$  và  $d \mid b$ . Theo Định lý 4.2(f),  $d \mid (ax + by)$ , hay  $d \mid c$ .

Do đó  $c$  là một ước chung lớn nhất của  $a$  và  $b$ .

Cuối cùng, giả sử  $c'$  cũng là một ước chung lớn nhất của  $a$  và  $b$ . Vì  $c'$  là một ước chung của  $a$  và  $b$ , nên  $c' \mid c$ . Hoàn toàn tương tự,  $c \mid c'$ . Theo Định lý 4.2(b), và lưu ý  $c, c' \in \mathbb{Z}^+$ , suy ra  $c = c'$ .

Vậy hai số nguyên dương  $a, b$  có duy nhất một ước chung lớn nhất. □



$\gcd(a, 0) = |a|$ , và  $\gcd(a, b) = \gcd(b, a) = \gcd(|a|, |b|)$ . Ở đây, ta không định nghĩa  $\gcd(0, 0)$ . Ngoài ra,  $\gcd(a, b)$  là một tổ hợp tuyến tính của  $a, b$ , tức là

$$\exists x, y \in \mathbb{Z}, \gcd(a, b) = ax + by.$$

**Định nghĩa 4.5.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}$  với  $a \neq 0$  hoặc  $b \neq 0$ . Ta nói  $a, b$  nguyên tố cùng nhau nếu  $\gcd(a, b) = 1$ .

Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ . Xét thuật toán chia  $a$  cho  $b$ :  $a = qb + r$ , với  $0 \leq r < b$ . Khi đó

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r) = \gcd(b, a \bmod b).$$

**Định lý 4.7** (Thuật toán Euclid). Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ . Đặt  $r_0 = a$ ,  $r_1 = b$ , và áp dụng thuật toán chia như sau

$$\begin{aligned} r_0 &= q_1 r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 &= q_2 r_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ r_2 &= q_3 r_3 + r_4, & 0 < r_4 < r_3 \\ &\dots \\ r_{i-1} &= q_i r_i + r_{i+1}, & 0 < r_{i+1} < r_i \\ &\dots \\ r_{n-2} &= q_{n-1} r_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} &= q_n r_n. \end{aligned}$$

Khi đó  $\gcd(a, b) = r_n$ , là phần dư khác không cuối cùng.

**Ví dụ 4.26.** Tìm  $\gcd(91, 287)$ .

*Giải.*

$$91 = 0 \cdot 287 + 91$$

$$287 = 3 \cdot 91 + 14$$

$$91 = 6 \cdot 14 + 7$$

$$14 = 2 \cdot 7$$

nên  $\gcd(91, 287) = 7$ .

**Cách 1:** Dùng hàm  $\gcd$  của thư viện `math` hoặc  $\text{igcd}$  của `sympy`

```
1 import math
2 math.gcd(91, 287)  # gcd(91, 287) = 7

4 from sympy import *
5 igcd(91, 287)
```

**Cách 2:** Đệ quy

```
1 def gcd(a, b):
2     if b == 0:
3         return a
4     else:
5         return gcd(b, a % b)
```

**Cách 3:** Phương pháp quy hoạch động cho hệ thức đệ quy

$$r_{i+1} = r_{i-1} \bmod r_i, \quad i = 1, 2, \dots, \quad \text{với } r_0 = a, r_1 = b,$$

đến khi  $r_{n+1} = 0$ .

```
1 def gcd(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

```
1 def gcd(a, b):
2     while b != 0:
3         r = a % b
4         a = b
5         b = r
6     return a
```

□

**Ví dụ 4.27.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh  $8n + 3$  và  $5n + 2$  nguyên tố cùng nhau.

*Giải.*

$$8n + 3 = 1 \cdot (5n + 2) + (3n + 1)$$

$$5n + 2 = 1 \cdot (3n + 1) + (2n + 1)$$

$$3n + 1 = 1 \cdot (2n + 1) + n$$

$$2n + 1 = 2 \cdot n + 1$$

$$n = n \cdot 1$$

nên  $\gcd(8n + 3, 5n + 2) = 1$ .

```
1 from sympy import *
2 n = symbols('n')
3 gcd(8*n + 3, 5*n + 2)
```

□

Gọi  $x_i, y_i$  là các hệ số của biểu diễn tuyến tính  $r_i$  theo  $a$  và  $b$ , tức là  $r_i = ax_i + by_i$ . Thay biểu diễn này vào phép chia ở trên:

$$ax_{i-1} + by_{i-1} = q_i(ax_i + by_i) + (ax_{i+1} + by_{i+1}),$$

rồi cân bằng hệ số của  $a$  và  $b$ , được  $x_{i-1} = q_i x_i + x_{i+1}$  và  $y_{i-1} = q_i y_i + y_{i+1}$ . Ta có hệ thức đệ quy

$$x_{i+1} = x_{i-1} - q_i x_i, \quad \text{và}$$

$$y_{i+1} = y_{i-1} - q_i y_i,$$

trong đó  $r_0 = a = 1a + 0b$ , cho ta  $x_0 = 1, y_0 = 0$ , và  $r_1 = b = 0a + 1b$ , ứng với  $x_1 = 0, y_1 = 1$ .

Khi thuật toán Euclid dừng,  $r_n = ax_n + by_n$ . Đặt  $x_n = x, y_n = y$ , ta có biểu diễn

$$\gcd(a, b) = ax + by,$$

gọi là thuật toán Euclid mở rộng.

**Ví dụ 4.28.** Tìm khai triển Euclid mở rộng của 91 và 287.

*Giải.*  $\gcd(91, 287) = 7$ , và biểu diễn tuyến tính  $7 = 19 \cdot 91 + (-6)287$ . Quá trình tính được thể hiện trong bảng sau

$i$	$a$	$b$	$q_i$	$x_i$	$y_i$
0	91	287		1	0
1	287	91	0	0	1
2	91	14	3	1	0
3	14	7	6	-3	1
4	7	0		19	-6

**Cách 1:** dùng gói lệnh

```
1 from sympy import *
2 gcdex(91, 287)
```

kết quả  $(19, -6, 7)$  cho ta hệ thức  $19 \cdot 91 + (-6)287 = 7$

**Cách 2:** lập trình

```
1 def gcdex(a, b):
2     x0, y0 = 1, 0
3     x1, y1 = 0, 1
4     while b != 0:
5         q = a // b
6         a, b = b, a % b
7         x = x0 - x1 * q
8         y = y0 - y1 * q
9         x0, y0 = x1, y1
10        x1, y1 = x, y
11    return x0, y0, a
```

□

**Định lý 4.8.** Với  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ,  $a \neq 0$  hoặc  $b \neq 0$ , phương trình Diophant<sup>t</sup>  $ax + by = c$  có nghiệm nguyên khi và chỉ khi  $\gcd(a, b) \mid c$ .

Đặc biệt, với  $c = 1$

$$\gcd(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}, ax + by = 1.$$

Hai số nguyên liên tiếp  $a, a + 1$  nguyên tố cùng nhau, vì  $a(-1) + (a + 1) \cdot 1 = 1$ .

**Định nghĩa 4.6.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ . Số  $c \in \mathbb{Z}^+$  gọi là một bội chung của  $a, b$  nếu  $c$  là bội của cả  $a$  và  $b$ . Số nhỏ nhất trong các bội chung của  $a, b$  gọi là bội chung nhỏ nhất của  $a, b$ , ký hiệu  $\text{lcm}(a, b)$ .

**Ví dụ 4.29.** Tìm  $\text{lcm}(6, 15)$ .

*Giải.*

$$\begin{aligned} A &= \{a \in \mathbb{Z}^+ : 6 \mid a\} = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots\} \\ B &= \{a \in \mathbb{Z}^+ : 15 \mid a\} = \{15, 30, 45, 60, 75, \dots\} \\ \Rightarrow A \cap B &= \{a \in \mathbb{Z}^+ : 6 \mid a \wedge 15 \mid a\} = \{30, 60, \dots\} \\ \Rightarrow \text{lcm}(6, 15) &= \min A \cap B = 30. \end{aligned}$$

□

**Định lý 4.9.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  và  $c = \text{lcm}(a, b)$ . Nếu  $d$  là một ước chung của  $a$  và  $b$ , thì  $c \mid d$ .

**Định lý 4.10.**  $\forall a, b \in \mathbb{Z}^+, ab = \text{lcm}(a, b) \cdot \gcd(a, b)$ .

**Ví dụ 4.30.** a) Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ .

- i) Nếu  $a, b$  nguyên tố cùng nhau, thì  $\text{lcm}(a, b) = ab$ .
- ii) Nếu  $a \mid b$  thì  $\gcd(a, b) = a, \text{lcm}(a, b) = b$ .

$$\text{b) } \gcd(456, 168) = 24 \Rightarrow \text{lcm}(456, 168) = \frac{456 \cdot 168}{24} = 3192.$$

```
1 from sympy import *
2 ilcm(456, 168)
```

<sup>†</sup>Diophantus, thế kỷ 3, nhà toán học Hy Lạp

**Bài tập 4.4**

**4.46.** Với  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ , tìm  $\gcd(a, b)$  và biểu diễn nó bởi tổ hợp tuyến tính của  $a, b$ .

a) 231, 1820

b) 1369, 2597

c) 2689, 4001

**4.47.** Với  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  và  $x, y \in \mathbb{Z}$ , có thể nói gì về  $\gcd(a, b)$  nếu

a)  $ax + by = 2$

b)  $ax + by = 3$

c)  $ax + by = 4$

d)  $ax + by = 6$

**4.48.** Với  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  và  $d = \gcd(a, b)$ , chứng minh  $\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$ .

**4.49.** Với  $a, b, n \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh  $\gcd(na, nb) = n \cdot \gcd(a, b)$ .

**4.50.** Cho  $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$  với  $c = \gcd(a, b)$ . Chứng minh  $c^2 \mid ab$ .

**4.51.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

a) Chứng minh  $\gcd(n, n+1) = 1$  hoặc 2.

b)  $\gcd(n, n+3)$  có thể bằng bao nhiêu? Và  $\gcd(n, n+4)$ ?

c) Nếu  $k \in \mathbb{Z}^+$ , có thể nói gì về  $\gcd(n, n+k)$ ?

**4.52.** Với  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh nếu  $d = a + bc$ , thì  $\gcd(b, d) = \gcd(a, b)$ .

**4.53.** Cho  $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$  với  $\gcd(a, b) = 1$ . Nếu  $a \mid c$  và  $b \mid c$ , chứng minh  $ab \mid c$ . Khẳng định còn đúng không nếu  $\gcd(a, b) \neq 1$ ?

**4.54.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}$  trong đó ít nhất một số khác 0.

a) Dùng lượng tử, phát biểu lại định nghĩa  $c = \gcd(a, b)$ .

b) Với  $c \in \mathbb{Z}^+$ , dùng kết quả ở ý (a) để chỉ ra khi nào  $c \neq \gcd(a, b)$ .

**4.55.** Nếu  $a, b$  nguyên tố cùng nhau và  $a > b$ , chứng minh  $\gcd(a - b, a + b) = 1$  hoặc 2.

**4.56.** Cho  $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$  với  $\gcd(a, b) = 1$ . Nếu  $a \mid bc$ , chứng minh  $a \mid c$ .

**4.57.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  với  $a \geq b$ . Chứng minh  $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$ .

**4.58.** Chứng minh  $\gcd(5n+3, 7n+4) = 1, \forall n \in \mathbb{Z}^+$ .

**4.59.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ . Chứng minh tồn tại  $c, d \in \mathbb{Z}^+$  sao cho  $cd = a$  và  $\gcd(c, d) = b$  khi và chỉ khi  $b^2 \mid a$ .



**4.60.** Tìm các giá trị của  $c \in \mathbb{Z}^+$ ,  $10 < c < 20$ , để phương trình Diophant  $84x + 990y = c$  vô nghiệm. Tìm nghiệm của phương trình với các giá trị còn lại của  $c$ .

**4.61.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  với  $a = 630$ ,  $\gcd(a, b) = 105$  và  $\text{lcm}(a, b) = 242\,550$ . Tìm  $b$ .

**4.62.** Với các cặp  $a, b$  trong 4.46, tìm  $\text{lcm}(a, b)$ .

**4.63.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , tìm  $\gcd(n, n+1)$  và  $\text{lcm}(n, n+1)$ .

**4.64.** Chứng minh  $\text{lcm}(na, nb) = n \cdot \text{lcm}(a, b)$ ,  $\forall n, a, b \in \mathbb{Z}^+$ .

## 4.5 Định lý cơ bản của số học

**Bổ đề 4.2.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}$  và số nguyên tố  $p$ . Nếu  $p \mid (ab)$  thì  $p \mid a$  hoặc  $p \mid b$ .

Tổng quát, với  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ , nếu  $p \mid (a_1 a_2 \cdots a_n)$  thì  $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $p \mid a_i$ .

**Ví dụ 4.31.** Chứng minh  $\sqrt{2}$  là số vô tỷ.<sup>‡</sup>

*Giải.* Giả sử ngược lại,  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ , với  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  và  $\gcd(a, b) = 1$ . Khi đó  $2 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow 2b^2 = a^2 \Rightarrow 2 \mid a^2 \Rightarrow 2 \mid (a \cdot a) \Rightarrow 2 \mid a$ . Vì thế,  $\exists c \in \mathbb{Z}$ ,  $a = 2c$ , nên  $2b^2 = a^2 = (2c)^2 = 4c^2 \Rightarrow b^2 = 2c^2 \Rightarrow 2 \mid b^2 \Rightarrow 2 \mid b$ . Như vậy, 2 là một ước chung của  $a, b$ , mà  $\gcd(a, b) = 1$ , nên  $2 \leq 1$ , mâu thuẫn! Vậy  $\sqrt{2}$  là số vô tỷ.

□

**Định lý 4.11** (Định lý cơ bản của số học). Mọi số nguyên  $n > 1$  đều phân tích được thành tích các số nguyên tố, một cách duy nhất theo nghĩa chỉ sai khác thứ tự các thừa số nguyên tố. (Ở đây, một số nguyên tố có phân tích chỉ gồm một thừa số.)

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

trong đó  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  là các số nguyên tố, và  $e_1, e_2, \dots, e_k \in \mathbb{Z}^+$ .

**Ví dụ 4.32.** Tìm phân tích nguyên tố của 980 220.

<sup>‡</sup>Aristotle, 384–322 trước công nguyên, nhà triết học Hy Lạp

*Giải.*

$$\begin{aligned} 980\,220 &= 2^1 \cdot 490\,110 = 2^2 \cdot 245\,055 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 81\,685 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 16\,337 \\ &= 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 17^1 \cdot 961 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 17^1 \cdot 31^2. \end{aligned}$$

**Cách 1:**

```
1 from sympy import *
2 factorint(980220) # {2: 2, 3: 1, 5: 1, 17: 1, 31: 2}
```

**Cách 2:**

```
1 def factorint(n):
2     i = 2
3     fact = {}
4     while n > 1:
5         while n % i != 0:
6             i += 1
7         e = 0
8         while n % i == 0:
9             n //= i
10            e += 1
11            fact[i] = e
12     return fact
```

□

**Ví dụ 4.33.** a) Nếu  $n$  có phân tích nguyên tố  $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ , thì nó có bao nhiêu ước dương?

b) Số  $n = 29\,338\,848\,000 = 2^8 3^5 5^3 7^3 11$  có bao nhiêu

i) ước dương là bội của 360?

ii) ước là số chính phương?

*Giải.* a) Mỗi ước dương của  $n$  có dạng  $m = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$ , trong đó  $0 \leq f_i \leq e_i$ ,  $\forall i = 1, k$ . Theo quy tắc nhân, số ước dương của  $n$  là  $(e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$ .

b) Mỗi ước dương của  $n = 2^8 3^5 5^3 7^3 11$  có dạng  $m = 2^{e_1} 3^{e_2} 5^{e_3} 7^{e_4} 11^{e_5}$ , trong đó  $0 \leq e_1 \leq 8, 0 \leq e_2 \leq 5, 0 \leq e_3 \leq 3, 0 \leq e_4 \leq 3$  và  $0 \leq e_5 \leq 1$ .

i) Để  $m$  là bội của  $360 = 2^3 3^2 5$ , ta cần thêm điều kiện  $e_1 \geq 3, e_2 \geq 2$  và  $e_3 \geq 1$ .  
Số ước dương của  $n$  là bội của 360 là

$$[(8 - 3) + 1][(5 - 2) + 1][(3 - 1) + 1][(3 - 0) + 1][(1 - 0) + 1] = 576.$$

ii) Để  $m$  là số chính phương,  $\forall i = \overline{1, 5}$ ,  $e_i$  chẵn. Ta có

$e_i$	Cách chọn	Số cách chọn
$e_1$	0, 2, 4, 6, 8	5
$e_2$	0, 2, 4	3
Mỗi $e_3, e_4$	0, 2	2
$e_5$	0	1

Theo quy tắc nhân, số ước chính phương của  $n$  là  $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = 60$ .

□

Cho  $m, n \in \mathbb{Z}^+$  các phân tích nguyên tố  $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$  và  $n = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$ , với  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  là các số nguyên tố, và  $e_i, f_i \in \mathbb{N}$ ,  $i = \overline{1, k}$ . Đặt

$$a_i = \min\{e_i, f_i\}, b_i = \max\{e_i, f_i\}, i = \overline{1, k},$$

thì

$$\gcd(m, n) = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}, \quad \text{và} \quad \text{lcm}(m, n) = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k}.$$

**Ví dụ 4.34.** Cho  $m = 491\,891\,400 = 2^3 3^3 5^2 7^2 11^1 13^2$  và  $n = 1\,138\,845\,708 = 2^2 3^2 7^1 11^2 13^3 17^1$ . Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của  $m$  và  $n$ .

*Giải.* Viết lại  $m = 2^3 3^3 5^2 7^2 11^1 13^2 \underline{17^0}$  và  $n = 2^2 3^2 5^0 \underline{7^1} 11^2 13^3 17^1$ . Khi đó

$$\gcd(m, n) = 2^2 3^2 5^0 7^1 11^1 13^2 17^0 = 468\,468$$

$$\text{lcm}(m, n) = 2^3 3^3 5^2 7^2 11^2 13^3 17^1 = 1\,195\,787\,993\,400.$$

□

**Ví dụ 4.35.** Chứng minh tích của ba số nguyên dương liên tiếp không là số chính phương.

*Giải.* Giả sử ngược lại,  $\exists m, n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $m(m+1)(m+2) = n^2$ . Xét ước nguyên tố bất kỳ  $p$  của  $m+1$ . Vì  $\gcd(m, m+1) = 1 = \gcd(m+1, m+2)$ , nên  $p \nmid m$  và  $p \nmid (m+2)$ . Do đó, trong phân tích nguyên tố của  $m(m+1)(m+2) = n^2$  và  $m+1$ , lũy thừa của  $p$  bằng nhau. Nhưng  $n^2$  là số chính phương, nên theo định lý cơ bản của số học, lũy thừa đó của  $p$  là số chẵn. Vậy  $m+1$  là số chính phương, vì thế  $m(m+2)$  là số chính phương. Nhưng  $m^2 < m(m+2) = m^2 + 2m < (m+1)^2$ , nên  $m(m+2)$  không là số chính phương, mâu thuẫn! Do đó tích của ba số nguyên dương liên tiếp không là số chính phương. □

**Bài tập 4.5**

**4.65.** Viết các số nguyên sau thành tích các số nguyên tố  $p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$ , trong đó  $n_i > 0 \forall i = \overline{1, k}$  và  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ .

a) 148 500

b) 7 114 800

c) 7 882 875

**4.66.** Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của các cặp số nguyên trong 4.65.

**4.67.** Cho  $k \in \mathbb{Z}^+$  và  $p_1, p_2, \dots, p_k$  là các số nguyên tố phân biệt. Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$  có phân tích nguyên tố  $p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ , hãy tìm phân tích nguyên tố của (a)  $n^2$ , và (b)  $n^3$ .

**4.68.** Chứng minh  $\sqrt{p}$  là số vô tỷ với số nguyên tố  $p$  bất kỳ.

**4.69.** Tìm số ước dương của mỗi số nguyên trong 4.65.

**4.70.** a) Có bao nhiêu ước dương của  $n = 2^{14} 3^9 5^8 7^{10} 11^3 13^5 37^{10}$ ?

b) Trong các ước dương ở ý (a), có bao nhiêu số

i) chia hết cho  $2^3 3^4 5^7 11^2 37^2$ ?

v) lập phương?

ii) chia hết cho 1 166 400 000?

vi) lập phương là bội của  $2^{10} 3^9 5^2 7^5 11^2 13^2 37^2$ ?

iii) chính phương?

iv) chính phương và chia hết cho  $2^2 3^4 5^2 11^2$ ?

vii) vừa chính phương vừa lập phương?

**4.71.** Cho  $m, n \in \mathbb{Z}^+$  với  $mn = 2^4 3^4 5^3 7^1 11^3 13^1$  và  $\text{lcm}(m, n) = 2^2 3^3 5^2 7^1 11^2 13^1$ . Tìm  $\text{gcd}(m, n)$ .

**4.72.** Có bao nhiêu số nguyên dương  $n$  là ước của  $100\,137n + 248\,396\,544$ ?

**4.73.** Cho  $a \in \mathbb{Z}^+$ . Tìm  $a$  nhỏ nhất sao cho  $2a$  là số chính phương và  $3a$  là số lập phương?

**4.74.** a) Cho  $a \in \mathbb{Z}^+$ . Chứng minh hoặc bác bỏ

i) Nếu  $10 \mid a^2$  thì  $10 \mid a$ .ii) Nếu  $4 \mid a^2$  thì  $4 \mid a$ .

b) Tổng quát hóa các kết quả ở ý (a).

**4.75.** Cho  $a, b, c \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$  trong đó có ít nhất một số khác 0. Chứng minh số có sáu chữ số  $abcabc$  chia hết cho ít nhất ba số nguyên tố phân biệt.

**4.76.** Tìm số chính phương nhỏ nhất chia hết cho 7!

**4.77.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh  $n$  là số chính phương khi và chỉ khi  $n$  có một số lẻ các ước dương.

**4.78.** Tìm số nguyên dương nhỏ nhất  $n$  sao cho  $1260n$  là số lập phương.

**4.79.** a) Cho  $n = 88\,200$ . Có bao nhiêu cách phân tích  $n$  thành  $ab$  trong đó  $1 < a \leq b < n$  và  $\gcd(a, b) = 1$ .

b) Trả lời ý (a) với  $n = 970\,200$ .

c) Tổng quát hóa kết quả ở ý (a) và (b).

**4.80.** Khi nào số nguyên dương  $n$  có đúng

a) hai ước dương?

c) bốn ước dương?

b) ba ước dương?


d) năm ước dương?

**4.81.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Ta nói  $n$  là số *hoàn hảo* nếu  $2n$  bằng tổng các ước dương của  $n$ . Ví dụ, 6 là số hoàn hảo vì  $2 \cdot 6 = 1 + 2 + 3 + 6$ .

a) Chỉ ra 28 và 496 là các số hoàn hảo.

b) Nếu  $m \in \mathbb{Z}^+$  và  $2^m - 1$  nguyên tố, chứng minh  $2^{m-1}(2^m - 1)$  là số hoàn hảo. [dùng ý (e) trong 4.1]

## 4.6 Tóm tắt



## Bài tập bổ sung

**4.82.** Cho  $a, d \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Nêu công thức hiện của tổng  $a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (a + (n - 1)d)$ . Chứng minh công thức bằng phương pháp quy nạp.

**4.83.** Xét năm đẳng thức

- 1)  $1 = 1$
- 2)  $1 - 4 = -(1 + 2)$
- 3)  $1 - 4 + 9 = 1 + 2 + 3$
- 4)  $1 - 4 + 9 - 16 = -(1 + 2 + 3 + 4)$
- 5)  $1 - 4 + 9 - 16 + 25 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$

Hãy dự đoán và chứng minh công thức tổng quát.

**4.84.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh

a)  $5 \mid (n^5 - n)$

b)  $6 \mid (n^3 + 5n)$

**4.85.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , đặt  $S(n)$  là khẳng định mở:  $n^2 + n + 41$  nguyên tố.

a) Chỉ ra  $S(n)$  đúng  $\forall n = \overline{1, n}$ .

b) Với mọi  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $S(n)$  kéo theo  $S(n+1)$  có đúng không?

**4.86.** Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , định nghĩa tổng  $s_n$  bởi công thức

$$s_n = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \cdots + \frac{n-1}{n!} + \frac{n}{(n+1)!}$$

a) Tính  $s_n$ ,  $n = \overline{1, 6}$ .

b) Dự đoán công thức hiện của  $s_n$  và chứng minh công thức đó bằng quy nạp.

**4.87.** Với  $n \in \mathbb{N}$ , chứng minh

a)  $2^{2n+1} + 1$  chia hết cho 3.

b)  $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$  chia hết cho 9.

**4.88.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$  lẻ và không chia hết cho 5. Chứng minh có lũy thừa của  $n$  có chữ số đơn vị là 1.

**4.89.** Tìm các chữ số  $x, y, z$  để  $(xyz)_9 = (zyx)_6$ .

**4.90.** Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$ , có bao nhiêu giá trị có thể của  $\gcd(n, n+3000)$ ?

**4.91.** Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$  và  $n \geq 2$ , chứng minh  $2^n < \binom{2n}{n} < 4^n$ .

**4.92.** Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh 57 là ước của  $7^{n+2} + 8^{2n+1}$ .

**4.93.** Với mọi  $n \in \mathbb{Z}^+$ , chứng minh nếu  $n \geq 64$ , thì  $n$  có thể viết thành tổng của 5 và/hoặc 17.

**4.94.** Tìm tất cả  $a, b \in \mathbb{Z}$  sao cho  $\frac{a}{7} + \frac{b}{12} = \frac{1}{84}$ .

**4.95.** Với  $r \in \mathbb{Z}^+$ , ta viết  $r = r_0 + r_1 \cdot 10 + r_2 \cdot 10^2 + \cdots + r_n \cdot 10^n$ , trong đó  $0 \leq r_i \leq 9$  với  $i = \overline{0, n}$  và  $r_n \neq 0$ .

a) Chứng minh  $9 \mid r \Leftrightarrow 9 \mid (r_n + r_{n-1} + \cdots + r_2 + r_1 + r_0)$ .

b) Chứng minh  $3 \mid r \Leftrightarrow 3 \mid (r_n + r_{n-1} + \cdots + r_2 + r_1 + r_0)$ .

c) Nếu  $t = 137486x225$ , trong đó  $x$  là một chữ số, tìm các giá trị của  $x$  sao cho  $3 \mid t$ . Trong đó, các giá trị nào của  $x$  làm  $t$  chia hết cho 9?

- 4.96.** a) Có bao nhiêu số nguyên dương là tích của chín số nguyên tố trong các số 2, 3, 5, 7, 11 (có thể lặp và thứ tự không quan trọng).  
b) Có bao nhiêu số nguyên dương trong ý (a) chứa tất cả thừa số 2, 3, 4, 5, 11.

**4.97.** Tìm tích của các ước dương của (a) 1000; (b) 5000; (c) 7000; (d) 9000; (e)  $p^m q^n$ ; và (f)  $p^m q^n r^k$ , trong đó  $p, q, r$  là các số nguyên tố phân biệt và  $m, n, k \in \mathbb{Z}^+$ .

**4.98.** Cho  $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \subseteq \mathbb{Z}^+$ . Chứng minh  $A$  chứa tập con  $S \neq \emptyset$  có tổng các phần tử là bội của 5. (Ở đây tổng có thể có đúng một số hạng.)

**4.99.** Tìm các số nguyên  $n$  sao cho  $\frac{5n-4}{6}$  và  $\frac{7n+1}{4}$  đều là số nguyên.

**4.100.** Cho  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ .

- a) Chứng minh nếu  $a^2 \mid b^2$  thì  $a \mid b$ .  
b) Khẳng định nếu  $a^2 \mid b^3$  thì  $a \mid b$  có đúng không?

**4.101.** Cho  $n$  là số nguyên dương thỏa mãn tính chất:  $\forall a, b \in \mathbb{Z}^+, n \mid ab \Rightarrow n \mid a \vee n \mid b$ . Chứng minh  $n = 1$  hoặc  $n$  nguyên tố.

**4.102.** Giả sử  $a, b, k \in \mathbb{Z}^+$  và  $k$  không phải lũy thừa của 2.

- a) Chứng minh nếu  $a^k + b^k \neq 2$ , thì  $a^k + b^k$  là hợp số.  
b) Nếu  $n \in \mathbb{Z}^+$  và  $n$  không là lũy thừa của 2, chứng minh nếu  $2^n + 1$  nguyên tố, thì  $n$  nguyên tố.

**4.103.** Nhắc lại  $H_n, F_n$  và  $L_n$  tương ứng là số điều hòa, Fibonacci, và Lucas thứ  $n$ . Chứng minh  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

- a)  $H_{2^n} \leq 1 + n$   
b)  $F_n < \left(\frac{5}{3}\right)^n$   
c)  $L_0 + L_1 + L_2 + \cdots + L_n = \sum_{i=0}^n L_i = L_{n+2} - 1$

**4.104.** Cho  $n \in \mathbb{Z}^+$ ,  $u$  là chữ số đơn vị của  $n$ . Chứng minh  $7 \mid n \Leftrightarrow 7 \mid \left(\frac{n-u}{10} - 2u\right)$ .

**4.105.** Cho  $m, n \in \mathbb{Z}^+$  với  $19m + 90 + 8n = 1998$ . Tìm  $m, n$  sao cho

- a)  $n$  nhỏ nhất  
b)  $m$  nhỏ nhất

**4.106.** Chọn tùy ý ba số nguyên từ  $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$  và lập sáu số gồm ba chữ số này (cho phép chữ số 0 ở đầu). Chẳng hạn, nếu chọn 1, 3 và 7, ta lập được các số 137, 173, 317, 371, 713 và 731. Chứng minh sáu số lập được không đồng thời là số nguyên tố.



**4.107.** Bỏ đi một số nguyên trong các số  $1, 2, 3, \dots, n$ , thì trung bình của các số còn lại là hỗn số  $35\frac{7}{17}$ . Tìm  $n$  và số đã bỏ đi đó.

**4.108.** Chọn ngẫu nhiên một số nguyên từ 1 đến 100. Tính xác suất để số đó chia hết cho

a) 2 hoặc 3

b) 2, 3, hoặc 5

**4.109.** Cho  $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} p_3^{e_3} p_4^{e_4}$  và  $n = p_1^{f_1} p_2^{f_2} p_3^{f_3} p_5^{f_5}$ , trong đó  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$  là các số nguyên tố phân biệt, và  $e_1, e_2, e_3, e_4, f_1, f_2, f_3, f_5 \in \mathbb{Z}^+$ . Có bao nhiêu ước chung của  $m$  và  $n$ ?

# Tài liệu tham khảo

- [1] NumPy community. *NumPy User Guide*. phiên bản 1.22.4. 535 trang. URL: <https://numpy.org/doc/stable>.
- [2] Judi J. McDonald David C. Lay Steven R. Lay. *Linear Algebra and Its Applications*. phiên bản 6. Pearson, 2022. 755 trang.
- [3] Ralph P. Grimaldi. *Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction*. phiên bản 5. Pearson Addison-Wesley, 2004. 992 trang.
- [4] Ralph P. Grimaldi. *Discrete and Combinatorial Mathematics: Instructor's Solutions Manual*. phiên bản 5. Pearson Addison-Wesley, 2004. 465 trang.
- [5] Kenneth H. Rosen. *Discrete Mathematics and Its Applications*. phiên bản 8. McGraw-Hill Education, 2019. 1118 trang.
- [6] Edward R. Scheinerman. *Mathematics: A Discrete Introduction*. phiên bản 3. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2013. 506 trang.
- [7] Watson S. Stewart J. Clegg D. *Calculus: Early Transcendentals*. phiên bản 9. Cengage Learning, 2011. 1421 trang.
- [8] SymPy Development Team. *SymPy Documentation*. phiên bản 1.8. 2750 trang. URL: <https://github.com/sympy/sympy/releases>.

