

**Bài tập môn : Toán học tính toán, Toán kinh tế**

**Đối tượng : Lớp TH, IT, LGT**

**Công cụ tính : MATLAB, Mathematica, Python, Máy tính bỏ túi**

**Thời gian : 30 giờ**

① Giải các phương trình sau bằng **phương pháp Newton**: tìm nghiệm gần đúng và sai số tương ứng sau 3 bước lặp:

1.  $x^3 + 2x = 4, x \in [1, 3]$
2.  $x^3 + \sin x = 2, x \in [0, 2]$
3.  $xe^x = 5, x \in [1, 3]$
4.  $x(e^x + x) = 6, x \in [1, 2]$
5.  $2^x + \sqrt[3]{x^2 + 1} = 5, x \in [1, 5]$
6.  $x^2 = e^x + 2, x \in [-5, 0]$
7.  $x \ln x + 2^x = 5, x \in [1, 4]$
8.  $x^3 + \ln x = 3, x \in [1, 4]$

② Giải các phương trình sau bằng **phương pháp điểm bất động (lặp đơn)** với xấp xỉ ban đầu cho trước: tìm nghiệm gần đúng và sai số tương ứng sau 3 bước lặp:

9.  $x = \sqrt[5]{32 - x}, x \in [0, 10]$
10.  $x = \sqrt{2 - \sin x}, x \in [0, 2]$
11.  $x = \frac{x \sin x + \cos x}{2}, x \in [-1, 1]$
12.  $x = \frac{x^4 + \sin x - 1}{10}, x \in [-1, 1]$
13.  $x + \lg x = 2, x \in [1, 4]$
14.  $x^5 - x - 1 = 0, x \in [1, 3]$
15.  $x^2 - 10 \lg x - 3 = 0, x \in [2, 5]$
16.  $2x = e^{\sin x}, x \in [0, 3]$

③ Trình bày các phương pháp tìm đa thức nội suy của hàm số có giá trị cho trong bảng:

17. 

$x$	-2	1
$y$	8	-1
18. 

$x$	-1	1	2
$y$	7	-1	1
19. 

$x$	-3	-1	1	3
$y$	-16	2	4	-10
20. 

$x$	0	0.5	1	1.5	2
$y$	-1	0.125	1	2.375	5

④ Trình bày các phương pháp tìm đa thức nội suy của hàm số tại các mốc nội suy cho trước:

21.  $y = 2^x$  tại  $-1, 1, 3$
22.  $y = \sin x$  tại  $0, \frac{\pi}{2}, \pi$
23.  $y = \ln(x^2 + 1)$  tại  $0, 0.5, 1, 2$
24.  $y = \arctan x$  tại  $-1, 0, 1, 2, 3$

⑤ Cho hàm số  $f(x)$  dưới dạng bảng. Bằng công thức sai phân tiến, tính gần đúng  $f'(x)$  tại các giá trị  $x$  trong bảng:

25. 

$x$	0.5	0.6	0.7
$f(x)$	0.479	0.565	0.644
26. 

$x$	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x)$	9.03	11.02	13.46	16.44
27. 

$x$	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
$f(x)$	-1.71	-1.37	-1.12	-0.92	-0.75	-0.60

⑥ Cho hàm số  $f(x)$  dưới dạng bảng. Bằng công thức ba điểm, tính gần đúng  $f'(x)$  tại các giá trị  $x$  trong bảng:

28. 

$x$	0.0	0.2	0.4
$f(x)$	0.00	0.74	1.37
29. 

$x$	8.1	8.3	8.5	8.7
$f(x)$	16.94	17.56	18.19	18.82
30. 

$x$	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0
$f(x)$	9.37	8.23	7.18	6.21	5.32	4.51

⑦ Cho hàm số  $f(x)$  dưới dạng bảng. Bằng công thức ba điểm, tính gần đúng  $f''(x)$  tại các giá trị  $x$  trong bảng:

31. 

$x$	-0.3	-0.1	0.1
$f(x)$	1.95	2.04	2.06
32. 

$x$	2.9	3.0	3.1	3.2
$f(x)$	-4.83	-4.24	-3.50	-2.60
33. 

$x$	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
$f(x)$	-1.71	-1.37	-1.12	-0.92	-0.75	-0.60

- ⑧ Cho hàm số  $f(x)$  dưới dạng bảng. Dùng công thức hình thang và công thức Simpson, tính gần đúng  $\int_a^b f(x) dx$ :

34. 

$x$	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8
$f(x)$	1.00	0.98	0.92	0.83	0.70

,  $\int_0^{0.8} f(x) dx$

35. 

$x$	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$f(x)$	0.69	0.87	1.07	1.29	1.52	1.77	2.03	2.31	2.60

,  $\int_0^{0.8} f(x) dx$

36. 

$x$	$a = -0.5$	$-0.3$	$-0.1$	$0.1$	$0.3$	$0.5$	$0.7$	$0.9$	$1.1$	$1.3$	$1.5$	$1.7$	$1.9 = b$
$f(x)$	0.56	0.23	0.03	0.03	0.28	0.78	1.45	2.24	3.09	3.92	4.71	5.42	6.03

- ⑨ Bằng phương pháp hình thang, với số khoảng chia đều  $n$ , tính gần đúng các tích phân và đánh giá sai số:

37.  $\int_1^2 x \ln x dx$ ,  $n = 4$

38.  $\int_0^2 \frac{2}{x^2 + 4} dx$ ,  $n = 6$

39.  $\int_0^2 e^{2x} \sin 3x dx$ ,  $n = 8$

- ⑩ Bằng phương pháp Simpson, với số khoảng chia đều  $2n$ , tính gần đúng các tích phân và đánh giá sai số:

40.  $\int_{-0.5}^{0.5} \cos^2 x dx$ ,  $2n = 4$

41.  $\int_{-0.5}^{0.5} x \ln(x + 1) dx$ ,  $2n = 6$

42.  $\int_{0.75}^{1.75} (\sin^2 x - 2x \sin x + 1) dx$ ,  $2n = 8$

- ⑪ Giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu của phương trình vi phân bằng phương pháp Euler hiện:

43.  $y' = xe^{3x} - 2y$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $y(0) = 0$ ,  $h = 0.5$

44.  $y' = 1 + (x - y)^2$ ,  $2 \leq x \leq 3$ ,  $y(2) = 1$ ,  $h = 0.25$

45.  $y' = 1 + \frac{y}{t}$ ,  $1 \leq t \leq 2$ ,  $y(1) = 2$ ,  $h = 0.2$

- ⑫ Giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu của hệ phương trình vi phân cấp một bằng phương pháp Euler hiện:

46.  $\begin{cases} y' = 3y + 2z - (2x^2 + 1)e^{2x} \\ z' = 4y + z + (x^2 + 2x - 4)e^{2x} \end{cases}$ ,  $\begin{cases} y(0) = 1 \\ z(0) = 1 \end{cases}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $h = 0.2$

47.  $\begin{cases} y_1' = -4y_1 - 2y_2 + \cos x + 4 \sin x \\ y_2' = 3y_1 + y_2 - 3 \sin x \end{cases}$ ,  $\begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = -1 \end{cases}$ ,  $0 \leq x \leq 2$ ,  $h = 0.5$

48.  $\begin{cases} y' = z \\ z' = -y - 2e^t + 1 \\ u' = -y - e^t + 1 \end{cases}$ ,  $\begin{cases} y(0) = 1 \\ z(0) = 0 \\ u(0) = 1 \end{cases}$ ,  $0 \leq t \leq 2$ ,  $h = 0.4$

- ⑬ Giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu của phương trình vi phân cấp cao bằng phương pháp Euler hiện:

49.  $y'' - 2y' + y = xe^x - x$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ ,  $h = 0.5$

50.  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$ ,  $1 \leq x \leq 2$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y'(1) = 0$ ,  $h = 0.2$

51.  $y''' + 2y'' - y' - 2y = 2^t$ ,  $0 \leq t \leq 3$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 2$ ,  $y''(0) = 0$ ,  $h = 0.3$

- ⑭ Giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu của phương trình vi phân bằng phương pháp Runge–Kutta bậc bốn:

52.  $y' = e^{x-y}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $y(0) = 1$ ,  $h = 0.5$

53.  $y' = \frac{1+x}{1+y}$ ,  $1 \leq x \leq 2$ ,  $y(1) = 2$ ,  $h = 0.25$

54.  $y' = -y + t\sqrt{y}$ ,  $2 \leq t \leq 3$ ,  $y(2) = 2$ ,  $h = 0.2$

(15) Giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu của hệ phương trình vi phân cấp một bằng phương pháp Runge–Kutta bậc bốn:

55.  $\begin{cases} y' = y - z + 2 \\ z' = -y + z + 4x \end{cases}$ ,  $\begin{cases} y(0) = -1 \\ z(0) = 0 \end{cases}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $h = 0.2$

56.  $\begin{cases} y_1' = \frac{1}{9}y_1 - \frac{2}{3}y_2 - \frac{1}{9}x^2 + \frac{2}{3} \\ y_2' = y_2 + 3x - 4 \end{cases}$ ,  $\begin{cases} y_1(0) = -3 \\ y_2(0) = 5 \end{cases}$ ,  $0 \leq t \leq 2$ ,  $h = 0.5$

57.  $\begin{cases} y' = y + 2z - 2u + e^{-t} \\ z' = z + u - 2e^{-t} \\ u' = y + 2z + e^{-t} \end{cases}$ ,  $\begin{cases} y(0) = 3 \\ z(0) = -1 \\ u(0) = 1 \end{cases}$ ,  $0 \leq t \leq 1$ ,  $h = 0.1$

(16) Giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu của phương trình vi phân cấp cao bằng phương pháp Runge–Kutta bậc bốn:

58.  $y'' - 3y' + 2y = 6e^{-x}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $y(0) = y'(0) = 2$ ,  $h = 0.25$

59.  $x^2y'' + xy' - 4y = -3x$ ,  $1 \leq x \leq 3$ ,  $y(1) = 4$ ,  $y'(1) = 3$ ,  $h = 0.4$

60.  $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$ ,  $0 \leq t \leq 2$ ,  $y(0) = 3$ ,  $y'(0) = -1$ ,  $y''(0) = 9$ ,  $h = 0.3$

(17) Giải gần đúng hệ phương trình bằng phương pháp lặp điểm bất động (lặp đơn): tìm nghiệm gần đúng và sai số tương ứng sau  $k$  bước:

61.  $\begin{cases} x_1 = -0.04x_1 + 0.05x_2 + 3.17 \\ x_2 = -0.19x_1 + 0.14x_2 - 0.41 \end{cases}$ ,  $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ,  $k = 5$

62.  $\begin{cases} x_1 = 0.15x_1 - 0.11x_2 - 0.01x_3 + 3.54 \\ x_2 = -0.265x_1 + 0.1x_2 + 0.215x_3 - 1.16 \\ x_3 = 0.075x_1 - 0.185x_2 - 0.29x_3 + 3.74 \end{cases}$ ,  $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ,  $k = 4$

63.  $\begin{cases} x = 0.15x - 0.205y - 0.155z + 0.155t - 0.63 \\ y = -0.01x + 0.08y + 0.18t + 0.68 \\ z = 0.055x + 0.05z - 0.115t - 2.27 \\ t = -0.045x - 0.21y - 0.01z - 0.08t - 2.11 \end{cases}$ ,  $\begin{cases} x_0 = -4 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = -3 \\ t_0 = -1 \end{cases}$ ,  $k = 3$

(18) Giải gần đúng hệ phương trình theo công thức lặp Gauss–Seidel: tìm nghiệm gần đúng và đánh giá khoảng cách giữa hai nghiệm gần đúng liên tiếp sau  $k$  bước:

64.  $\begin{cases} x_1 = 0.28x_1 - 0.05x_2 - 1.7 \\ x_2 = 0.36x_1 - 0.26x_2 + 3.9 \end{cases}$ ,  $x^{(0)} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $k = 4$

65.  $\begin{cases} x = -0.295x - 0.215y + 0.21z + 4.76 \\ y = 0.255x + 0.13y - 0.01z + 3.16 \\ z = 0.055x + 0.1y - 0.095z + 3.52 \end{cases}$ ,  $\begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 4 \\ z_0 = 1 \end{cases}$ ,  $k = 3$

(19) Giải gần đúng hệ chéo trội bằng phương pháp lặp điểm bất động (lặp đơn): tìm nghiệm gần đúng sau 3 bước:

$$66. \begin{cases} 2x + 0.7y = -1.2 \\ 1.9x - 3.1y = 2.5 \end{cases}, \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = 0 \end{cases}, k = 5$$

$$67. \begin{cases} 6x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - 7x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 3 \end{cases}, x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, k = 4$$

$$68. \begin{cases} 7.2x_1 - x_2 + 1.2x_3 = 2 \\ x_1 + 12x_2 - x_3 + 3.2x_4 = -1 \\ -1.4x_1 - 2x_2 + 14x_3 + 2.1x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 17x_4 = 3 \end{cases}, x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, k = 2$$

(20) Giải gần đúng hệ chéo trội theo công thức lặp Gauss–Seidel: tìm nghiệm gần đúng sau 3 bước:

$$69. \begin{cases} 2.5x_1 + 0.9x_2 = 3.4 \\ x_1 + 2.8x_2 = -0.6 \end{cases}, x^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, k = 5$$

$$70. \begin{cases} 4.1x + y - z = 0 \\ 2x - 10y + 3z = -2 \\ 1.3x - 3y + 7z = 1.5 \end{cases}, \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 1 \\ z_0 = 0 \end{cases}, k = 3$$

(21) Tìm xấp xỉ của hàm số  $y = f(x)$  có giá trị cho trong bảng bởi không gian hàm có cơ sở cho trước và đánh giá sai số:

$$71. \begin{array}{c|ccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline y & 1 & 3.85 & 6.5 & 9.35 & 12.05 \end{array}, \text{bởi đa thức bậc nhất}$$

$$72. \begin{array}{c|cccc} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 7.5 & 2 & 4.5 & 14 \end{array}, \text{bởi đa thức bậc 2}$$

$$73. \begin{array}{c|ccccc} x & 1.1 & 1.3 & 1.6 & 1.8 & 2 \\ \hline y & 0.74 & 1.57 & 2.8 & 3.6 & 4.35 \end{array}, \{1, \cos x, \ln x\}$$

$$74. \begin{array}{c|cccccc} x & -1.2 & -0.9 & -0.6 & -0.3 & 0 & 0.3 & 0.6 \\ \hline y & 7 & 6.32 & 5.8 & 5.34 & 5.04 & 4.9 & 5.02 \end{array}, \{1, x, e^x\}$$

(22) Tìm xấp xỉ của hàm số  $y = f(x)$  bởi không gian hàm có cơ sở cho trước và đánh giá sai số:

$$75. y = e^{\sin x}, x \in [-1, 1], \text{bởi đa thức bậc nhất}$$

$$77. y = \sin x, x \in [0, 1], \{1, x, e^x\}$$

$$76. y = e^x, x \in [0, 2], \text{bởi đa thức bậc 2}$$

$$78. y = |1 - x|, x \in [0, 2], \{1, \cos x, \sin x\}$$

(23) Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng trên miền  $G$  với điều kiện biên  $u(x, y)|_{\partial G}$  và lưới  $(x_i, y_j)$  cho trước:

$$79. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, G = [0, 0.4] \times [0, 0.6], u(x, y)|_{\partial G} = x^2 y^2, x_i = 0.1i, y_j = 0.2j$$