

# Un modèle pour les nids d'oiseaux

CARVAILLO, CÔME, PRALON

Soutenance de projet de Master 1

3 juin 2022



# Introduction

## Introduction

Je bite dans vos culs, je bite dans vos bouches!!!



# Définition et hypothèses

## Loi de mélange

Si l'on se donne  $J$  densités  $f_1(x), \dots, f_J(x)$ , alors toute variable aléatoire  $X$  dont la densité  $f$  s'exprime, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , sous la forme

$$f(x) := \sum_{j=1}^J \alpha_j f_j(x)$$

où

$$\alpha_j \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } \sum_{j=1}^J \alpha_j = 1$$

suit une loi de mélange continue.



# Définition et hypothèses

## Une histoire de variables

Nous introduisons les deux variables aléatoires (V.A.) suivantes :

- la V.A.  $X$ , modélisant le volume des nids, de densité  $f$
- la V.A. discrète  $Z \in \llbracket 1, J \rrbracket$ , représentant l'espèce d'oiseau

## Hypothèse 1

$X$  conditionnellement à  $(Z = j)$  suit une loi normale  $\mathcal{N}(\mu_j, v_j)$

## Hypothèse 2

$$\exists \theta = (\alpha_j, \mu_j, v_j) \in \{\}$$

à voir



# Une histoire de densités

- Densité de la loi  $X$  conditionnellement à  $(Z = j)$  :

$$f(x|Z = j) = \gamma_{\mu_j, v_j}(x)$$

- Densité de la loi de  $X$  :

$$f_{\theta}(x) = \sum_{j=1}^J \alpha_j \gamma_{\mu_j, v_j}(x)$$

- Probabilité de la loi de  $Z$  conditionnellement à  $(X = x)$  :

$$\mathbb{P}_{\theta}(Z = j|X = x) = \frac{\gamma_{\mu_j, v_j} \times \alpha_j}{f_{\theta}(x)}$$



# Une approche idéaliste

- Nous observons le volume et l'espèce d'oiseau
- Log-vraisemblance du modèle :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\theta(X_1, \dots, X_n, Z_1, \dots, Z_n) \\&= \ln \left( \prod_{i=1}^n h_\theta(X_i, Z_i) \right) \\&= \sum_{j=1}^J \#A_j \ln(\alpha_j) + \sum_{j=1}^J \sum_{i \in A_j} \ln(\gamma_{\mu_j, \nu_j}(X_i))\end{aligned}$$

où

$$A_j := \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } Z_i = j\}$$



# Une approche idéaliste

## Estimateurs du maximum de vraisemblance (EMV)

$$\widehat{\alpha}_j = \frac{\#A_j}{n}$$

$$\widehat{\mu}_j = \frac{\sum_{i \in A_j} X_i}{\#A_j}$$

$$\widehat{v}_j = \frac{\sum_{i \in A_j} (X_i - \widehat{\mu}_j)^2}{\#A_j}$$



## Une approche réaliste

- Nous observons seulement le volume du nids
- Log-vraisemblance du modèle :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{obs}(\theta, X_1, \dots, X_n) \\ &= \ln \left( \prod_{i=1}^n f_{\theta}(X_i) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \ln \left( \sum_{j=1}^J \alpha_j \gamma_{\mu_j, v_j}(X_i) \right)\end{aligned}$$

- L'existence d'une expression analytique des EMV n'est pas assurée





# Log-vraisemblance conditionnelle

- texte
- Nous définissons ainsi la log-vraisemblance conditionnelle comme :

$$\mathcal{L}_c(\theta, \tilde{\theta}, X_1, \dots, X_n) = \mathbb{E}_{\tilde{\theta}}[\mathcal{L}_{\theta}(X_1, \dots, X_n, Z_1, \dots, Z_n) | X_1, \dots, X_n]$$



# L'algorithme EM

## Pseudo code de l'algorithme EM

---

**Algorithm 1** L'algorithme EM (Dempster et al., 1977).

---

**Entrée(s)** :  $\tilde{\theta}_0 \in \Theta$ , un jeu de données  $X_1 \cdots X_n$ ,  $K \in \mathbb{N}$ ;

1: **pour**  $k$  allant de 1 à  $K$  **faire**

2:   **ETAPE E** : Calculer la probabilité  $\mathbb{P}_{\tilde{\theta}_{k-1}}(Z = j | X = X_i) = \frac{\alpha_j \times \gamma_{\mu_j, j_v}}{\sum_{k=1}^J \alpha_k \times \gamma_{\mu_k, v_k}}$ ,  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

3:   **ETAPE M** : Calculer  $\tilde{\theta}_k = \underset{\theta = (\alpha_j, \mu_j, v_j)_{j \in \llbracket 1, J \rrbracket}}{\operatorname{argmax}} \mathbb{P}_{\tilde{\theta}_{k-1}}(Z = j | X = X_i)$ ;

4: **fin du pour**

5: **retourner**  $\tilde{\theta}_K$ ;

---



# Les étapes de l'algorithme EM

## L'étape E (Expectation)

Consiste à déterminer  $\mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i)$  à l'aide de la formule suivante :

$$\mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i) = \frac{\alpha_j \times \gamma_{\mu_j, v_j}}{\sum_{k=1}^J \alpha_k \times \gamma_{\mu_k, v_k}}$$

# Les étapes de l'algorithme EM

## L'étape M (Maximization)

Consiste à déterminer les EMV  $(\widehat{\alpha}_j, \widehat{\mu}_j, \widehat{\sigma}_j)$  de la log-vraisemblance conditionnelle via les formules suivantes :




$$\widehat{\alpha}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i)$$

$$\widehat{\mu}_j = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i)}$$




$$\widehat{\sigma}_j = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \widehat{\mu}_j)^2 \mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{\tilde{\theta}}(Z = j | X = X_i)}$$



# Cas des variables à "fortes séparations"




(a) Boxplot des erreurs  
pour  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$




(b) Boxplot des erreurs  
pour  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  et  $\mu_3$

# Cas des variables à "faibles séparations"



(c) Boxplot des erreurs  
pour  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$



(d) Boxplot des erreurs  
pour  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  et  $\mu_3$

# Préambule

	Female Body Mass (g)	Total mass of nest (g)	Cup diameter parallel to long axis (mm)	Cup diameter perpendicular to long axis (mm)	Nest diameter parallel to long axis (mm)	Nest diameter perpendicular to long axis (mm)	Upper wall thickness (mm)	Base Thickness (mm)	Cup depth (mm)	Nest Height (mm)	Volume (cm <sup>3</sup> )
<b>Fringillidae</b>											
European Goldfinch ( <i>Carduelis Carduelis</i> ) [10]	16.4	8.3 ± 2.4	62.8 ± 12.1	54.8 ± 7.4	91.4 ± 9.3	77.8 ± 7.9	12.8 ± 3.3	15.7 ± 4.3	26.0 ± 5.5	41.6 ± 7.4	38.0 ± 9.1
Common Linnet ( <i>Linaria cannabina</i> ) [11]	18.0	18.9 ± 5.4	74.7 ± 6.3	59.9 ± 8.6	107.9 ± 8.8	95.1 ± 10.2	16.9 ± 4.9	24.5 ± 8.9	30.6 ± 9.8	55.1 ± 9.2	60.9 ± 20.8
Common Chaffinch ( <i>Fringilla coelebs</i> ) [11]	21.5	14.5 ± 2.9	63.3 ± 8.1	50.8 ± 8.0	98.7 ± 10.9	90.3 ± 9.8	18.5 ± 3.6	23.6 ± 7.6	34.3 ± 7.8	58.0 ± 7.3	58.3 ± 15.0
European Greenfinch ( <i>Chloris chloris</i> ) [5]	25.9	22.4 ± 6.2	75.6 ± 7.8	53.9 ± 11.8	128.6 ± 13.7	99.7 ± 16.2	24.9 ± 7.9	29.4 ± 6.0	35.4 ± 5.7	64.9 ± 9.4	74.5 ± 12.2
Eurasian Bullfinch ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> ) [17]	27.3	12.1 ± 4.6	80.8 ± 12.1	66.4 ± 8.1	129.7 ± 23.4	117.5 ± 19.6	24.8 ± 10.9	24.2 ± 10.7	22.6 ± 4.5	46.8 ± 11.3	45.0 ± 3.8
Hawfinch ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ) [4]	52.9	27.4 ± 7.3	102.2 ± 17.9	78.8 ± 25.2	153.4 ± 19.1	131.3 ± 27.1	25.4 ± 5.9	23.3 ± 4.9	31.4 ± 10.9	54.7 ± 11.5	71.6 ± 12.9

Figure – Caractéristiques des nids

# Hypothèses, outils et démarche

## Hypothèses

- la distribution du volume des nids est gaussienne
- le nombre d'espèce  $J$  est connu

## Outils

- fonction *simulation*
- fonction *algo\_EM*

## Démarche

- Génération de l'échantillon
- Représentation graphique de la densité de l'échantillon
- Détermination des paramètres initiaux
- Execution de l'algorithme EM





# Première exploration des données




Figure – Densité du mélange

# Heuristique graphique




Figure – Détermination des valeurs initiales

# Heuristique graphique

## Paramètres initiaux

- $\mu_{1_{init}} = 40$  et  $\mu_{2_{init}} = 320$
- $\sigma_{1_{init}} = 80$  et  $\sigma_{2_{init}} = 140$
- $\alpha_{1_{init}} = 0.5$  et  $\alpha_{2_{init}} = 0.5$

## Résultats

	bird_names	alpha	mu	sigma
1	European Goldfinch	0.2910832	37.76285	9.512478
2	Ring Ouzel	0.7089168	302.51936	125.951894

## Valeurs théoriques

	bird_names2	proportion_alpha	mean_volume	sd_volume
1	European Goldfinch	0.2878713	38.0	9.1
12	Ring Ouzel	0.7121287	298.6	125.1



# Détermination automatique

Comme dans le rapport ou fonction de Nicolas ??



# Conclusion

## Conclusion

J'encule vos grosses marraines bien profond !!!

