

SEQUENCE D'EVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative :
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion
	Ville : ...	Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3

Séquence ¹ : CCF10 2^e année	Date : / / 20..	Note : ... / 10
Thématique/thème: Étude de la fonction de Gauss – Sondage		
Professeur responsable ...	Durée : 55 min	



Protocole de Secours

Protocole de secours 1 : Nom Prénom

On rappelle que la fonction de densité de la loi normale est donnée sur tableur par :

= LOI.NORMALE(X ; espérance μ ; écart type σ ; FAUX)

Ici, on fait varier X de -3 à 3 par pas de 0,2

Protocole de secours 2 : Nom Prénom

Rappel du cours ci-contre :

Donc l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est :

$$y = f'(1) (x - 1) + f(1)$$

$f'(1)$ est la valeur de la dérivée $f'(x)$ lorsque $x = 1$.


A. Nombre dérivé et tangente

Soit f une fonction représentée par sa courbe $\mathcal{C}_f$ et un point A de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a .

Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A .

• Si on connaît la fonction par sa courbe, pour lire $f'(a)$, nombre dérivé de f en a , on lit le coefficient directeur de la tangente T tracée en A .

• Si on connaît la fonction par son expression $f(x)$, on calcule $f'(x)$, où f' est la dérivée de f , et on calcule $f'(a)$ en remplaçant x par a .



Protocole de secours 3 : Nom Prénom

On doit résoudre l'équation $f(x) = 0,24$ c'est-à-dire $0,4 \boxed{e^{-0,5x^2}} = 0,24$

Pour cela on résout $0,4 \boxed{X} = 0,24$ en isolant X ,

puis on utilise le théorème du cours « l'équation $e^Y = k$ équivaut à $Y = \ln(k)$ »