

统计力学笔记

mny

2023 年 9 月 27 日

目录

第一章 统计方法	2
1.1 引言	2
1.2 统计法大意	2
1.2.1 力学规律与统计规律	2
1.3 量子初步	3
1.3.1 单粒子状态的量子描述	3
1.4 量子系统的状态	3
1.4.1 等几率假设	4
第二章 系综理论	5
2.0.1 系统微观状态的描述	5

第一章 统计方法

1.1 引言

热力学与统计物理: 研究大量微观粒子组成的体系的宏观性质 (平衡性质与非平衡性质).
热力学不考虑微观内部结构, 直接研究宏观量建立唯象理论.

统计理论等概率假设加上粒子性质得到宏观性质.

1.2 统计法大意

1.2.1 力学规律与统计规律

- 单粒子的力学规律: 决定性的. 量子力学的 Schrödinger 方程或经典力学的 Newton 方程.
- 宏观系统统计规律: 非决定论的, 几率性的. 可逆性与不可逆性.

二项分布

$$P_N(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!} p^n q^{N-n} \quad (1.2.1)$$

泊松分布, 是二项分布 $N \gg 1, p \ll 1$ 时的情况.

$$P_N(n) = \frac{\bar{n}^n}{n!} e^{-\bar{n}} \quad (1.2.2)$$

高斯分布, 当 $N \gg 1, p, q$ 相差不大时.

$$P_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(n-\bar{n})^2}{2\sigma^2}}, \quad \sigma^2 = Npq \quad (1.2.3)$$

高斯积分

1.3 量子初步

1.3.1 单粒子状态的量子描述

定态的波函数可以分离出时间项

$$\psi(\vec{x}, t) = \psi(\vec{x})e^{-iEt/\hbar} \quad (1.3.1)$$

满足定态薛定谔方程

$$\hat{H}\psi = E\psi. \quad (1.3.2)$$

例 1.3.1. 一维无限深方势阱.

$$\varepsilon_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}. \quad (1.3.3)$$

可以由驻波条件得到.

估算一下能级差, 对于经典系统, 取 $L \sim 10^{-2}m$, $m \sim 10^{-27}kg$, 可以计算得到 $\frac{h^2}{8mL^2} \sim 10^{-36}J \ll k_B T \sim 10^{-27}J$. 可见能量间距是非常小的.

例 1.3.2. 三维容器中的自由粒子.

$$\varepsilon_{n_1, n_2, n_3} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2). \quad (1.3.4)$$

例 1.3.3. 谐振子.

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (1.3.5)$$

例 1.3.4. 转子.

$$H = -\frac{\hbar}{2I} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \right] \quad (1.3.6)$$

能级

$$\varepsilon_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1), \quad (1.3.7)$$

简并度

$$\omega_l = 2l + 1 \quad (1.3.8)$$

磁量子数:

$$L_z = \hbar m \quad (1.3.9)$$

1.4 量子系统的状态

微观态: 按照量子态的占据来区分.

宏观态： 依据能量来区分.

1.4.1 等几率假设

Boltzmann 等几率假设： 处于平衡态的孤立系统，各可能微观状态出现的几率相等.

第二章 系综理论

2.0.1 系统微观状态的描述

经典

描述经典系统时, 使用广义坐标 q , 广义动量 p . 单粒子的相空间为 μ 空间, 例子的状态可以用 μ 空间的点来描述. 粒子自由度为 γ , 有 N 个粒子, 总共 $f = \gamma N$ 个自由度. 系统的相空间为 Γ 空间, Γ 空间的维数为 $2N\gamma$.

量子

使用力学量完全集 $\{L, M, \dots\}$ 的量子数 $\{l, m, \dots\}$ 来描述, 每微观态在 Γ 空间占据 h^f 的体积.