You are a data engineer generating SYNTHETIC training data for
fine-tuning a Vietnamese-language empathetic nutrition assistant
that operates on a defined food-function ontology.

TASK
Generate exactly 1000 training conversation samples in ChatML format.
Output ONE valid JSON object per line (JSONL). No markdown fences,
no preamble, no explanation, no trailing text

OUTPUT SCHEMA (mỗi dòng)
ID-001
{"messages":[{"role":"system","content":"..."},{"role":"user","content":"..."},{"role":"assistant","c
ontent":"..."}]}

ONTOLOGY REFERENCE — BẮT BUỘC TUÂN THỦ

MENTAL_STATE (LLM nhận diện từ câu user)
Short-term : Calm | Stressed | LowMood | Recovering | Energized
Long-term : Anxious | Depressed

HUMAN FUNCTIONS (target của tác động)
PSYCHOPHYSIOLOGICAL : mood_regulation | stress_response | sleep_regulation |
appetite_regulation
PHYSIOLOGICAL   : neurotransmission | hormone_secretion |digestion
NEUROBEHAVIORAL   : eating_behavior | physical_activity_behavior |
reward_seeking_behavior | impulsivity_control

ONTOLOGY_EFFECT (động từ quan hệ nhân quả)
STIMULATING : tăng cường hoạt động của một chức năng
REGULATING : đưa chức năng bị rối loạn về trạng thái cân bằng
INHIBITING : ngăn chặn hoặc kìm hãm một phản ứng thái quá
REDUCING   : hạ thấp mức độ của một tình trạng tiêu cực

FIELD RULES

system content — một dòng, đúng format:
"Context: {THỰC PHẨM} | Nutrient: {VI CHẤT} | ontology_effect: {EFFECT}:
{target_function} | Mental State: {MENTAL_STATE}."

Ví dụ hợp lệ:
"Context: Hạt bí | Nutrient: Magnesium | ontology_effect: INHIBITING: stress_response |
Mental State: Stressed."

Ràng buộc:

- {EFFECT} ∈ {STIMULATING, REGULATING, INHIBITING, REDUCING}
- {target_function} viết thường snake_case, phải nằm trong danh sách HUMAN FUNCTIONS ở trên
- {MENTAL_STATE} phải khớp với triệu chứng user mô tả
- Cặp (EFFECT, target_function) phải hợp logic:
  · INHIBITING chỉ dùng với phản ứng thái quá (stress_response, reward_seeking_behavior, impulsivity_control)
  · STIMULATING chỉ dùng khi cần tăng chức năng đang suy giảm
  · REGULATING dùng cho chức năng mất cân bằng hai chiều
  · REDUCING dùng cho tình trạng tiêu cực đo lường được

user content
- Tiếng Việt đời thường, ngôi thứ nhất, 15–45 từ.
- Mô tả triệu chứng đủ tín hiệu để suy ra đúng MENTAL_STATE trong system, nhưng KHÔNG gọi thẳng tên state.
- KHÔNG dùng thuật ngữ y khoa chuyên sâu.
- KHÔNG nhắc tên thuốc, KHÔNG nêu chẩn đoán đã có.

TONE — QUY TẮC GIAO TIẾP (bắt buộc, không phụ thuộc thái độ user)
Assistant LUÔN LUÔN giữ thái độ lịch sự, tử tế, tôn trọng — BẤT KỂ user dùng từ ngữ thô tục, nói trống không, mất kiên nhẫn, hay có thái độ gay gắt. Assistant KHÔNG BAO GIỜ:
  - Đáp trả bằng giọng điệu gay gắt, mỉa mai, hay thô tục tương tự
  - Từ chối giúp đỡ chỉ vì cách user nói chuyện
  - Nhắc nhở/phán xét về cách ăn nói của user (không nói kiểu "bạn đừng nói vậy", "xin bạn lịch sự hơn"...)
Thay vào đó, assistant giữ nguyên sự ấm áp, đi thẳng vào giúp đỡ như bình thường — như một người bạn kiên nhẫn, không để bụng.

Để mô hình học được hành vi này từ dữ liệu, MỘT PHẦN sample bắt buộc có user nói chuyện thô tục/trống không/mất kiên nhẫn (xem DIVERSITY REQUIREMENTS) — nếu không có ví dụ nào như vậy, mô hình không có dữ liệu để học cách xử lý tình huống này.

assistant content
Viết liền mạch thành đoạn văn (KHÔNG xuống dòng, KHÔNG đánh số, KHÔNG gạch đầu dòng), gồm 3 phần:

1. THẤU CẢM (1 câu): Ghi nhận trạng thái user. Đa dạng cách mở đầu giữa các sample — không lặp mẫu câu.
2. GỢI Ý (1 câu): Đề xuất thực phẩm dạng gợi ý, không ra lệnh.
3. GIẢI THÍCH + DẪN NGUỒN (1–2 câu): Nêu vi chất, diễn giải ontology_effect bằng NGÔN NGỮ ĐỜI THƯỜNG (không đọc thẳng mã "INHIBITING: stress_response")

Độ dài: 60–110 từ.

QUY TẮC RIÊNG — LONGER-TERM CONDITIONS

Nếu Mental State là Anxious hoặc Depressed:
- Assistant PHẢI có thêm 1 câu khuyến nghị gặp bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần.
- Lời khuyên dinh dưỡng phải được đóng khung là HỖ TRỢ THÊM, không phải giải pháp chính.
- Độ dài khi đó: 80–130 từ.

HARD CONSTRAINTS — vi phạm = sample bị loại

1. Thực phẩm, vi chất, nguồn trong assistant phải KHỚP CHÍNH XÁC với system content. Không bịa thêm vi chất khác.
2. Cơ chế nêu trong assistant phải phản ánh đúng ontology_effect và target_function đã khai báo.
3. TUYỆT ĐỐI KHÔNG: chẩn đoán bệnh, kê đơn, nhắc tên thuốc, hứa hẹn chữa khỏi. Không dùng từ "chữa", "điều trị", "khỏi bệnh".
4. KHÔNG khuyên ngừng thuốc hay thay thế điều trị y tế.
5. Nếu user mô tả dấu hiệu cấp cứu (đau ngực dữ dội, khó thở, ý định tự hại), assistant PHẢI hướng dẫn tìm hỗ trợ y tế ngay và KHÔNG chỉ đưa lời khuyên dinh dưỡng.
6. Tiếng Việt tự nhiên, không dịch máy. Chỉ giữ tiếng Anh cho tên vi chất và tên nguồn.
7. TUYỆT ĐỐI KHÔNG chèn HTML tags (`<b>`, `<br>`, `<p>`...), markdown formatting (`**bold**`, `_italic_`, `# heading`, gạch đầu dòng), hay bất kỳ markup nào vào bên trong giá trị của "content". Mọi field text phải là PLAIN TEXT thuần túy — không có ký tự `<`, `>`, `*`, `#`, `_` mang tính định dạng.
8. Assistant TUYỆT ĐỐI KHÔNG đáp trả thô tục, mỉa mai, hay lạnh lùng dù "user" content thô tục đến đâu. Giọng điệu assistant luôn nhất quán ấm áp, tôn trọng — không được phép "xuống tông" theo user.

DIVERSITY REQUIREMENTS (cho 1000 samples)

- 1000 cặp (thực phẩm, target_function) KHÁC NHAU hoàn toàn.

- Phân bổ MENTAL_STATE:
  Stressed : 6
  LowMood : 6
  Recovering : 4
  Calm : 3
  Energized : 3
  Anxious : 2 ← bắt buộc khuyến nghị đi khám
  Depressed : 1 ← bắt buộc khuyến nghị đi khám

- Phân bổ nhóm Function:
  PSYCHOPHYSIOLOGICAL : ~11
  PHYSIOLOGICAL : ~8

NEUROBEHAVIORAL : ~6

- Mỗi ONTOLOGY_EFFECT xuất hiện 5–8 lần.
- Xoay vòng đều 5 nguồn dẫn.
- Đa dạng nhóm thực phẩm: rau củ, hạt, cá, trái cây, ngũ cốc, đậu, thảo mộc, sản phẩm lên men.
- 300 trong số 1000 samples: "user" content nói chuyện thô tục, trống không, hoặc mất kiên nhẫn (câu cộc lốc, giọng gắt gỏng, từ ngữ thô do mệt mỏi/bực bội). CHỈ dùng thô tục thông thường — TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc/giới tính/tôn giáo hay ngôn từ thù ghét. Ở các sample này, "assistant" vẫn tuân thủ đầy đủ QUY TẮC GIAO TIẾP đã nêu ở trên.

OUTPUT
Chỉ trả về 1000 dòng JSONL thô — KHÔNG bọc trong ```json fences, KHÔNG có chữ nào trước hay sau khối JSONL. Mỗi dòng parse độc lập bằng json.loads(). Không có dòng trống giữa các sample.

Trước khi trả lời, tự kiểm tra từng dòng: nếu bất kỳ giá trị "content" nào chứa ký tự `<`, `>`, `**`, `##`, hoặc dấu `-`/`*` đứng đầu dòng (bullet), phải viết lại field đó thành văn xuôi thuần túy trước khi xuất ra.

sample:
ID-001{"messages":[{"role":"system","content":"Context: Hạt bí | Nutrient: Magnesium | ontology_effect: INHIBITING: stress_response | Mental State: Stressed."},{"role":"user","content":"Mình bị bồn chồn, tim đập nhanh quá, không thể tập trung làm gì được."},{"role":"assistant","content":"Có vẻ như cơ thể bạn đang rơi vào trạng thái căng thẳng rồi. Để làm dịu lại cảm giác bồn chồn này, bạn thử nhâm nhi một chút hạt bí xem sao nhé. Hạt bí rất giàu Magnesium, một vi chất tự nhiên giúp kìm hãm phản ứng căng thẳng đang hoạt động quá mức trong cơ thể, nhờ đó làm dịu hệ thần kinh và hạ nhịp tim hiệu quả."}]}

```
[
  {
    "food_item": "Rau mùi",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau mùi là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4081"
  },
  {
    "food_item": "Rau đay",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Rau đay là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Folate, Iron, Vitamin C. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4070"
  },
  {
    "food_item": "Cải xanh",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cải xanh là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4016"
  },
  {
    "food_item": "Rau mồng tơi",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Rau mồng tơi là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4080"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Rau giền cơm",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau giền cơm là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate, Iron, Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4072"
  },
  {
    "food_item": "Rau ngổ",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau ngổ là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4085"
  },
  {
    "food_item": "Cải cúc",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cải cúc là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4013"
  },
  {
    "food_item": "Rau mùi tàu",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau mùi tàu là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4082"
  },
  {
```

```
  "food_item": "Rau diếp",
  "key_nutrients": [
   "Thiamin",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau diếp là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4069"
 },
 {
  "food_item": "Dọc củ cải (non)",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Dọc củ cải (non) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4025"
 },
 {
  "food_item": "Ớt vàng to",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Thiamin",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Ớt vàng to là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron, Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4062"
 },
 {
  "food_item": "Rau kinh giới",
  "key_nutrients": [
   "Magnesium",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Rau kinh giới là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4077"
 },
 {
  "food_item": "Bầu dục bò",
  "key_nutrients": [
   "Folate",
```

```
      "Iron",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bầu dục bò là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Folate, Iron, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7029"
  },
  {
    "food_item": "Ớt đỏ to",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Ớt đỏ to là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4061"
  },
  {
    "food_item": "Măng chua",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Măng chua là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus), đồng thời cung cấp Magnesium. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4050"
  },
  {
    "food_item": "Súp lơ xanh",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Súp lơ xanh là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4100"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Rau húng",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau húng là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4075"
 },
 {
  "food_item": "Thìa là",
  "key_nutrients": [
   "Folate",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Thìa là là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4101"
 },
 {
  "food_item": "Trai",
  "key_nutrients": [
   "Selenium",
   "Vitamin B12"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Trai là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8054"
 },
 {
  "food_item": "Ớt xanh to",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Ớt xanh to là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4063"
 },
 {
  "food_item": "Sò",
  "key_nutrients": [
   "Selenium",
   "Vitamin B12",
```

```
      "Zinc",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Sò là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Vitamin B12, Long-chain Omega-3. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8048"
  },
  {
    "food_item": "Gan bò",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Vitamin C",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gan bò là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Selenium, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7039"
  },
  {
    "food_item": "Gan gà",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gan gà là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Selenium, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7040"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Ghẹ",
  "key_nutrients": [
   "Selenium",
   "Vitamin B12",
   "Zinc",
   "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Ghẹ là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Vitamin B12, Long-chain Omega-3. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8035"
 },
 {
  "food_item": "Cải thìa (cải trắng)",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Cải thìa (cải trắng) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4015"
 },
 {
  "food_item": "Gan lợn",
  "key_nutrients": [
   "Folate",
   "Iron",
   "Selenium",
   "Thiamin",
   "Vitamin A",
   "Vitamin B6",
   "Vitamin B12",
   "Vitamin C",
   "Zinc",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Gan lợn là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Selenium, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7041"
 },
 {
  "food_item": "Nho ta (nho chua)",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
```

```
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Nho ta (nho chua) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5038"
 },
 {
  "food_item": "Rau thơm",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau thơm là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4094"
 },
 {
  "food_item": "Hoa chuối",
  "key_nutrients": [
   "Thiamin"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Hoa chuối là nguồn cung cấp Thiamin. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4043"
 },
 {
  "food_item": "Rau ngót",
  "key_nutrients": [
   "Magnesium",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Rau ngót là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4086"
 },
 {
  "food_item": "Cải soong",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Cải soong là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4014"
 },
```

```
 {
  "food_item": "Rau muống",
  "key_nutrients": [
   "Folate",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau muống là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4083"
 },
 {
  "food_item": "Rau giền đỏ",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Magnesium",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Rau giền đỏ là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Iron, Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4073"
 },
 {
  "food_item": "Măng tây",
  "key_nutrients": [
   "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 13.33%)"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Măng tây có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4052"
 },
 {
  "food_item": "Bầu dục lợn",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Selenium",
   "Thiamin",
   "Vitamin B6",
   "Vitamin B12",
   "Zinc",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Bầu dục lợn là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Selenium, Thiamin, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7030"
  },
  {
    "food_item": "Súp lơ trắng",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Súp lơ trắng là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4099"
  },
  {
    "food_item": "Gan vịt",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gan vịt là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Selenium, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7042"
  },
  {
    "food_item": "Mướp đắng",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Mướp đắng là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4055"
  },
  {
    "food_item": "Chanh",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Chanh là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5003"
  },
  {
    "food_item": "Lòng gà (cả bộ)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Lòng gà (cả bộ) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Selenium, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7082"
  },
  {
    "food_item": "Rau khoai lang",
    "key_nutrients": [
      "Folate"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Rau khoai lang là nguồn cung cấp Folate. Folate có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, rõ nhất khi dùng bổ trợ cùng điều trị khác.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4076"
  },
  {
    "food_item": "Cà chua",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cà chua là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4005"
  },
  {
    "food_item": "Tiết lợn sống",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Tiết lợn sống là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7060"
  },
  {
    "food_item": "Hẹ lá",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Hẹ lá là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4042"
  },
  {
    "food_item": "Hành lá (hành hoa)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Hành lá (hành hoa) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4038"
  },
  {
    "food_item": "Rau bí",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 12.22%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau bí có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 12.22% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4066"
  },
  {
    "food_item": "Bưởi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Bưởi là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5001"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Cần tây",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Cần tây là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4018"
 },
 {
  "food_item": "Nước mắm cá",
  "key_nutrients": [
   "Magnesium",
   "Vitamin B6",
   "Vitamin B12",
   "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
  "content_text": "Nước mắm cá là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus, đồng thời cung cấp Magnesium, Vitamin B6, Vitamin B12. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13017"
 },
 {
  "food_item": "Rau má, má mơ",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau má, má mơ là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4079"
 },
 {
  "food_item": "Măng tre",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin B6 (dưới ngưỡng 20% DV - 14.12%)"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Măng tre có chứa Vitamin B6 ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 14.12% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4053"
 },
 {
```

```
  "food_item": "Ổi",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C",
   "Zinc"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Ổi là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin C. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5040"
 },
 {
  "food_item": "Rau giấp cá, diếp cá",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau giấp cá, diếp cá là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4071"
 },
 {
  "food_item": "Củ cải trắng",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Củ cải trắng là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4021"
 },
 {
  "food_item": "Khế",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Khế là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4045"
 },
 {
  "food_item": "Hoa lý",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Hoa lý là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4044"
  },
  {
    "food_item": "Rau răm",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau răm là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng
REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4088"
  },
  {
    "food_item": "Xương sông",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Xương sông là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING,
thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4107"
  },
  {
    "food_item": "Đu đủ xanh",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Đu đủ xanh là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng
REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4033"
  },
  {
    "food_item": "Nhút (muối từ mít non, ngọn đậu xanh non...)",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Nhút (muối từ mít non, ngọn đậu xanh non...) là thực phẩm lên men nhờ
vi khuẩn lactic, đồng thời cung cấp Iron. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING,
giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục
ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4118"
  },
  {
    "food_item": "Lá mơ lông",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Lá mơ lông là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4048"
  },
  {
    "food_item": "Mực tươi",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Mực tươi là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8040"
  },
  {
    "food_item": "Rau sà lách",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 16.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau sà lách có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 16.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4090"
  },
  {
    "food_item": "Phổi bò",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Vitamin C",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Phổi bò là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Iron, Vitamin B12, Vitamin C, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7051"
  },
  {
```

```
    "food_item": "Tía tô",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Tía tô là nguồn cung cấp Magnesium. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4102"
  },
  {
    "food_item": "Tim bò",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Tim bò là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Iron, Thiamin, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7055"
  },
  {
    "food_item": "Cải bắp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cải bắp là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4010"
  },
  {
    "food_item": "Gioi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Gioi là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5018"
  },
  {
    "food_item": "Cần ta",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 16.67%)"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Cần ta có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 16.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4017"
  },
  {
    "food_item": "Đu đủ chín",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Đu đủ chín là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5017"
  },
  {
    "food_item": "Tim lợn",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Tim lợn là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Thiamin, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7057"
  },
  {
    "food_item": "Cá hồi",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá hồi là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8011"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Tôm biển",
  "key_nutrients": [
   "Selenium",
   "Vitamin B12",
   "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Tôm biển là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8051"
 },
 {
  "food_item": "Su su, quả",
  "key_nutrients": [
   "Folate"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Su su, quả là nguồn cung cấp Folate. Folate có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, rõ nhất khi dùng bổ trợ cùng điều trị khác.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4098"
 },
 {
  "food_item": "Tiết lợn luộc",
  "key_nutrients": [
   "Iron"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
  "content_text": "Tiết lợn luộc là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7059"
 },
 {
  "food_item": "Lá lốt",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Magnesium",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Lá lốt là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Iron, Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4046"
 },
 {
  "food_item": "Óc bò",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Óc bò là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7049"
  },
  {
    "food_item": "Phổi lợn",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Phổi lợn là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Iron, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7052"
  },
  {
    "food_item": "Cá nục",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá nục là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8020"
  },
  {
    "food_item": "Cá mòi",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Cá mòi là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8015"
  },
  {
    "food_item": "Bầu",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 13.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Bầu có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4001"
  },
  {
    "food_item": "Tim gà",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Tim gà là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7056"
  },
  {
    "food_item": "Cải bắp đỏ",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cải bắp đỏ là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4011"
  },
  {
    "food_item": "Cá ngừ",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
```

```
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá ngừ là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8019"
  },
  {
    "food_item": "Rau câu tươi",
    "key_nutrients": [
      "Folate"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Rau câu tươi là nguồn cung cấp Folate. Folate có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, rõ nhất khi dùng bổ trợ cùng điều trị khác.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4068"
  },
  {
    "food_item": "Quả kiwi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Quả kiwi là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5056"
  },
  {
    "food_item": "Thịt hươu",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt hươu là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Thiamin, Vitamin B12. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7015"
  },
  {
    "food_item": "Su hào",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Su hào là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4096"
  },
  {
    "food_item": "Quất chín (cả vỏ)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Quất chín (cả vỏ) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5046"
  },
  {
    "food_item": "Rau sam",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau sam là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4091"
  },
  {
    "food_item": "Quít",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Quít là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5047"
  },
  {
    "food_item": "Cá thu đao",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá thu đao là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8027"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Nấm thường tươi",
  "key_nutrients": [
   "Thiamin"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Nấm thường tươi là nguồn cung cấp Thiamin. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4126"
 },
 {
  "food_item": "Bí đao (bí xanh)",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 17.78%)"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Bí đao (bí xanh) có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 17.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4002"
 },
 {
  "food_item": "Rau sắng (chùa Hương)",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau sắng (chùa Hương) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4092"
 },
 {
  "food_item": "Thịt bê nạc",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin B6",
   "Vitamin B12",
   "Zinc",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Thịt bê nạc là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7002"
 },
 {
  "food_item": "Trứng cá muối",
  "key_nutrients": [
```

```
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trứng cá muối là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Iron, Selenium, Vitamin A, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9009"
  },
  {
    "food_item": "Cá trích",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá trích là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8031"
  },
  {
    "food_item": "Cá chép",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá chép là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin A, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8003"
  },
  {
    "food_item": "Gừng tươi",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 13.89%)"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Gừng tươi có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13003"
  },
  {
    "food_item": "Dâu Tây",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dâu Tây là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5009"
  },
  {
    "food_item": "Tỏi ta",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Tỏi ta là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Thiamin, Vitamin B6. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4103"
  },
  {
    "food_item": "Óc lợn",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Óc lợn là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7050"
  },
  {
    "food_item": "Cam",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
```

```
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cam là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5002"
  },
  {
    "food_item": "Mề gà",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Mề gà là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Selenium, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7048"
  },
  {
    "food_item": "Dưa hấu",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 7.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dưa hấu có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 7.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5011"
  },
  {
    "food_item": "Dưa hồng",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 7.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dưa hồng có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 7.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5012"
  },
  {
    "food_item": "Rau câu khô",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
```

```
      "Potassium",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Rau câu khô là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Potassium. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4067"
  },
  {
    "food_item": "Nấm mỡ (nấm Tây)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Nấm mỡ (nấm Tây) là nguồn cung cấp Selenium. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4124"
  },
  {
    "food_item": "Tương ớt",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Tương ớt là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13021"
  },
  {
    "food_item": "Dưa chuột",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 5.56%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dưa chuột có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 5.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4027"
  },
  {
    "food_item": "Đậu Hà Lan",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Đậu Hà Lan là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4031"
  },
  {
    "food_item": "Lá sắn tươi",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin C",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Lá sắn tươi là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin, Tryptophan. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4049"
  },
  {
    "food_item": "Hành củ tươi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 11.11%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Hành củ tươi có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.11% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4037"
  },
  {
    "food_item": "Cà pháo",
    "key_nutrients": [
      "Selenium (dưới ngưỡng 20% DV - 12.18%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cà pháo có chứa Selenium ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 12.18% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4006"
  },
  {
    "food_item": "Rau giền trắng",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau giền trắng là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4074"
  },
  {
    "food_item": "Mướp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 8.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Mướp có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 8.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4054"
  },
  {
    "food_item": "Nhãn",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Nhãn là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5035"
  },
  {
    "food_item": "Dứa ta",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dứa ta là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5014"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bò, lưng, nạc",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt bò, lưng, nạc là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7005"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Thịt lợn nạc",
  "key_nutrients": [
   "Selenium",
   "Thiamin",
   "Vitamin B6",
   "Vitamin B12",
   "Zinc",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Thịt lợn nạc là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Thiamin, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7017"
 },
 {
  "food_item": "Giá đậu tương",
  "key_nutrients": [
   "Folate"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Giá đậu tương là nguồn cung cấp Folate. Folate có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, rõ nhất khi dùng bổ trợ cùng điều trị khác.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4035"
 },
 {
  "food_item": "Cá đối",
  "key_nutrients": [
   "Selenium",
   "Vitamin B6",
   "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Cá đối là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8009"
 },
 {
  "food_item": "Đậu đũa",
  "key_nutrients": [
   "Thiamin",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Đậu đũa là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4030"
  },
  {
    "food_item": "Trứng vịt",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trứng vịt là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Folate, Vitamin A, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9004"
  },
  {
    "food_item": "Giá đậu xanh",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 16.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Giá đậu xanh có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 16.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4036"
  },
  {
    "food_item": "Trứng gà",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trứng gà là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin A, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9001"
  },
  {
    "food_item": "Lươn",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A",
```

```
      "Vitamin B12"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Lươn là nguồn cung cấp Vitamin B12, cùng với Vitamin A. Vitamin B12 có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, liên quan triệu chứng trầm cảm/nhận thức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8038"
  },
  {
    "food_item": "Sữa đậu nành (100g đậu/lít)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium (dưới ngưỡng 20% DV - 8.73%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Sữa đậu nành (100g đậu/lít) có chứa Selenium ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 8.73% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3032"
  },
  {
    "food_item": "Tiết bò",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Tiết bò là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7058"
  },
  {
    "food_item": "Tôm đồng",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Tôm đồng là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8052"
  },
  {
    "food_item": "Dưa bở",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 10.0%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Dưa bở có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.0% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5010"
  },
  {
    "food_item": "Dứa Tây",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dứa Tây là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5015"
  },
  {
    "food_item": "Trứng chim cút",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trứng chim cút là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Iron, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9007"
  },
  {
    "food_item": "Mộc nhĩ",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Mộc nhĩ là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Selenium, Vitamin B6. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4121"
  },
  {
    "food_item": "Hành tây",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Zinc (dưới ngưỡng 20% DV - 13.0%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hành tây có chứa Zinc ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.0% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4039"
  },
  {
    "food_item": "Củ cải trắng khô",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Củ cải trắng khô là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Iron, Potassium, Thiamin, Vitamin B6. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4022"
  },
  {
    "food_item": "Dưa cải bắp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C",
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Dưa cải bắp là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum), đồng thời cung cấp Vitamin C. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4111"
  },
  {
    "food_item": "Thịt thỏ nhà",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Thịt thỏ nhà là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7021"
  },
  {
    "food_item": "Vải",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Vải là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5052"
  },
  {
    "food_item": "Dưa cải bẹ",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Dưa cải bẹ là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4112"
  },
  {
    "food_item": "Tỏi Tây (cả lá)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Tỏi Tây (cả lá) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4104"
  },
  {
    "food_item": "Cà bát",
    "key_nutrients": [
      "Folate (dưới ngưỡng 20% DV - 5.5%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Cà bát có chứa Folate ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 5.5% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Folate có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, rõ nhất khi dùng bổ trợ cùng điều trị khác.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4004"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Nghệ khô, bột",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin C",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Nghệ khô, bột là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Potassium, Vitamin B6, Vitamin C. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13006"
  },
  {
    "food_item": "Ngó sen",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Ngó sen là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4059"
  },
  {
    "food_item": "Bí ngô",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 8.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Bí ngô có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 8.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4003"
  },
  {
    "food_item": "Cà rốt (củ đỏ, vàng)",
    "key_nutrients": [
      "Zinc (dưới ngưỡng 20% DV - 10.09%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cà rốt (củ đỏ, vàng) có chứa Zinc ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.09% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4007"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Hồng đỏ",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 17.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Hồng đỏ có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 17.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5020"
  },
  {
    "food_item": "Nước dứa hộp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Nước dứa hộp là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11013"
  },
  {
    "food_item": "Thịt ngựa",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt ngựa là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7020"
  },
  {
    "food_item": "Ngô bao tử",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Ngô bao tử là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4058"
  },
  {
    "food_item": "Dạ dày lợn",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Selenium"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Dạ dày lợn là nguồn cung cấp Selenium. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7034"
  },
  {
    "food_item": "Na",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Na là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5034"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bò, lưng, nạc và mỡ",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt bò, lưng, nạc và mỡ là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7006"
  },
  {
    "food_item": "Lưỡi bò",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Lưỡi bò là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7044"
  },
  {
    "food_item": "Củ cải",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Củ cải là nguồn cung cấp Zinc. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2002"
  },
  {
    "food_item": "Táo ta",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Táo ta là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5050"
  },
  {
    "food_item": "Cá trê",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá trê là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8030"
  },
  {
    "food_item": "Lòng đỏ trứng gà",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Lòng đỏ trứng gà là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Selenium, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9002"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bê mỡ",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt bê mỡ là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7001"
  },
  {
    "food_item": "Thịt dê, nạc",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt dê, nạc là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7011"
  },
  {
    "food_item": "Dạ dày bò",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Dạ dày bò là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7033"
  },
  {
    "food_item": "Bột đậu tương đã loại béo (đậu nành)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
```

```
      "Potassium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột đậu tương đã loại béo (đậu nành) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3021"
  },
  {
    "food_item": "Dưa chuột muối",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Dưa chuột muối là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4114"
  },
  {
    "food_item": "Chuối xanh",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Chuối xanh là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Vitamin C. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4019"
  },
  {
    "food_item": "Lưỡi lợn",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Lưỡi lợn là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7045"
  },
  {
    "food_item": "Muỗm, quéo",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Muỗm, quéo là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng
REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5033"
  },
  {
    "food_item": "Ếch (thịt đùi)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Ếch (thịt đùi) là nguồn cung cấp Selenium. Selenium có tác dụng
INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7080"
  },
  {
    "food_item": "Đậu rồng (quả non)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Đậu rồng (quả non) là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng
REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4032"
  },
  {
    "food_item": "Măng cầu xiêm",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Măng cầu xiêm là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng
REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5025"
  },
  {
    "food_item": "Quả me chua",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 13.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Quả me chua có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào
(khoảng 13.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng
REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4065"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Gừng khô (bột)",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gừng khô (bột) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Potassium, Selenium, Vitamin B6. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13002"
  },
  {
    "food_item": "Chuối Tây",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Chuối Tây là nguồn cung cấp Vitamin B6. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5006"
  },
  {
    "food_item": "Cà tím",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 16.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cà tím có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 16.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4009"
  },
  {
    "food_item": "Kiệu muối",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Kiệu muối là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4117"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Xoài chín",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Xoài chín là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5055"
  },
  {
    "food_item": "Dưa chuột hộp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 2.22%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dưa chuột hộp có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 2.22% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11002"
  },
  {
    "food_item": "Khoai lang",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Khoai lang là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2008"
  },
  {
    "food_item": "Đậu cô ve",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Đậu cô ve là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4029"
  },
  {
    "food_item": "Mít dai",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Magnesium (dưới ngưỡng 20% DV - 8.81%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Mít dai có chứa Magnesium ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 8.81% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5028"
  },
  {
    "food_item": "Mận",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 5.0%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Mận có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 5.0% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5027"
  },
  {
    "food_item": "Sườn lợn",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Sườn lợn là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Thiamin, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7053"
  },
  {
    "food_item": "Men bia tươi",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Tryptophan",
      "Vi sinh vật lên men: nấm men Saccharomyces cerevisiae"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Men bia tươi là thực phẩm lên men nhờ nấm men Saccharomyces cerevisiae, đồng thời cung cấp Iron, Thiamin, Tryptophan. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4120"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Thịt trâu",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin B6",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Thịt trâu là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Tryptophan. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7023"
 },
 {
  "food_item": "Đậu xanh (đậu tắt)",
  "key_nutrients": [
   "Folate",
   "Iron",
   "Magnesium",
   "Potassium",
   "Thiamin",
   "Vitamin B6",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
  "content_text": "Đậu xanh (đậu tắt) là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Iron, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3010"
 },
 {
  "food_item": "Rau má rừng",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Rau má rừng là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4078"
 },
 {
  "food_item": "Sữa bột tách béo",
  "key_nutrients": [
   "Magnesium",
   "Potassium",
   "Selenium",
   "Thiamin",
   "Vitamin B6",
   "Vitamin B12",
   "Zinc",
```

```
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Sữa bột tách béo là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Magnesium, Potassium, Selenium, Thiamin, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10007"
  },
  {
    "food_item": "Dưa gang",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 4.44%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Dưa gang có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 4.44% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4028"
  },
  {
    "food_item": "Sầu riêng",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Sầu riêng là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5048"
  },
  {
    "food_item": "Hồng bì",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Hồng bì là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5019"
  },
  {
    "food_item": "Đậu tương (đậu nành)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Thiamin",
```

```
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Đậu tương (đậu nành) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3007"
  },
  {
    "food_item": "Xì dầu",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 10.72%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Xì dầu có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.72% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13022"
  },
  {
    "food_item": "Bột đậu xanh",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột đậu xanh là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3023"
  },
  {
    "food_item": "Magi",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Magi là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13010"
  },
```

```
 {
   "food_item": "Đào",
   "key_nutrients": [
     "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 11.11%)"
   ],
   "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
   "content_text": "Đào có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.11% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5016"
 },
 {
   "food_item": "Mơ",
   "key_nutrients": [
     "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 11.67%)"
   ],
   "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
   "content_text": "Mơ có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5031"
 },
 {
   "food_item": "Nghệ tươi",
   "key_nutrients": [
     "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 4.44%)"
   ],
   "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
   "content_text": "Nghệ tươi có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 4.44% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13007"
 },
 {
   "food_item": "Bột ca cao",
   "key_nutrients": [
     "Iron",
     "Magnesium",
     "Potassium",
     "Selenium",
     "Zinc",
     "Tryptophan"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Bột ca cao là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Potassium, Selenium, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_12012"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Đậu Hà Lan (hạt)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Đậu Hà Lan (hạt) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Thiamin, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3006"
  },
  {
    "food_item": "Hồng xiêm",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 12.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Hồng xiêm có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 12.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5022"
  },
  {
    "food_item": "Thịt gà Tây",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt gà Tây là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Vitamin A, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7014"
  },
  {
    "food_item": "Nấm hương tươi",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Nấm hương tươi là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4123"
  },
  {
    "food_item": "Hạt sen khô",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt sen khô là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Iron, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4041"
  },
  {
    "food_item": "Thịt lợn nửa nạc, nửa mỡ",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt lợn nửa nạc, nửa mỡ là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Thiamin, Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7018"
  },
  {
    "food_item": "Trứng vịt lộn",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Trứng vịt lộn là nguồn cung cấp Vitamin A. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9010"
  },
  {
```

```
  "food_item": "Cá thu",
  "key_nutrients": [
    "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
    "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Cá thu là nguồn cung cấp Long-chain Omega-3, cùng với Tryptophan. Long-chain Omega-3 có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ giảm triệu chứng trầm cảm.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8026"
 },
 {
  "food_item": "Sữa chua vớt béo",
  "key_nutrients": [
    "Vitamin B12",
    "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
  "content_text": "Sữa chua vớt béo là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus), đồng thời cung cấp Vitamin B12. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10005"
 },
 {
  "food_item": "Sữa chua (từ sữa bò)",
  "key_nutrients": [
    "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
  "content_text": "Sữa chua (từ sữa bò) là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10004"
 },
 {
  "food_item": "Hồng ngâm",
  "key_nutrients": [
    "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 17.78%)"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Hồng ngâm có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 17.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5021"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Táo Tây",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 13.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Táo Tây có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5051"
  },
  {
    "food_item": "Vừng (đen, trắng)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Vừng (đen, trắng) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3020"
  },
  {
    "food_item": "Ngải cứu",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 17.22%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Ngải cứu có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 17.22% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4057"
  },
  {
    "food_item": "Dứa hộp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 15.56%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
```

```
   "content_text": "Dứa hộp có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 15.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11003"
  },
  {
   "food_item": "Khoai tây",
   "key_nutrients": [
    "Vitamin B6 (dưới ngưỡng 20% DV - 11.94%)"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Khoai tây có chứa Vitamin B6 ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.94% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2014"
  },
  {
   "food_item": "Cà muối nén",
   "key_nutrients": [
    "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum)"
   ],
   "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
   "content_text": "Cà muối nén là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4109"
  },
  {
   "food_item": "Vải khô",
   "key_nutrients": [
    "Iron",
    "Potassium",
    "Vitamin C"
   ],
   "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
   "content_text": "Vải khô là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron, Potassium. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
   "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5053"
  },
  {
   "food_item": "Củ cải đỏ",
   "key_nutrients": [
    "Vitamin C"
   ],
   "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Củ cải đỏ là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4020"
  },
  {
    "food_item": "Chân giò lợn",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Chân giò lợn là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7032"
  },
  {
    "food_item": "Khoai lang khô",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Khoai lang khô là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Selenium, Vitamin B6. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2022"
  },
  {
    "food_item": "Kê",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Kê là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Thiamin, Vitamin B6. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1006"
  },
  {
    "food_item": "Đậu đũa (hạt)",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Folate",
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Đậu đũa (hạt) là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Folate, Iron, Thiamin, Tryptophan. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3005"
  },
  {
    "food_item": "Trám xanh sống, trám trắng",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Trám xanh sống, trám trắng là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4106"
  },
  {
    "food_item": "Thịt gà ta",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt gà ta là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7013"
  },
  {
    "food_item": "Trứng cá",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Trứng cá là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Thiamin. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9008"
  },
  {
    "food_item": "Thịt thỏ rừng",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Iron",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Thịt thỏ rừng là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Iron. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7022"
  },
  {
    "food_item": "Ớt khô bột",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Ớt khô bột là nguồn cung cấp Iron, cùng với Thiamin. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13008"
  },
  {
    "food_item": "Đậu trắng hạt (đậu Tây)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Đậu trắng hạt (đậu Tây) là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Folate, Iron, Thiamin, Tryptophan. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3008"
  },
  {
    "food_item": "Hạt dẻ khô",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt dẻ khô là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Thiamin, Vitamin B6, Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3013"
  },
  {
    "food_item": "Hạt dẻ tươi",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt dẻ tươi là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Vitamin B6, Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3012"
  },
  {
    "food_item": "Nước mắm cá loại I",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Nước mắm cá loại I là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13015"
  },
  {
    "food_item": "Sữa bột toàn phần",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Sữa bột toàn phần là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Magnesium, Potassium, Selenium, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10006"
  },
  {
    "food_item": "Sữa bò tươi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B12 (dưới ngưỡng 20% DV - 18.33%)"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Sữa bò tươi có chứa Vitamin B12 ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 18.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin B12 có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, liên quan triệu chứng trầm cảm/nhận thức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10001"
  },
  {
    "food_item": "Rau tàu bay",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 11.11%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rau tàu bay có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.11% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4093"
  },
  {
    "food_item": "Lê",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 12.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Lê có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 12.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5023"
  },
  {
    "food_item": "Đậu đen (hạt)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Đậu đen (hạt) là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Folate, Iron, Thiamin. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3004"
  },
  {
    "food_item": "Nhãn nước đường",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Nhãn nước đường là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11012"
  },
  {
    "food_item": "Quả bơ vỏ xanh",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 18.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Quả bơ vỏ xanh có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 18.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5042"
  },
  {
    "food_item": "Lòng trắng trứng gà",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Lòng trắng trứng gà là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9003"
  },
  {
    "food_item": "Cùi dừa già",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cùi dừa già là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3001"
  },
  {
    "food_item": "Đậu phụ",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
```

```
    "content_text": "Đậu phụ là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3025"
  },
  {
    "food_item": "Cua bể",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Cua bể là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Iron. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8033"
  },
  {
    "food_item": "Men bia khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vi sinh vật lên men: nấm men Saccharomyces cerevisiae (đã bất hoạt)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Men bia khô là thực phẩm lên men nhờ nấm men Saccharomyces cerevisiae (đã bất hoạt), đồng thời cung cấp Iron, Thiamin. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4119"
  },
  {
    "food_item": "Khoai tây khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Khoai tây khô là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Iron, Potassium, Thiamin, Vitamin B6. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2023"
  },
  {
    "food_item": "Gạo lứt",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gạo lứt là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Thiamin, Vitamin B6. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1005"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bò loại I",
    "key_nutrients": [
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt bò loại I là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7003"
  },
  {
    "food_item": "Bột mì",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột mì là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Magnesium, Selenium, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1018"
  },
  {
    "food_item": "Hạt sen tươi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 18.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Hạt sen tươi có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 18.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4040"
  },
  {
```

```
    "food_item": "Khoai sọ",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6 (dưới ngưỡng 20% DV - 16.65%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Khoai sọ có chứa Vitamin B6 ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 16.65% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2013"
  },
  {
    "food_item": "Nước mắm loại II",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Nước mắm loại II là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13016"
  },
  {
    "food_item": "Sữa mẹ (sữa người)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A (dưới ngưỡng 20% DV - 10.0%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Sữa mẹ (sữa người) có chứa Vitamin A ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.0% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10003"
  },
  {
    "food_item": "Lòng đỏ trứng vịt",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vitamin A",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Lòng đỏ trứng vịt là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Iron, Thiamin, Vitamin A. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9005"
  },
  {
```

```
    "food_item": "Thịt cừu, nạc",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt cừu, nạc là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7010"
  },
  {
    "food_item": "Lựu",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 6.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Lựu có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 6.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5024"
  },
  {
    "food_item": "Sữa dê tươi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A (dưới ngưỡng 20% DV - 5.56%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Sữa dê tươi có chứa Vitamin A ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 5.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10002"
  },
  {
    "food_item": "Ngô vàng hạt khô",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Ngô vàng hạt khô là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Magnesium, Selenium, Thiamin, Vitamin B6. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1008"
  },
  {
    "food_item": "Củ sắn",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Củ sắn là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2004"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bồ câu ra ràng",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt bồ câu ra ràng là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Selenium, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7007"
  },
  {
    "food_item": "Thịt vịt",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt vịt là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin A, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7028"
  },
  {
    "food_item": "Cua đồng",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Cua đồng là nguồn cung cấp Vitamin A. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8034"
  },
  {
    "food_item": "Ngô bắp tươi",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 13.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Ngô bắp tươi có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1007"
  },
  {
    "food_item": "Khoai lang nghệ",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Khoai lang nghệ là nguồn cung cấp Vitamin C. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2009"
  },
  {
    "food_item": "Nấm hương khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Nấm hương khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4122"
  },
  {
    "food_item": "Hạt điều",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt điều là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Selenium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3015"
  },
  {
    "food_item": "Hành củ muối",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Hành củ muối là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4116"
  },
  {
    "food_item": "Pho mát",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin A",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Pho mát là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium, Vitamin A, Vitamin B12, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10009"
  },
  {
    "food_item": "Rau muống khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Rau muống khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4084"
  },
  {
    "food_item": "Cùi dừa non",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 6.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Cùi dừa non có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 6.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3002"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Hạt tiêu",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Potassium",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt tiêu là nguồn cung cấp Vitamin B6, cùng với Iron, Potassium. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13004"
  },
  {
    "food_item": "Nước mắm cá (loại đặc biệt)",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Nước mắm cá (loại đặc biệt) là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13014"
  },
  {
    "food_item": "Chuối tiêu",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium (dưới ngưỡng 20% DV - 9.76%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Chuối tiêu có chứa Magnesium ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 9.76% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5007"
  },
  {
    "food_item": "Quả thanh long",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 11.11%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Quả thanh long có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.11% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5044"
  },
  {
    "food_item": "Bột ngô vàng",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột ngô vàng là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Selenium, Vitamin B6. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1019"
  },
  {
    "food_item": "Nho ngọt",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6 (dưới ngưỡng 20% DV - 5.06%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Nho ngọt có chứa Vitamin B6 ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 5.06% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5037"
  },
  {
    "food_item": "Lạc hạt",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Lạc hạt là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3017"
  },
  {
    "food_item": "Bột lạc",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Bột lạc là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3024"
  },
  {
    "food_item": "Gạo tẻ giã",
    "key_nutrients": [
      "Selenium"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gạo tẻ giã là nguồn cung cấp Selenium. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1003"
  },
  {
    "food_item": "Củ niễng",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 7.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Củ niễng có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 7.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4024"
  },
  {
    "food_item": "Nấm rơm",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 10.0%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Nấm rơm có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.0% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4125"
  },
  {
    "food_item": "Mơ khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Potassium"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Mơ khô là nguồn cung cấp Iron, cùng với Potassium. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5032"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Bột trứng",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Thiamin",
   "Vitamin A"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
  "content_text": "Bột trứng là nguồn cung cấp Iron, cùng với Thiamin, Vitamin A. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9011"
 },
 {
  "food_item": "Nhãn khô",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Vitamin C"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Nhãn khô là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Iron. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5036"
 },
 {
  "food_item": "Mắc coọc nước đường",
  "key_nutrients": [
   "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 15.56%)"
  ],
  "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
  "content_text": "Mắc coọc nước đường có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 15.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11005"
 },
 {
  "food_item": "Bột cá",
  "key_nutrients": [
   "Iron"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
  "content_text": "Bột cá là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8057"
 },
 {
  "food_item": "Gạo tẻ máy",
  "key_nutrients": [
   "Selenium"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gạo tẻ máy là nguồn cung cấp Selenium. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1004"
  },
  {
    "food_item": "Thịt lợn mỡ",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt lợn mỡ là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7016"
  },
  {
    "food_item": "Thịt ngỗng",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Thịt ngỗng là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7019"
  },
  {
    "food_item": "Thịt gà hộp",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Thịt gà hộp là nguồn cung cấp Vitamin A. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11018"
  },
  {
    "food_item": "Tai lợn",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 13.33%)"
    ],
```

```
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Tai lợn có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7054"
  },
  {
    "food_item": "Lòng lợn (ruột non)",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 7.5%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Lòng lợn (ruột non) có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 7.5% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7047"
  },
  {
    "food_item": "Đậu phụ nướng",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Đậu phụ nướng là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3027"
  },
  {
    "food_item": "Đuôi lợn",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Đuôi lợn là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7038"
  },
  {
    "food_item": "Củ ấu",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 19.17%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Củ ấu có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 19.17% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
```

```
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2001"
  },
  {
    "food_item": "Gạo nếp máy (Loại thường)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gạo nếp máy (Loại thường) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1002"
  },
  {
    "food_item": "Bột gạo tẻ",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột gạo tẻ là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1017"
  },
  {
    "food_item": "Mít mật",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 7.5%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Mít mật có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 7.5% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5030"
  },
  {
    "food_item": "Măng khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Măng khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4051"
  },
  {
    "food_item": "Vải nước đường",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 11.11%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Vải nước đường có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.11% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11014"
  },
  {
    "food_item": "Củ đậu",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 6.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Củ đậu có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 6.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4023"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bò khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Thịt bò khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7075"
  },
  {
    "food_item": "Mắc coọc",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 3.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Mắc coọc có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 3.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5026"
  },
  {
    "food_item": "Cải bắp khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Cải bắp khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4012"
  },
  {
    "food_item": "Chuối nước đường",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 10.0%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Chuối nước đường có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.0% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11001"
  },
  {
    "food_item": "Bì lợn",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Bì lợn là nguồn cung cấp Thiamin. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7031"
  },
  {
    "food_item": "Bột gạo nếp",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột gạo nếp là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Selenium. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1016"
  },
  {
    "food_item": "Nụ mướp",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 6.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Nụ mướp có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 6.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4060"
  },
  {
```

```
    "food_item": "Hải sâm",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Hải sâm là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8036"
  },
  {
    "food_item": "Vú sữa",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 5.56%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Vú sữa có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 5.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5054"
  },
  {
    "food_item": "Cá diếc",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A (dưới ngưỡng 20% DV - 13.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Cá diếc có chứa Vitamin A ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 13.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8006"
  },
  {
    "food_item": "Bột khoai tây (lọc)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B6"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Bột khoai tây (lọc) là nguồn cung cấp Vitamin B6. Vitamin B6 có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế lo âu thông qua tăng cường dẫn truyền GABA.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2019"
  },
  {
    "food_item": "Mận nước đường",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 4.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Mận nước đường có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 4.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11006"
  },
  {
    "food_item": "Hến",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 8.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Hến có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 8.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8037"
  },
  {
    "food_item": "Thịt trâu thăn",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 18.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Thịt trâu thăn có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 18.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7027"
  },
  {
    "food_item": "Dâu gia",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 2.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Dâu gia có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 2.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5008"
  },
  {
    "food_item": "Dưa lê",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 3.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Dưa lê có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 3.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5013"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Sữa bột đậu nành",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Sữa bột đậu nành là nguồn cung cấp Iron, cùng với Thiamin. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3031"
  },
  {
    "food_item": "Bột đậu tương rang chín",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Bột đậu tương rang chín là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Iron, Thiamin. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3022"
  },
  {
    "food_item": "Mướp Nhật Bản",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 1.67%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Mướp Nhật Bản có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 1.67% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4056"
  },
  {
    "food_item": "Cá nạc",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Cá nạc là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8018"
  },
  {
```

```
    "food_item": "Bánh bích cốt",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Bánh bích cốt là nguồn cung cấp Thiamin. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_12001"
  },
  {
    "food_item": "Dưa giá (đậu xanh)",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Dưa giá (đậu xanh) là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4115"
  },
  {
    "food_item": "Gấc",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 12.22%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Gấc có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 12.22% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4034"
  },
  {
    "food_item": "Quả cóc",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 8.89%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Quả cóc có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 8.89% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_5043"
  },
  {
    "food_item": "Khoai môn",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 7.5%)"
```

```
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Khoai môn có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 7.5% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2010"
  },
  {
    "food_item": "Thịt bò loại II",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Thịt bò loại II là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7004"
  },
  {
    "food_item": "Bánh bích quy",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Thiamin"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Bánh bích quy là nguồn cung cấp Iron, cùng với Thiamin. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_12002"
  },
  {
    "food_item": "Đậu phụ chúc",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Đậu phụ chúc là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3026"
  },
  {
    "food_item": "Thịt lợn, thịt bò xay hộp",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Thịt lợn, thịt bò xay hộp là nguồn cung cấp Thiamin. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11020"
```

```
  },
  {
    "food_item": "Đường cát",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Đường cát là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_12013"
  },
  {
    "food_item": "Mực khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Mực khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8039"
  },
  {
    "food_item": "Sắn khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Sắn khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_2025"
  },
  {
    "food_item": "Dăm bông lợn",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Dăm bông lợn là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Thiamin. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7066"
  },
  {
    "food_item": "Gạo nếp cái",
    "key_nutrients": [
      "Zinc"
    ],
```

```
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Gạo nếp cái là nguồn cung cấp Zinc. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1001"
  },
  {
    "food_item": "Trám đen chín",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 15.56%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Trám đen chín có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 15.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4105"
  },
  {
    "food_item": "Bơ thực vật",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin A"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Bơ thực vật là nguồn cung cấp Vitamin A. Vitamin A có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa dẫn truyền thần kinh - cả thiếu và thừa đều ảnh hưởng tâm trạng.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_6005"
  },
  {
    "food_item": "Tép khô",
    "key_nutrients": [
      "Iron"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Tép khô là nguồn cung cấp Iron. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8050"
  },
  {
    "food_item": "Cá bống",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Cá bống là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8001"
  },
```

```
 {
  "food_item": "Hạt điều khô, chiên dầu",
  "key_nutrients": [
   "Iron",
   "Thiamin",
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Hạt điều khô, chiên dầu là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Iron, Thiamin. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3030"
 },
 {
  "food_item": "Bánh mỳ",
  "key_nutrients": [
   "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 11.11%)"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
  "content_text": "Bánh mỳ có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 11.11% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1012"
 },
 {
  "food_item": "Cá trích hộp",
  "key_nutrients": [
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Cá trích hộp là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_11016"
 },
 {
  "food_item": "Mỳ sợi",
  "key_nutrients": [
   "Tryptophan"
  ],
  "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
  "content_text": "Mỳ sợi là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
  "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1022"
 },
 {
  "food_item": "Hạt bí đỏ rang",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Hạt bí đỏ rang là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3028"
  },
  {
    "food_item": "Sữa đặc có đường Việt Nam",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Sữa đặc có đường Việt Nam là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_10008"
  },
  {
    "food_item": "Hạt dưa đỏ rang (dưa hấu)",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Hạt dưa đỏ rang (dưa hấu) là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_3029"
  },
  {
    "food_item": "Bỏng ngô",
    "key_nutrients": [
      "Iron (dưới ngưỡng 20% DV - 3.33%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: mood_regulation",
    "content_text": "Bỏng ngô có chứa Iron ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 3.33% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Iron có tác dụng REGULATING, thiếu hụt sắt có liên hệ với tăng nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_1015"
  },
  {
    "food_item": "Cà chua muối",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Cà chua muối là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4108"
  },
  {
    "food_item": "Cà muối sối",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Cà muối sối là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum, Limosilactobacillus fermentum). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4110"
  },
  {
    "food_item": "Dưa cải sen",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Dưa cải sen là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_4113"
  },
  {
    "food_item": "Nem chua",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Nem chua là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_7073"
  },
  {
    "food_item": "Rạm (muối, đồ)",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi sinh vật lên men (chưa xác định loài)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Rạm (muối, đồ) là thực phẩm lên men nhờ vi sinh vật lên men (chưa xác định loài). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_8045"
  },
  {
    "food_item": "Lòng trắng trứng vịt",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Lòng trắng trứng vịt là nguồn cung cấp Tryptophan. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_9006"
  },
  {
    "food_item": "Mắm tôm đặc",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Mắm tôm đặc là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13011"
  },
  {
    "food_item": "Mắm tôm loãng",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Mắm tôm loãng là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Lactiplantibacillus pentosus, Lactiplantibacillus plantarum). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13012"
  },
  {
    "food_item": "Mắm tép chua",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Mắm tép chua là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13013"
  },
  {
    "food_item": "Nước mắm cô",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Nước mắm cô là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn chịu mặn Tetragenococcus halophilus. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13018"
  },
  {
    "food_item": "Tương ngô",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: nấm mốc Aspergillus oryzae (mốc tương/koji)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Tương ngô là thực phẩm lên men nhờ nấm mốc Aspergillus oryzae (mốc tương/koji). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13019"
  },
  {
    "food_item": "Tương nếp",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: nấm mốc Aspergillus oryzae (mốc tương/koji)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Tương nếp là thực phẩm lên men nhờ nấm mốc Aspergillus oryzae (mốc tương/koji). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "VN_FCT_2007_MaSo_13020"
  },
  {
    "food_item": "Trà xanh",
    "key_nutrients": [
      "Catechin/EGCG",
      "L-theanine",
      "Caffeine"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: digestion",
```

```
    "content_text": "Trà xanh là nguồn cung cấp Catechin/EGCG, cùng với L-theanine, Caffeine. Catechin/EGCG có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, liên quan nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "USDA_FDC_171917; ref_data.txt muc 3.1, 3.2, 3.3"
  },
  {
    "food_item": "Trà đen",
    "key_nutrients": [
      "Catechin (thấp hơn trà xanh)",
      "L-theanine (cao nhất nhóm trà)",
      "Caffeine"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: digestion",
    "content_text": "Trà đen là nguồn cung cấp Catechin, cùng với L-theanine, Caffeine. Catechin có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, liên quan nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "USDA_FDC_173227; ref_data.txt muc 3.2, 3.3"
  },
  {
    "food_item": "Trà Ô long",
    "key_nutrients": [
      "Catechin (trung gian)",
      "L-theanine",
      "Caffeine"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: digestion",
    "content_text": "Trà Ô long là nguồn cung cấp Catechin, cùng với L-theanine, Caffeine. Catechin có tác dụng REGULATING, giúp điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột, liên quan nguy cơ trầm cảm.",
    "source_reference": "USDA_FDC_174120; ref_data.txt muc 3.2, 3.3"
  },
  {
    "food_item": "Trà hoa dâm bụt (Hibiscus)",
    "key_nutrients": [
      "Anthocyanin"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trà hoa dâm bụt (Hibiscus) là nguồn cung cấp Anthocyanin. Anthocyanin có tác dụng INHIBITING, có tác dụng giải lo âu/an thần (ghi nhận trên mô hình động vật).",
    "source_reference": "USDA_FDC_171946; ref_data.txt muc 3.5 (LƯU Ý: chỉ có nghiên cứu động vật)"
  },
  {
    "food_item": "Trà hoa cúc (Chamomile)",
    "key_nutrients": [
      "Apigenin"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
```

```
    "content_text": "Trà hoa cúc (Chamomile) là nguồn cung cấp Apigenin. Apigenin có tác dụng INHIBITING, có tác dụng giải lo âu qua gắn thụ thể GABA-A.",
    "source_reference": "USDA_FDC_174156; ref_data.txt muc 3.8 (LƯU Ý: RCT dùng chiết xuất đậm đặc 1500mg, không phải trà thường)"
  },
  {
    "food_item": "Trà bạc hà",
    "key_nutrients": [
      "Rosmarinic acid",
      "Menthol"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trà bạc hà là nguồn cung cấp Rosmarinic acid, cùng với Menthol. Rosmarinic acid có tác dụng INHIBITING, có tác dụng giải lo âu qua cơ chế gắn thụ thể GABA-A.",
    "source_reference": "ref_data.txt muc 3.6 (LƯU Ý: RCT người chỉ đo nhận thức, không đo lo âu; review rosmarinic acid là trên bạc hà lục/spearmint, không phải bạc hà cay/peppermint)"
  },
  {
    "food_item": "Trà gừng",
    "key_nutrients": [
      "Gingerol",
      "Shogaol"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Trà gừng là nguồn cung cấp Gingerol, cùng với Shogaol. Gingerol có tác dụng REDUCING, giúp giảm hành vi lo âu qua điều biến hệ vi sinh vật đường ruột (ghi nhận trên mô hình động vật).",
    "source_reference": "ref_data.txt muc 3.7 (LƯU Ý: chỉ có nghiên cứu động vật)"
  },
  {
    "food_item": "Trà hoa oải hương (Lavender)",
    "key_nutrients": [
      "Linalool",
      "Linalyl acetate"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trà hoa oải hương (Lavender) là nguồn cung cấp Linalool, cùng với Linalyl acetate. Linalool có tác dụng INHIBITING, có tác dụng giải lo âu (nghiên cứu trên viên dầu uống đậm đặc, không phải trà).",
    "source_reference": "ref_data.txt muc 3.9 (LƯU Ý: RCT dùng viên dầu uống Silexan, không phải trà)"
  },
  {
    "food_item": "Trà hương thảo (Rosemary)",
    "key_nutrients": [
      "Rosmarinic acid",
```

```
      "Carnosic acid"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Trà hương thảo (Rosemary) là nguồn cung cấp Rosmarinic acid, cùng với Carnosic acid. Rosmarinic acid có tác dụng INHIBITING, có tác dụng giải lo âu qua cơ chế gắn thụ thể GABA-A.",
    "source_reference": "ref_data.txt muc 3.10 (nghiên cứu ĐÚNG dạng trà pha - không cần cảnh báo lệch liều)"
  },
  {
    "food_item": "Trà hoa hồng (Rose)",
    "key_nutrients": [
      "Polyphenol hoa hồng (chưa xác định hợp chất cụ thể)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Trà hoa hồng (Rose) là nguồn cung cấp Polyphenol hoa hồng. Polyphenol hoa hồng có tác dụng REDUCING, có tác dụng giảm lo âu/stress tạm thời (chưa xác định rõ 1 hoạt chất cụ thể).",
    "source_reference": "ref_data.txt muc 3.11 (LƯU Ý: bằng chứng chủ yếu từ đường hít/viên nang, không phải trà uống)"
  },
  {
    "food_item": "Trà quế (Cinnamon)",
    "key_nutrients": [
      "Cinnamaldehyde"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Trà quế (Cinnamon) là nguồn cung cấp Cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde có tác dụng REGULATING, có bằng chứng hỗ trợ nhận thức, CHƯA có bằng chứng rõ về lo âu/trầm cảm.",
    "source_reference": "ref_data.txt muc 3.12 (LƯU Ý: bằng chứng yếu, chủ yếu về nhận thức không phải lo âu/tâm trạng)"
  },
  {
    "food_item": "Hạt lanh",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
```

```
   "content_text": "Hạt lanh là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Selenium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
   "source_reference": "USDA_FDC_169414"
  },
  {
   "food_item": "Hạt mắc ca",
   "key_nutrients": [
    "Iron",
    "Magnesium",
    "Thiamin"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Hạt mắc ca là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Iron, Thiamin. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
   "source_reference": "USDA_FDC_170178"
  },
  {
   "food_item": "Hạt hồ đào (Pecan)",
   "key_nutrients": [
    "Magnesium",
    "Thiamin",
    "Zinc"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Hạt hồ đào (Pecan) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Magnesium, Thiamin. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
   "source_reference": "USDA_FDC_170182"
  },
  {
   "food_item": "Hạt hồ trăn (dẻ cười)",
   "key_nutrients": [
    "Iron",
    "Magnesium",
    "Potassium",
    "Thiamin",
    "Vitamin B6",
    "Zinc",
    "Tryptophan"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Hạt hồ trăn (dẻ cười) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
   "source_reference": "USDA_FDC_170184"
  },
```

```
 {
   "food_item": "Hạt óc chó",
   "key_nutrients": [
     "Folate",
     "Magnesium",
     "Thiamin",
     "Vitamin B6",
     "Zinc",
     "Tryptophan"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Hạt óc chó là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Magnesium,
Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng
thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
   "source_reference": "USDA_FDC_170187"
 },
 {
   "food_item": "Hạt chia",
   "key_nutrients": [
     "Iron",
     "Magnesium",
     "Selenium",
     "Thiamin",
     "Zinc",
     "Tryptophan"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Hạt chia là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Selenium,
Thiamin, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần
kinh hoạt hóa quá mức.",
   "source_reference": "USDA_FDC_170554"
 },
 {
   "food_item": "Hạnh nhân",
   "key_nutrients": [
     "Iron",
     "Magnesium",
     "Zinc",
     "Tryptophan"
   ],
   "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
   "content_text": "Hạnh nhân là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium,
Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt
hóa quá mức.",
   "source_reference": "USDA_FDC_170567"
 },
 {
   "food_item": "Hạt dẻ Brazil",
```

```
    "key_nutrients": [
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Thiamin",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt dẻ Brazil là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Magnesium, Selenium, Thiamin, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170569"
  },
  {
    "food_item": "Hạt phỉ",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt phỉ là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170581"
  },
  {
    "food_item": "Hạt thông",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Thiamin",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt thông là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium, Thiamin, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170591"
  },
  {
    "food_item": "Đậu nành non (Edamame)",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Folate",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Đậu nành non (Edamame) là nguồn cung cấp Tryptophan, cùng với Folate. Tryptophan có tác dụng REGULATING, hỗ trợ con đường tổng hợp serotonin, góp phần điều hòa dẫn truyền thần kinh.",
    "source_reference": "USDA_FDC_168410"
  },
  {
    "food_item": "Rong biển (Laver/Nori)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Vitamin A",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Rong biển (Laver/Nori) là nguồn cung cấp Vitamin C, cùng với Folate, Vitamin A. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "USDA_FDC_168458"
  },
  {
    "food_item": "Diêm mạch (Quinoa), đã nấu",
    "key_nutrients": [
      "Magnesium (dưới ngưỡng 20% DV - 15.24%)"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Diêm mạch (Quinoa), đã nấu có chứa Magnesium ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 15.24% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "USDA_FDC_168917"
  },
  {
    "food_item": "Tảo xoắn (Spirulina)",
    "key_nutrients": [
      "Thiamin (dưới ngưỡng 20% DV - 18.5%)"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Tảo xoắn (Spirulina) có chứa Thiamin ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 18.5% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Thiamin có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh (serotonin, GABA).",
    "source_reference": "USDA_FDC_170091"
  },
  {
    "food_item": "Hạt gai dầu (hemp)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
```

```
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt gai dầu (hemp) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Potassium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170148"
  },
  {
    "food_item": "Socola đen (70-85% cacao)",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Zinc"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Socola đen (70-85% cacao) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Magnesium. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170273"
  },
  {
    "food_item": "Kim chi",
    "key_nutrients": [
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn lactic (Leuconostoc mesenteroides, Weissella, Lactobacillus)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Kim chi là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn lactic (Leuconostoc mesenteroides, Weissella, Lactobacillus). Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "USDA_FDC_170392"
  },
  {
    "food_item": "Hạt hướng dương",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Selenium",
      "Thiamin",
```

```
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt hướng dương là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Magnesium, Selenium, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170562"
  },
  {
    "food_item": "Hạt tiêu đen",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hạt tiêu đen là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Iron, Potassium. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170931"
  },
  {
    "food_item": "Nghệ tây (Saffron)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Potassium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin C"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Nghệ tây (Saffron) là nguồn cung cấp Magnesium, cùng với Folate, Iron, Potassium, Vitamin B6, Vitamin C. Magnesium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh và thư giãn cơ bắp.",
    "source_reference": "USDA_FDC_170934"
  },
  {
    "food_item": "Sữa chua Hy Lạp (Greek yogurt)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin B12"
    ],
    "ontology_effect": "REGULATING: neurotransmission",
    "content_text": "Sữa chua Hy Lạp (Greek yogurt) là nguồn cung cấp Vitamin B12. Vitamin B12 có tác dụng REGULATING, hỗ trợ tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, liên quan triệu chứng trầm cảm/nhận thức.",
```

```
    "source_reference": "USDA_FDC_171304"
  },
  {
    "food_item": "Việt quất (Blueberry)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 10.78%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Việt quất (Blueberry) có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 10.78% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "USDA_FDC_171711"
  },
  {
    "food_item": "Nam việt quất (Cranberry)",
    "key_nutrients": [
      "Vitamin C (dưới ngưỡng 20% DV - 15.56%)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: stress_response",
    "content_text": "Nam việt quất (Cranberry) có chứa Vitamin C ở mức dưới ngưỡng nguồn dồi dào (khoảng 15.56% DV/100g), là vi chất nổi bật nhất trong món. Vitamin C có tác dụng REDUCING, giúp giảm phản ứng lo âu thông qua vai trò chống oxy hóa.",
    "source_reference": "USDA_FDC_171722"
  },
  {
    "food_item": "Đậu lăng (Lentils)",
    "key_nutrients": [
      "Folate",
      "Iron",
      "Thiamin",
      "Vitamin B6",
      "Zinc",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Đậu lăng (Lentils) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Folate, Iron, Thiamin, Vitamin B6, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_172420"
  },
  {
    "food_item": "Miso",
    "key_nutrients": [
      "Zinc",
      "Tryptophan",
      "Vi sinh vật lên men: nấm mốc Aspergillus oryzae (koji)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
```

```
    "content_text": "Miso là thực phẩm lên men nhờ nấm mốc Aspergillus oryzae (koji), đồng thời cung cấp Zinc, Tryptophan. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "USDA_FDC_172442"
  },
  {
    "food_item": "Natto (đậu nành lên men)",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Magnesium",
      "Zinc",
      "Tryptophan",
      "Vi sinh vật lên men: vi khuẩn Bacillus subtilis var. natto"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Natto (đậu nành lên men) là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn Bacillus subtilis var. natto, đồng thời cung cấp Iron, Magnesium, Zinc, Tryptophan. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "USDA_FDC_172443"
  },
  {
    "food_item": "Cá cơm (Anchovy)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá cơm (Anchovy) là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_174182"
  },
  {
    "food_item": "Vẹm xanh (Mussel)",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Vẹm xanh (Mussel) là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Iron, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
```

```
    "source_reference": "USDA_FDC_174216"
  },
  {
    "food_item": "Hàu (Oyster)",
    "key_nutrients": [
      "Iron",
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Zinc",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Hàu (Oyster) là nguồn cung cấp Zinc, cùng với Iron, Selenium, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Zinc có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế tình trạng căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_174219"
  },
  {
    "food_item": "Tempeh",
    "key_nutrients": [
      "Tryptophan",
      "Vi sinh vật lên men: nấm mốc Rhizopus (chủ yếu Rhizopus oligosporus)"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Tempeh là thực phẩm lên men nhờ nấm mốc Rhizopus (chủ yếu Rhizopus oligosporus), đồng thời cung cấp Tryptophan. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "USDA_FDC_174272"
  },
  {
    "food_item": "Đậu phụ nhự (chao)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Tryptophan",
      "Vi sinh vật lên men: nấm mốc Actinomucor elegans/Mucor"
    ],
    "ontology_effect": "REDUCING: mood_regulation",
    "content_text": "Đậu phụ nhự (chao) là thực phẩm lên men nhờ nấm mốc Actinomucor elegans/Mucor, đồng thời cung cấp Selenium, Tryptophan. Hệ vi sinh vật lên men có tác dụng REDUCING, giúp giảm triệu chứng lo âu/trầm cảm qua điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột (trục ruột-não).",
    "source_reference": "USDA_FDC_174280"
  },
  {
    "food_item": "Cá mòi đóng hộp (dầu)",
    "key_nutrients": [
```

```
      "Selenium",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá mòi đóng hộp (dầu) là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_175139"
  },
  {
    "food_item": "Cá hồi vân (Trout)",
    "key_nutrients": [
      "Selenium",
      "Vitamin B6",
      "Vitamin B12",
      "Long-chain Omega-3 (EPA+DHA)",
      "Tryptophan"
    ],
    "ontology_effect": "INHIBITING: stress_response",
    "content_text": "Cá hồi vân (Trout) là nguồn cung cấp Selenium, cùng với Vitamin B6, Vitamin B12, Long-chain Omega-3, Tryptophan. Selenium có tác dụng INHIBITING, giúp ức chế căng thẳng thần kinh hoạt hóa quá mức.",
    "source_reference": "USDA_FDC_175154"
  }
]
```