

الكسور



المحتوي	إصفحة
مقدمة عن الكسور	٤
تعريف الكسور	٤
أنواع الكسور	٤
أسباب الكسور	٧
علامات وأعراض	٨
مضاعفات	٢١
الإسعافات الأولية	٦١
المصادر	٧١

٢. السور المثل: السور الذي يحدث بشوكل مثل و يؤدي إلى بروز العظم إلى الخارج بشوكل واضح وهذا يحدث في العظم الطويلة مثل عظمة الذراع.



٣. السور المثل: هو أحد أنواع السور الخطيرة لأن العظم تنتفخ أجزاء فقط صوغة ونوع العظم الصوغة، مثل: عظم اليد أو عظم الذراع عرضة لهذا النوع.



٤. السور المثل: يحدث عند الحمل بسبب بضع الحمل لأن العظم عديم وطوة العظم نوع لم عديم ويكون السور



غير كامل و قد يكون مجرد إجهاد العظم لم لم مثل إجهاد عصب الشجرة عند تعرضه لآفة خارجية.

٥. السور المثل: هو السور الذي يحدث في السور المثل أو المثل من أخطر أنواع السور و يؤدي إلى شيب الجلد وخروج العظم المثل، وهذا النوع يزيد من خطر حدوث التغيرات البنية.



٦. السور المثل: هو السور بسبب جزئي في العظم، وهذا يحدث في الساق أو اليد عند الرياضين نتيجة زيادة الضغط على العظم بالركض أو القفز وغالباً لا يتم الكشف عنه من خلال صور الأشعة في معظم الحالات بالرغم من وجود بعض الأعراض مثل:

ألم في المنطقة المصابة.

* تورم وازرقاق المنطقة المصابة.


٧. السور المثل: هو السور الذي يحدث في المنطقة اتصال العظمة بالربطة أو الوتر مما يؤدي إلى انفصالها.



٨. الكسر المزدوي: هو كسر يؤدي إلى التفت أو انواء أحد أجزاء العظم المشكورة؛ و يتم علاج ص لا فيحتاج المريض لعملية جراحية،
وإذا تم تخفيف الضغط الميكانيكي أو التواء العظام المصابة يعالج هذا النوع.



٩. الكسر المبرضي: هو كسر ناتج عن الإصابة بمريض المرض التي أدت إلى ضعف العظم والتهتكها وبالتالي زهله خطر تعرضه للكسور



بمروية، ومن هذه الأمراض:

* هشاشة العظم.

* التهاب المفاصل.

* التهاب العظم.

* سرطان العظم.

* أمراض العظم الليفية.

١٠. الكسر البسيط: هو كسر يحدث عند نبي عظم يعود الفري.



١١. خ الكسر: هي كسور تؤدي إلى زاح المفاصل من كذا.



٢١. الكسر المتعدد: هو كسر ناتج عن الإصابة بكسور في أجزاء أخرى.

٣١. الكسر الطولي: يحدث على طول العظمة لامة. ٦١. كسر عظم الجمجمة: هو كسر يحدث بجزء أو الكسر من الجمجمة.




وهذا سبب مرضية أخرى نادرة من احتمالية الإصابة بالسرور مثل:

* الورم السرطاني.



* التليف العظمي.

* نقص الكالسيوم في العظام.



علامات وأعراض السرور العظمي:

عانت وأعراض السرور العظمي الأعراض على

الجزء الذي يتعرض للسرور وغالباً ما يُشعر

لإصابة بوجود شعور غير طبيعي في العظام الإصابة مثل:

١- ألمت بظفر لون الجلد في المنطقة المصابة أن ألم قد يرب من الشجيرة الشوية، بما يدل على أن الإصابة قد تضررت تحتها و يهتف أن تحت ألمت م أي نوع من تلف الإصابة مثل السرور العظمي.



٢- تورم

غالباً ما تورم العظم المصابة ويحدث بسبب تورب السوائل مثل: تورب الدم إلى الإصابة الرخوة مثل: الإصابة، إدمون، الجلد.

وهذه السوائل الزائدة تسبب تضخم الإصابة الرخوة ونصيح مشبوبة أو صلبة.

٣- تشوه

هو لثدر مؤشور بطل علي لثسر لثظم فغزما بزحزي الزراع و السواق ني لثكن ل بئندرض أن بزحزي نثها فز؛ بطل علي أن فاك عظمه لثمت ني بكلها وانا لثان لثظم نخرج من لثله فثا بطل علي لثسر و لثا .



٤- صدار صوت من لثظم علث بلكون هثا

لصوت بسبب لثكك فظ لثظم م بئضها

٥- لثم بكن لثسر و لثا حوله.

٦- عثم لراجه عذ لثي صظط علي بكن الصاب هثا لثان بسط.

٧- لثان لثوة لثنطوة لثصاب لثصاب لثا بلك لثنرة علي نحر بلكها طئبي.

٨- عثم لثرة الطرف لثسور علي نحل لثي لثل.

٩- بؤذي لثسر ني بئض لثان لثي حوث ززيف لثلي.

١٠- صاب لثسجة حول لثظم لثصاب.

وئشن نثسوم لثلثت و لثراض حسب مكن لثصاب لثال.

* لثراض لثسر لثجمة

شابة لثلراض لثلابة بئذ لثا:

١- لثا لثان لثسر شئذ و لثي لثي لثنرق لثله ناعراضه سئفون

- ززيف من لثجرح لثلث ني لثله لثجة لثسر.
- لثمت و لثرؤاق حول لثن.
- ززيف من لثف.
- لثرر لثن.
- طئني ني لثن.
- نصلب لثنية.
- لثنعل و لثنك.
- قان لثنرة علي لثام.
- صعوبة ني لثا .
- قان لثسطة علي لثانة و لثماء هثا بؤذي لثي سلس لثول و سلس لثر.

٢- لثسر لثسوط مو لثسر لث عؤق و غاب لثا ل سبب لثراض لثلث و لثان لثا بئسبب

- لث ني عظم لثس.
- صئاع.
- بول.
- عؤق و نؤؤؤ.
- عثم و صؤوح لثنية.
- قان لثوزن.
- لثزجاج من لثصوء.
- لثنط لثنوط.

* لثراض لثسر لثك

- لآزيف انبوي
- عوبه نئح انم، حبث نصبح حركفة انم بشكفل عام شنبفة الصعوبة، خاصه ني حالت التسور الكلة.
- لتفاح لوجه وظهور الكفت.
- خزنن لو نذبل لوجه خاصه منطفة الشفة السفلى.
- نبیس انك و الله و نزلك سروا عزة محاولة لمضغ.
- ظهور كنفلة على الوجه، لو انك لو حدوث نغور ني مظهرما.
- نجلجل السذن لو صابنما بالضرر.

و بوجد ايضا اعراض نرجم عن نزحزح انك من بكاه مئل:

- لنواء المضفة.
- مذلن اللتب بسبب صعوبة لو عم لؤنة على اقلق انم.
- بروز انك الى الخارج.
- عم لنتظم صني السذن دعا.
- لم ني انك.
- لم ني لوجه بلكون مرفقا خلف الذن من لجهه لني حث نپا لنزحزح.

وهذه الام نزلك سروء م حركفة.

*اعراض لسر الرؤبة

- نفايم الم م حركفة الرؤبة.
- فأن نطق الحركفة ني الرؤبة.
- لصداغ وغلبا لم يبدأ ني ناعة الجمعة.
- وج لو لم ني الفتف لو اقلق الظر لو النزاجين.
- وخز لو خ َخر ني لنزاجين.
- البرماق.
- البوغة.
- ناع َهم نظم الرؤبة.
- رايين الذن (الظن).
- اضطرابات النوم.
- سهولة السنتارة.
- صعوبة الترفيز.
- مشكلات الكفرة.
- الكذب.

و نغور التسور ني منطفة الرؤبة الكثر لمبة من التسور الأخرى التي قد تحدث ني الجسم. أن منطفة الرؤبة هي مفرق طرق نبر نپا مزلت مهة نغور النواصل بين الملو والجسم. لذلك، فن التسور الرؤبة نمن النصل وبكأن أن تسبب مشاكل خطيرة ني الجسم. لا لم
نمن علاج لسر الرؤبة، نأه بلكون ذلك خطر لوت بسبب الضرر لني منحدث.

*اعراض لسر العبود الفوري

- وجود لؤل صابة ني الرأس م نغور مبنر ني مبنوى وعي الشخص.
- لم شنبه ني الرؤبة لو الظر.
- ضعف لو خنر لو شلل لو ضعف السيطرة على الطرف لو البانة لو المءاء.
- لنواء الرؤبة لو الجسم لو لتفلة وضعية غريبة.

*اعراض لسر الضلوع

- صعوبة والم عزة للأنس.

- جزء من جدار الصدر يتحرك بصورة مستقلة عن بقية الصدر.
- صوت مزج الهواء للرئتين أو الحركة.
- ألم عند الضغط على المنطقة المصابة.
- ألم عند الانحناء أو ثني الجسم.
- تورم أو نزيف غير مرئي.
- تضيق ووخز بالصدر.
- قىء دموي أو مخاط أصفر مائل للأخضر.

* أعراض كسر الذراع

- ألم شديد عند تحريك اليد أو المصك بها أو الضغط عليها أو عصرها.
- تورم.
- ألم نقي حدة ليس موضع الكسر.
- تشوهات.
- نقر أو وضوح كسب مبرح.
- انقباض أو عدم القدرة على الحركة.
- نخ أو نقي اليد أو المصك.

* أعراض كسر الحوض ١-

أعراض كسر الحوض الثابت

هذا النوع من كسور الحوض حالة و أعراضه هي:

- ألم يزداد عند الحركة.
- ألم نقي منطقة الحوض والساق الظهر والبطن والمنطقة الحوض.
- تورم وانتفاخ نقي الحوض.
- تضيق ووخز نقي المنطقة المصابة.
- نزيف داخلي يظهر على هيئة قدمات ملوثة.
- نزيف من جرح مفتوح.
- نزيف مهبلي لدى النساء.
- ظهور دم نقي البول.

٢- أعراض كسر الحوض المتحرك.

- ألم حاد نقي الحوض أو البطن أو الظهر أو الفخذين.
- دخول الجسم نقي صدمة.
- نزيف شديد لا يمكن إيقافه و يسبب انخفاض شديد نقي ضغط الدم.
- إغماء.
- ألم نقي الخلف و يتفاقم هذا الألم عند محاولة المشي.

* أعراض كسر الورك

- عدم القدرة على المشي عند السقوط أو عدم القدرة على المشي.
- ألم حاد نقي الورك.
- عدم القدرة على تحميل وزن على الساق نقي جانب الورك المصاب.
- تشوهات وتورم نقي منطقة الورك وما حولها.
- تضيق الساق نقي جانب الورك المصاب.
- تضيق الساق إلى الخارج نقي جانب الورك المصاب.

* أعراض كسر الفخذ

- ألم نوري و مبرح.
- ألم يزداد مع المشي وتورم المصاب.

- نَوَّوْ.
- لَمَلت.
- لم نبي حلة لابس موضع السر.
- الحساس بصعوبة عند المشي أو حمل أي شيء.
- ظهور ألم دناحي خاص عند محاولة التوال.
- الخنول.
- حساسية.
- حوث تفرقت نبي لشلل.
- صوبت السر (نبي بهض الحزان قد لا ينسر بصوت .).

بهضات السرور :

السرور م مشوكل أخرى أو نَوَّوْ نبي إليها و هيا
 ا مُصاعبات إا نم زق إجلد أو حث ضرر نبي الوعية البوية أو الأعصاب.
 غنت ولكن من غير الماوف أن نحت
 ضريت خطررة ويزلا خط و هـ

و نحت بع اجضى ضا
 الأولى من الصابة ونحت مضاعبات أخرى مثل: شلل في الأيدي
 الحضر نبي الوعية البوية والأعصاب، و مُبالزة الح َوَّوْ نبي، والنجلط البع
 صول والتهلم م مرور الزمن
 و نوى نبي الصاعبات أو الباي

١- اضر و نبي الوعية البوية

نفس َوَّوْ ب
 لي من السرور والصوابات الأخرى المضروبة لمؤلفة زندا ماحب
 اجارجي لير بما يلفدي اجاث اخناض نبي ضغط لا َوَّوْ نبي (صدمة)
 ظا حول بكان الصوابية ومن لانر أن يكو
 ن الزف لاني أو

جلطت لا َوَّوْ نبي أن نَوَّوْ نبي الصوابات البسيطة يسبوا إلى زف شبي د. نشوكل
 فن لمكن أن نح َوَّوْ نبي الصوابية عندما تنسرب السرور عظم النخ أو الحوض نبي زيف لاني شبيد إا كان ليري
 لچ نوا لا الوعية البوية

و لمكن يوضوا أن
 و نبي حال موت زروية مؤلفة من النسوج. يذني بتر جزء من السواق و نبي بهض الحزان يكل السرور ليرف أو المضود أن نولر نبي
 و نبي نبي شلل مشربه و قد لا نَسبب لروية نبي البوة البوية لية أعراض إلى أن نم ر صاعبات عينة بعواع، م َوَّوْ نبي
 البوة البوية إا
 الصابة.

٢- لية الأعصاب قط أو صابة في بهض الحزان

ننشد الأعصاب أو نارس عينا نحت السرور نبي اعظم. و نبي أن نؤدي ضرورية
 نائم هـ الصوابات عذا من لواء نرسا على مدى السراي أو لش ُور أو سوات، وتلك سينا لا إلى ش َوَّوْ نبي الصابة و لا نائم َوَّوْ نبي
 بهض الصوابات الأعصاب بشك ل كام ل ل د؛

وفي حال
 الأعصاب لمؤلفة من لواء نرسا، وقد نحتاج إلى اصلحها عن طريق الجراحة.

٣- النجلط لروية

الجلطة لروية و لا ُصاعبة لروية الشتر شرو
 ع للسرور الخطرة نبي لورك أو الحوض ونحت عـ

لـ نشكل جلطة نبوية في الورب و نصل و نصبح جلطه ونشل إلى الروية ونس َوَّوْ نبي شرو إا نبيا نبالالي قد لا يحصل الجسم على كمية كافية من
 الأكسجين.

ب- إصابة نبي الساق و نبي النطقة التي تنشكل نبي معظم الجلطات التي نُسبب الجلطة لروية.

ج- عم الحركة و الضووظار إلى لواء نبي السرور السواغ أو إا، م د يؤدي إلى إبطاء لروية البوية، وذلك ينجح لجلطت نرسوة
 انش َوَّوْ نبي

د- تورم حول السرور، م د يؤدي إلى إبطاء تنفق الدم نبي الشرايين و لجلطة لروية هي سبب الوفة عـ حوالى ثلثي مرضي

لچ عينا نحت السرور نبي الساق و نوا ج َوَّوْ نبي عينا نحت السرور نبي النزاع

احوض و تكون لجلطة لروية ل شرو

كسر

هو انحراف عن المحور المركزي للعظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

٥- متلازمة الحجرة (Compartment syndrome)

تحدث متلازمة الحجرة عندما يحدث تورم شديد في الحجرة، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

المرحلة

في المرحلة الأولى، يحدث تورم في الحجرة، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

٧- تشخيص المتلازمة

تشخيص المتلازمة يتم عن طريق الفحص السريري، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

و يمكن أيضًا تشخيص المتلازمة عن طريق التصوير الطبي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

٨- تشخيص المتلازمة

في بعض الحالات، يمكن تشخيص المتلازمة عن طريق التصوير الطبي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

- عدم التوافق بين حجم الحجرة وحجم العظم.
- التورم المفرط في الحجرة.
- سوء التوافق بين حجم الحجرة وحجم العظم.

لذلك، يجب تشخيص المتلازمة عن طريق التصوير الطبي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

و يمكن أيضًا تشخيص المتلازمة عن طريق التصوير الطبي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

- وجود تشخيص في الحجرة الطرفية.

- بعض المضطربات مثل التهاب العظم والنخ.

- تورم مع تورم الحجرة الطرفية الذي يحدث على خلفية التورم.

٩- التشخيص والتدخل

يحدث تشخيص المتلازمة عن طريق الفحص السريري، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

* مضاعفات تشخيص المتلازمة

تشخيص المتلازمة يتم عن طريق الفحص السريري، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية. يحدث هذا عادةً نتيجة إصابة العظم الطرفي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الحركية.

- 15

البرصات الأولية:

- يتم ذوي خطورة الإصابة.

- إيقاف النزيف خصوصاً أصحاب الكسر تلك، وذلك بالضغط على الجرح باستخدام ضمادة معقمة، أو قطعة قماش نظيفة.



صا إلى أن الكسر في الزينة أو العود

- يجب عدم تحريك الإصابة أن تحريكها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالغة خصوصاً الفوري.

- يجب تبريد الإصابة بوضع مكعبات من الثلج بقطعة قماش نظيفة، ثم وضعها على الإصابة.



من الإصابة في وضد، وطمانته، وتغطيته ببطانية الإصابة على التندبة. - عدم إزالة الضامة الطرف المكسور جلاً أو وضد جبهة مؤلمة في حالة الحاجة.



- الاتصال بالإسعاف: طلب الإسعاف وإزالة الضامة إلى قسم الطوارئ، الفخاخ الجراحات اللازمة من نحوصات، وعلاج.

